

TOP BALANDŽIO PASIŪLYMAI



-50%



AMBIO

NERVŲ SISTEMAI, 15 kramtomųjų tablečių **5⁹⁹ 274 €**
OMEGA-3 FORTE, 60 kapsulių **12⁹⁹ 649 €**
MAISTO PAPILDAI

IKI -70%



VITADAY

VITAMINAS C 200 mg, 50 tablečių **4⁹⁹ 180 € -60 %**
VITAMINAS D3 1600TV, 40 kramtomųjų tablečių **7⁹⁹ 239 € -70 %**
MAISTO PAPILDAI

IKI -60%



RAMI ŠIRDIS

MAISTO PAPILDAI

„Rami širdis“ – gausios sudėties, dviejų poveikių maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai būdinga puikiai suderinta sudėtis, kurioje, be vitaminų ir mineralų, yra natūralių augalinių ekstraktų, simptomus naudojamų medicinoje. Maisto papildai „Rami širdis“ padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-50%



LIUBERIN

LIUBERIN + LUTEIN 35mg, 30 kapsulių **21⁹⁹ 1100 €**
LIUBERIN SUPERIOR, 30 kapsulių **18⁹⁹ 925 €**

MAISTO PAPILDAI

Linija „Liuberin“ skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „Liuberin superior“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausumos, pavargusios, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Sudėtis praturtinta ginkmedžiu, kuris padeda palaikyti akies kraujotaką. O „Liuberin + LUTEIN 35 mg“ – naujas formulės akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotinoidais: net 35 mg luteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su ambliu koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išskiria ir melynų uogų ekstraktą, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

RYŠIOMS GVENIMO SPALVOMS!

NUO 4⁹⁹ €



LIVOSIL

140 mg, 30 kapsulių **4⁹⁹ €**
140 mg, 60 kapsulių **8⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekrantinti, užgerti nedideliu kiekiu skysto. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs papildymai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama švelni pacientams, sergantiems cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tiems, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

5⁹⁹ €



MAGNE B₆ 470 mg/5 mg, 60 dengtų tablečių
MAGNE B₆ geriamasis tirpalas, 10 ampulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6). Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidoato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: MAGNE B6 skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mieguistą, ilgąjį poilsio, Vartojimo būdas ir dozavimas: tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6–8 tabletes, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo ampulės turinys ištrinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgių. Vaikams ir kūdikiams, sergantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgių. Kontraindikacijos: preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B6 medžiagai; sergant tam tikrais inkstų ligų; vartojama levodopa. Specialios pastabos: nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaista galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. MAGNE B6 dengtosios tabletes skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. MAGNE B6 geriamoji tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg svorantiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti MAGNE B6 preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Pakenčiamasis vitaminas B6, pakenčiamai jautrinantis nervus: atsisakoma tirpalo ir padidėjęs jautrumas padidėjusiam, drebėjimas galimasis ir koordinacijos sutrikimai. Nėštumas vartoti vaista, mažindama paprastai išnyksta. Reklamų teksto parengimo data 2022-08-2208_58_Magne_B6_VII_LT „MAGNE B₆“ PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!



-50 % PIGIAU



-50%

GREENIFY

MAISTO PAPILDAI

Patirkite grožio galią ir geros savijautos džiaugsmą su „Greenify“:

- Odos švytėjimas ir grožis – rinkitės „Collagen Beauty Shots“
- Greitas užmigimas ir kokybiškas miegas – išbandykite „Deep Sleep Shots“
- Sąnariai ir lengvas judesys – „Collagen Joints Shots“
- Atmintis, gyvybingumas, nervų sistema – atraskite „Brain Booster Shots“

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



Imuninei sistemai



-50%

IMUNITAL SHOTS, 20 buteliukų 31⁹⁹ 16⁰⁰ €

MAISTO PAPILDAS

Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atakos neigiamoms aplinkos veiksliams. Tam tikru metu (kau) ir pasikeičia įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz., esant peršalimo ligų sezonui) gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. „Imunital Shots“ – tai aktyviųjų ingredientų programa, kuri veikia tiek įgimtą, tiek įgytą imunitetą, gerina imuninių ląstelių gyvybingumą, tiksliai blokuoja (reikiu grybui) ir vitaminus bei padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

GAŖA VAIKIŠKŲ ŽAIDIMŲ! NEVAIKIŠKAS PALAIKYMAS JŲSŲ IMUNINEI SISTEMAI.



-50%

HERBITASSIN®

HERBITASSIN® ICELAND MOSS HYDRO, 12 pastilių 5⁹⁹ 2⁰⁵ €

HERBITASSIN® SALVIA + VIT C, 12 pastilių 4⁹⁹ 2¹⁰ €

HERBITASSIN® ICELAND MOSS + HONEY, 12 pastilių 4⁹⁹ 2³⁰ €

HERBITASSIN® ICELAND MOSS + BLACKCURRANT, 12 pastilių 4⁹⁹ 2³⁰ €

HERBITASSIN® INTENSE, 12 pastilių 4⁹⁹ 2³⁰ €

HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt. 4⁹⁹ 2⁵⁰ €

HERBITASSIN® ledinukai HERBAL EXTRACTS + VIT C, braškių ir miško uogų skonio, 4 vnt. 4⁹⁹ 2⁵⁰ €

MEDICINOS PRIEMONĖ, MAISTO PAPILDAS, MAISTO PRODUKTAS

„Herbitassin“ – įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklės ir imunitetui. Išlandinės kerpės padeda palaikyti normalią gerklės ir balsų stygų funkciją, mentolis – normalų kvėpavimą, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. „Herbitassin“ Iceland moss HYDRO“ pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmą, mažina sauso kosulio ir užkirmo simptomus. Naujiena: „Herbitassin“ Intense“ – mentolio ir eukalipto skonio pastilės gerklės ir kvėpavimui.



-50%

ARTHROSTOP PROENZI

MAISTO PAPILDAS

„Arthrostop proenzi“ maisto papildas sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu, bosveljos ekstraktu.

Judėk laisvai!

NAUJENAI: „Arthrostop proenzi“ collagen shots – unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11 000mg hidrolizuoto kolageno viename buteliuke!

2305_SB_Proenzi_V01_LT

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI 5 EURŲ



2⁹⁹ €



OMEP UNO 20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. **Terapinės indikacijos:** vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksio simptomų gydymui. Vartojimo būdai ir dozavimas: vartoti po 1 kapsulę per parą, ryte. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas omeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240336087. Teksto patvirtinimo data 2024-05-15.

Nuo skausmo

4⁴⁹ €



METAFENEX 200 mg/500 mg, 10 pėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Kokišinė ir kietybė sukelia. Kiekvienoje pėvele dengtoje tablete yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmų, siejamam su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatiniu bei raumens skausmu, nedideliu artrito skausmu, pėšalimui ir gripo simptomams, genties (tykės) skausmui bei karščiavimui, malšinti. Šis vaistinis preparatas gėd tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgetikos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems gerpi po 1 tablete ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tablete, simptomai neišnyksta, daugiau galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. **Kontraindikacijos.** Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistinėmis preparatais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius ir diuretikus kaip 75 mg acetilsalicilo rūgšties paros dozes, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas reakcijų, susijusių su acetilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistinėmis preparatais nuo uždegimo, jeigu anksčiau buvo alėvė arba buvo paskaitantipirė pėšinė opa, bėva ar yra vidinio trakto žaizdos ir (arba) ar ir prakurimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujagieslinis sutrikimas, kuriems yra sutikus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti paskutinio nėštumo trimestro metu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Būtinai ypatingas atsargumas: jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra servy anksčiau, serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga šaltine, daugiagūde vėliūge, yra vidinio trakto sutrikimai arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga; pacientė nėščia pirmuosis 6 nėštumo mėnesius arba žindė. Reikiamas teksto parengimo data 2022-05.

SKAUSMĄ KEISKI „METAFENEX“!

4⁴⁹ €



ALMAGEL A GERIAMOJI SUSPENSIJA, 170 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml geriamosios suspensijos yra 340 mg aluminio hidroksido (atitinka 216 mg aluminio oksido), 109 mg magnio hidroksido (atitinka 75 mg magnio oksido) ir 109 mg bentanono. **Terapinės indikacijos:** viršutinio traktito sutrikimai, susiję su skrandžio rūgšties pertekliumi, taly kaip nemus, rūgšties sukelti skrandžio negalavimai, skrandžio ar dvylikapirės žarnos opa, simptominių gydymas 14 metų arba vyresniems paaugliams ir suaugusiems žmonėms. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems, atsižvelgiant į ligos sunkumą, 3–4 kartus per dieną (30 min. prieš valgį ir vakare, prieš miegą) gerpi po 1–3 pilnus dozuojimo šaukštėlius (1 šaukštelyje yra 5 ml). Jei yra dvylikapirės žarnos opa ir kai kurių formų skrandžio opa (brėvėrio opa), „Almagel A“ galima gerpi tarp valgių. Prieš vartojimą, dirbančiųjų vėrimimo trakto, vartojimą priešlaidikliai reikia gerpi 1–2 pilnus dozuojimo šaukštėlius. „Almagel A“ vaistinio preparato vartojimą negalima vartoti ne ilgiau kaip 12 parų. Jei inkstų funkcija sutrikusi, atsižvelgiant į sutrikimo laipsnį, suspensijos reiki gerpi rečiau arba mažesne doze. Prieš vartojimą būtinai reikia stipriai pakratyti. Preparato skėsti nerekomenduojama. Išgėrus suspensijos, 30 min. negalima gerpi kitų kietųjų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Fraktozės netoleravimas (nes sudėtyje yra sorbitolio). Hipofosfatemija. Sunkios inkstų funkcijos nepakankamumas (vidutiniškai kreatininas mažesnis kaip 30 ml/min). Alzheimerio liga. Pacientai, įsijungiantys ne 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Almagel A“ nerekomenduojama vartoti, jei yra ryškus viršutinis viršutinis, viršutinis skrandžio, metabolinis alkalozas, kepenų cirozė, sunkios širdies nepakankamumas, neštama talakozė, opinis kolitas, dvylikapirės, kolizomija ar lėtinė, inkstų funkcijos sutrikimas, lėtinis viršutinis. Vaistas gali sunkinti hemoragias sukelius nepakankamumas. Pavyzdžiuiems pacientams gali pasireikšti kaulų ir sąnarių ligos bei Alzheimerio liga. Vaistinio preparato vartoti ilgiau negu 2 savaites galima tik prižiūrint gydytoją. Sudėtyje yra paracetamolio, benzilalio, kuris gali sukelti alergines reakcijas, įskaitant uždegines alergines reakcijas. Sudėtyje yra etanolio, dėl kurio pacientams, sergantiems kepenų, smegenų ligomis, epilepsija ir alkoholiu, bei nėščioms moterims ir jaunesniems nei 14 metų vaikams gali atsirasti padėtiniai. „Almagel A“ nepatariama vartoti kartu su alkoholiu ir maistinėmis rūgštimis (citrinų, acto ir kt.), nes jos neutralizuoja vaistinio preparato vietinį anestetinį poveikį. Tarp „Almagel A“ ir kitų kietųjų vaistų vartojimo reikia daryti ne trumpesnę kaip 1–2 val. pertrauką. Dėl sudėtyje esančio benzilalio vartoti ilgiau kaip 10–12 parų nepatariama. Vaikams berokianai gali sukelti metemoglobinemiją. Reikiamas teksto parengimo data 2023 m. spalio. OTC-11-00068

4⁹⁹ €



LORATIN EXPRESS 10 mg tabletės, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** simptominis alerginės slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Vartojimo būdai ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems negu 2 metų vaikams – po 1 tablete per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 metų arba svėriantiems mažiau kaip 30 kg vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaistas atšargai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sutikus kepenų veiklos sutrikimas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240336091. Teksto patvirtinimo data: 2024-05-15.

Esant viduriavimui

3⁹⁹ €



LOPERAMIDUM WZF POLFA

2 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptominis suaugusių ir vyresnių negu 12 metų pauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimo sukėlusios priežasties. **Dozavimas:** pradėtyje gerpiama 2 tabletes (4 mg), vėliau – po 1 tablete (2 mg) po kiekvieno išsistūsinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerpi daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamidui hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepaenamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organinė per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė enterija; bei kitoks bakterinis viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochloridų gydymas pacientams turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atšargai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochloridą reikia vartoti atšargai. Jeigu pasireikšia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo žmatose yra kraujas, prieš pradėdant vartoti loperamidą hidrochloridą, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamidą hidrochloridą, gali pasunkėti šlapimnaxis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – lapp laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reikiamas teksto parengimo data 2017-01.

GREITAI SUSTABDYS VIDURIAVIMĄ.

Sloguojant

3⁴⁹ €



GALAZOLIN

0,05 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml
0,1 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: ksilometazolino hidrochloridas. **Indikacijos:** nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus ar susirgus alergine sloga, nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurines ausies uždegimą. **Dozavimas:** 2–6 metų vaikams / kiekvieną nosies landą lašinti po 1–2 lašus 0,05 % koncentracijos tirpalo kas 8 val. Vyresniems negu 7 metų pacientams / kiekvieną nosies landą lašinti po 2–3 lašus 0,1% koncentracijos tirpalo kas 8–10 val. „Galazolin“ vartoti ilgiau kaip 5–7 dienas negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausasis rinitas, uždarų kampe glaukoma. **Specialūs įspėjimai:** preparato negalima vartoti sergantiems lėtine ar vazomotorine sloga, jei jos gydymas užtrunka ilgiau negu dvi savaites. Atšargai vartoti pacientams, kuriems negalima vartoti simpatikomikų. Nevartoti kartu su MAO inhibitoriais bei trikialais antidepressantais! Informacija vartotojui yra trumpinama. Reikiamas teksto parengimo data: 2018-04.

ISLAISVINS TAVO NOSĮ!

NUO 3⁹⁹ €**DICLAC**

Diclac 1% gelis, 50 g 3⁹⁹ €
Diclac 5% gelis, 50 g 6⁹⁹ €
Diclac 5% gelis, 100g 9⁹⁹ €
Diclac 5% gelis, 150g 12⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklos medžiagos, stiprumas: 1 g „Diclac“ 5% gelio yra 50 mg, 1 g „Diclac“ 1% gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokaliams skausmams malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. **Varijomo būdas ir dozavimas:** ploną „Diclac“ 5% gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną „Diclac“ 1% gelį tepti 3–4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbiniams medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals Ltd.“ filialas, Upės g. 29-1, LT-0828 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com, 85240335891. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!**DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI**

-40%



STARAZOLIN SAUSOMS IR SUDRĖGUSIOMS AKIMS Natrio hialuronatas / deks-pantenolis, 10 ml (be konservantų) 14⁹⁹ 8⁹⁰ €

STARAZOLIN HYDROFORTE Natrio hialuronatas, 10 ml (be konservantų) 14⁹⁹ 8⁹⁰ €

STARAZOLIN HYDROBALANCE PPH Natrio hialuronatas, 2 x 5 ml 12⁹⁹ 7⁴⁸ €

MEDICINOS PIRMOSIS

Drėkinamasis, turintis augalinių poveikių lašai, palengvinantys akies paviršiaus regeneraciją.

„Starazolin“ sausoms ir sudrėgusioms akims: akių lašai skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirginatam akies paviršiui. **Lašai drėkina, stabilizuoja ašarų plėvelę ir regeneruoja akies paviršių.**

„Starazolin HydroForte“ – intensyviai drėkinantis akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui, o „Starazolin HydroBalance PPH“ suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą kiekviena diena.

Lašai rekomenduojami: esant akių aplinkos dirgikams; sumažėjus mirkėjimo dažniui; kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokyčiai. „Starazolin“ sausoms ir sudrėgusioms akims ir „Starazolin HydroBalance PPH“ gali naudoti žmonės, neįsijaušiusi vėjų tipo kontaktinius lęšius. Prieš vartojant „Starazolin HydroForte“ reikia išimti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginies maišelį.

NUO 4⁹⁹ €**STREPSILS INTENSIVE**

8,75 mg, 16 kietųjų pastilių 4⁹⁹ €
8,75 mg, 24 kietosios pastilės 8⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklos medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietąjoje pastilėje yra 8,75 mg flurbiprofeno. Terapinės indikacijos: trumpalaikis simptominių gerklės skausmų gydymas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. amžiaus vaikams. **Varijomo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: kas 3–6 val. (tai reikia) lėtai susiūdyti (jei) ištypti burnoje, išvairant reikia jautinti burnoje, kad būtų išvengta kiaušialąs dirginimo) po 1 kietąją pastilę. Per 24 val. galima suvartoti ne daugiau kaip 3 kietąsias pastiles. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjęs jautrumo reakcijos (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė), yra ar anksčiau buvo pepsinė opa ar kraujavimas iš opų (nustatyti du ar daugiau neseniajų opalinių epizodų) bei žarnynų opų; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo perforacija, sunkus kolitas, kraujavimas ar kraujavimo sutrikimai, susiję su ankstesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkus širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** reikia atsargiai vartoti pacientams, kurie serga sistetine raudonąja vilkine ir mitybos jungiamąjo audinio liga, serga tonzilitu (tonzilių uždegimu) ar mato, kad serga bakterija sukelta gerklės infekcija liga, turi širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų, sirgę virškinimo trakto ligomis (pvz., opinio kolito, Krono liga, jei paciento pirmosios odos reakcijos (dibėrimas, lupimasis, pūslių atsiradimas) arba kitokios alerginės reakcijos požymiai, nežinojimas pirmosios ir antriosios ar žindymo bei senyvių pacientams. Tokie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuoliu (miokardo infarktu) ar insulto rizikos padidėjimu. Vaisto sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės (cukrus). Į tai turėtų būti atsižvelgta sergant cukriniu diabetu. Jeigu pacientas yra alergiškas (alergiška) įvairiems (ši liga skiriasi nuo celiakijos), šio vaisto vartoti negalima. Sudėtyje esantys citralai, citrienolis, d-limonenas, farmezolis, geraniolis ir linololis gali sukelti alerginę reakciją, šienos dulkės gali sukelti sunkų padidėjusį jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą, būdingą astmai, gali sukelti vidinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas neties paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-14.

NUO 2⁹⁹ €**HJERTEMAGNYL**

150 mg, 30 plėvelė dengtų tablečių 2⁹⁹ €

150 mg, 90 plėvelė dengtų tablečių 6⁹⁹ €

75 mg, 100 plėvelė dengtų tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklos medžiaga: 1 tablete yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant šimene širdies liga, po miokardo infarkto, šimeno smegenų insulto ar praeinančio smegenų šimeno (kraujotakos sutrikimo) priepuoliu. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krešuliui, susidariusi iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo rizikai mažinti. **Varijomo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75–150 mg vieno karto per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo ir virškinamajį traktą, yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas. Slapime padaugėjo oksalatų, jeigu yra trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 18 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchų astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gyvuliams atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfodehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams neparartina ligai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinimo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių vėsinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-HJERT-2200001

NUO 1⁹⁹ €**IBUMETIN**

200 mg, 10 plėvelė dengtų tablečių 1⁹⁹ €

400 mg, 20 plėvelė dengtų tablečių 3⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklos medžiaga: 1 tablete yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis ūpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokiu kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar skauslo menstruacinis, malšinimas. **Varijomo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1–2 tabletes (jei) IBUMETIN 200 mg arba 1 tablete (jei) IBUMETIN 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg, tablete reikia užsigeriti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgšties arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU), ligos anksčiau sirgę acetilsalicilo rūgšties arba kitokiu NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, dilgėlinė, mityba ar kitokiu padidėjusiu jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitokio kraujavimas, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, hemoraginė diatezė, paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai ar žindymo laikotarpis, vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** specialiai atsižvelgus pirmosios reakcijos, jeigu inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrūkę kraujas krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, jeigu vartojama kitu NVNU ar vaistiniu preparatu, galinčiu padidinti skrandžio opų susidarymo arba kraujavimo pavojų, dantelių ar netolikiotini poveikį turinčių vaistinių preparatų, sergama cukriniu diabetu, sudėtinga vilkine ar kitomis ligomis, Krono liga, opinio kolito, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipo ar lėtinės infekcinės kvėpavimo takų ligų, senyvių žmonių. Prieš vartojant kraujavimą, atsižvelgiant, ar odos reakcijų, vartojimą būtina medikavimui nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapo laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neatnešytina būdina ir laip patariai gydytojas. Teksto parengimo data: 2023-03-01

NUO SLOGOSNUO 3⁹⁹ €**XYMELIN**

XYMELIN, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3⁹⁹ €

XYMELIN MENTHOL, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €

XYMELIN, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido. **Indikacijos:** susisugęs peršalimo ligomis, paburkus nosies gleivinei arba pasireiškus nosies ančių uždegimui. **Varijomo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams (XYMELIN MENTHOL atveju – vyresniems kaip 12 metų paaugliams) 1 purškimas arba 1–2 lašai į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaros kampos glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, abotinis rinitas (XYMELIN MENTHOL atveju), jeigu hipotizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną, XYMELIN MENTHOL jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Vartoti atsargiai, jei yra artimasis navikas (feochromocitoma), susiję su skydliaukės veikla, sergantie cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaureja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaisto gali atsirasti nosies gleivinės paburkimas, susilpninti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. XYMELIN nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 10 metų vaikams. XYMELIN MENTHOL: Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jeigu vartojate arba per paskutines dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data: 28.05.2024 LT-XYME-2200004

1+1

Perkant vieną pakuootę, antra tokia pati arba pigesnė — NEMOKAMAI!



BIOFARMACIJA linija

MAISTO PAPILAI

Išsiviečiusiems reikalingiausias: nuovargių mažinti, energiją, sportui, imunitetui, raumenims, nervų sistemai, širdiai, kraujagyslėms, imunitetui, odai, stipriems nagams ir plaukams, kaulams. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų. Dauguma mineralų – citratų formos, tai organizmo lengvai pasisavinama ir gerai toleruojama forma. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Pagaminta Izraelyje.

GAMTOS ĮKVĖPTI MINERALAI IŠ IZRAELIO!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

5⁹⁹ €



NEURORUBINE FORTE LACTAB

20 pėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas. Kiekvienoje pėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tiainino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg Cianokobalamino (vitamino B12). **Terapinės indikacijos.** Del B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. **Dovavimas ir vartojimo metodas.** Per para reikia įgerti 1–2 tabletes. Vartoti per burną. Kiek laiko vartoti. „Neurorubine Forte Lactab“, patars gydytojas. Vėliausiai po 4 savaitų būklė turi įvertinti gydymo. Jeigu simptomai neprašina, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. Vaikų populiacija. Saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neįvertintas, todėl neturi būti skiriamas vaikams. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija vitaminams B1, B6 ar B12 arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate žvyneline. **Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaisto sudėtyje esanti didelė vitamino B6 dozė gali stiprinti I-Dopos poveikį ir pabloginti Parkinsono ligą, taip pat vitaminas B6 gali stiprinti altretamino (vaisto, vartojamo vėžiui gydyti) poveikį. Kartu vartojamo izoniazido toksinis poveikis gali stiprėti. Tiosemikarbazonas ir 5-Fluorouracilas, būdami tiainino antagonistai, gali trkdyti vitamino B1 poveikį. Kartu su „Neurorubine Forte Lactab“ vartojant vaistus, suršandius skrandžio rugšis (antacidus), pablogėja vitamino B1 pasisavinimas. **Reikiamas teksto parengimo data 2024-02. NEUR-17-00008**

PAKITE SKAUSMĄ UŽ NAGARUS!

– VIRŠKINIMO SISTEMAI

NUO 4⁹⁹ €



GUTTALAX

GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml 4⁹⁹ €
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml 8⁹⁹ €

(Natrio pikosulfatas)

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo (5 lašų) yra 25 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos:** Trumpalaikis vidurių užkietėjimo malšinimas, tuštinimo lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Guttalax“ geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10–20 lašų per para, 4–10 metų vaikams: 5–10 lašų per para. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Siekiant, kad tuštinimas būtų reguliarus, dozė galima koreguoti iki rekomenduojamos didžiausios. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepažeidimams ar obstrukcijai; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas del ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu, ūmine uždegimine žarnų liga; ūminė dehidracija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; neto paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Nenušalčius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. „Guttalax“ parabolijusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo „Guttalax“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Teksto parengimo data: 2017 m. spalio mėn. Reikiamas teksto parengimo data: 2022 gegužės mėn. Z205_5B_ „Guttalax“_VII_17

– CHOLESTEROLIO KONTROLEI

1+1

Perkant vieną pakuootę, antra tokia pati arba pigesnė — NEMOKAMAI!



ATEROLIP®

ATEROLIP® COMPLEX CAPS, 30 kapsulių 15⁹⁹ €

ATEROLIP® COMPLEX CAPS, 90 kapsulių 39⁴⁹ €

ATEROLIP® FIBER, 15 paketėlių 18⁹⁹ €

ATEROLIP® D, 30 kapsulių 17³⁵ €

ATEROLIP® RYTHMO, 30 kapsulių 13⁹⁹ €

MAISTO PAPILAI

„Aterolip“ complex caps“ sudėtyje esantis oibertolių ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, taip pat normalizuoti kepenų lipidų kiekį.

„Aterolip“ Rythmo“ sudėtyje yra vienaipiečių gudobelų žiedų, kurios padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.

„Aterolip“ Fiber“ sudėtyje esančių beta gliukanų ir avių ar miežių vartojimas su maistu padeda mažinti padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujyje ir karto pavaičius.

– KOJŲ VENOMS

15⁹⁹ €



PATOGI DOZĖ. TIK VIENA TABLETĖ PER PARĄ

VELIOS 1000 mg pėvele dengtos tabletės, 30 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: Kiekvienoje pėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmino. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinis veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymas, esant: apatinių galūnių venų varikozai, venų opoms, telangiektazijoms ir retikuliniams varikozėms ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar nematyti kojų pojūčiui, kojų skausmui ar degimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniam kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, parastėjai (odos dilgčiojimui, bėdymai ar niežėjimui), odos enitai ar čirnelė. **Suaugusiųjų padidėjusio hemorojus simptomų gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venų nepakankamumo simptomams gydymas. 1 tabletė per para valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Ūminio hemorojus simptomams gydymas: pirmąsias 4 dienas gerti 1 tabletę per para, 5 dienas – po 2 tabletes per para gydymui, tai būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės:** patinęs hemorojus, simptomams, reikia įsiminti, kad „Velios“ veiklia tik simptomams ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai neprašina, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir patikrinti tiriamą gyvytį. „Velios“ nėra veiksmingas gydant su kraujavimu susijusią edemą. „Velios“ pėvele dengtą tabletę turi nevaistoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrinka kojų veninė kraujotaka, „Velios“ gydymui poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kėdės naudojimas, specialūs kojinių nešėjimas. Kai apatinių kojų dalis patinusi del širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepadeda. Jeigu gydymo: jums yra saulės, kad neteknotumėte kojų nosį angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Velios“ sudėtyje yra suaktyvinto geltonojo dažalo (E170), kuris gali sukelti alerginę reakciją. **Reikiamas teksto parengimo data 2024-11-18.**

PAJUŠK KOJŲ LENGVUMĄ.

– SLENKA PLAUKAI? PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJA GALIA!

NUO 11⁹⁹ €



BEOTEBAL

BEOTEBAL 10 mg, 30 tablečių 11⁹⁹ €

BEOTEBAL 10 mg, 60 tablečių 19⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

BEOTEBAL 10 mg tabletės. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino.

Terapinės indikacijos. „BEOTEBAL“ priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnį, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, del kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parastėjų (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, perstėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems, skaitant servyus pacientams, vartoti 10 mg biotino, ty 1 tabletė „BEOTEBAL“ per para. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, del biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingai mažesni. Reikiamas teksto parengimo data 2022-04.

*Slenkantis, silpnas, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebal“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

NUO **3⁹⁹** €

**NALGESIN S**

Natrio naproksenas, 10 dengtųjų tablečių **3⁹⁹ €**

Natrio naproksenas, 20 dengtųjų tablečių **5⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vēlkojies medīgas, stūrmās: nātrā nāpoksēns – 275 mg. Indikācijas: gēvies, dantū, mēnēns, sanāru, raurnu, potaurnimās, pōpēdānīs skaums nāpoksēns. **Varjotē mēdīs dēvās:** sūspōsēms ī vēlēs kāp 18 mēdās prāstē pōt dē skaums nāpoksēns – 550–100 mg 8 prāstē varjotē 550 mg, vā – pō 275 mg kā 8–v. **Kōntrāindikācē:** pēdēdē jautums bē kurnī sūdēdēdēdē prāstē mēdā, būvās ālreins rēkēcā, kūrē skūstē nēstērdāl vārtēdā prāstē nū ūdēgēj, āp ī āsīnāpānēj skārdzō ī dēvāpēkēdēz mēdās, apō kēlreins ī vēršānōt kōrt, sūks īsīs nēpākānēms. Spēcāls pēdēj: nāpoksēnu gēvōs pācētā, sēvāpēj epēlēs ā pōrjūfā, kurnī būvō ī vēršānōt kōrt sūbrīnēj, vā opīs kōlēs ī kōnō lējā, pīvāstē pēstē gēvāpēs. Nāpoksēns dārdzīmās vārtēj, jē vā sūnī nēlēs jāzēdē ārbē ī dēdē opēcēcēs kōl mēzābū kā 48 vārdēlēs. Rēkēcā pēdēj pārengē mēdā: 2024 07 12.

MALŠINA SKAUSMA IR UŽDEGIMA.

NUO **2⁹⁹** €



BRONTEX

BRONTEX, 15 mg/5 ml, sirupas, 100 ml **3⁹⁹ €**

BRONTEX, 30 mg, 20 tablečių **2⁹⁹ €**

BRONTEX, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml **5,49 €**
BRONTEX, 60 mg šnypščiosios tabletės, 10 tablečių **4,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 m

[illegible]

GREITOJI PAGALBA NUO KOSULIO VISAI ŠEIMAI!

■ NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI

19⁹⁹ €



ONYTEC®, 80 mg/g, vaistinis nagų lakas, 3,3 ml
MEDECERTINIS VAISTINIS DOZAVIMAS

[illegible]

■ NORMALIZUOJA ŽARNYNO VEIKLĄ

NUO **7⁹⁷** €



LINEX

LINEX, 16 kietųjų kapsulių **7⁹⁷ €**

LINEX, 32 kietosios kapsulės **12⁹⁷ €**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kelviskios medikaments, stiprinamie: 1 keliulelyje yra ne mažiau kaip 12,4 x 10⁷ KSU filtruotųjų gyvųjų bakterijų (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium lactis*, *Enterococcus faecium*). **Terapinės indikacijos:** viduriavimui, pilvo pūtimui ar kitokioms virškinimo sutrikimams gydyti kaip pagalbiniu priemoniu. **Varžymo būdas ir dozavimas:** mažiems vaikams kaip 2 m. vaikams geroti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, 4–12 m. vaikams – po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, o vyresniems nei 12 m. – po 2 kapsules 3 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai pagalbiniam medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** specialią atsparumą pirmūniui keliančią įsotus yra kraujas ir gleivės. **Paraišiusi Pharmaceuticals d.d.** "Filialas, Upgės 21-1, ILO-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6057. El. paštas info.lituanija@sanofi.com. B25403036000. Teksto patvirtinimo data 2024-03-05.

Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136080. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

KELIO SĄNARIO OSTEOARTRITUI

19⁹⁹ €

**PIASCLEDINE®** 300 mg, 30 kietųjų kapsulių**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**[illegible]

„PIASCLEDINE“ MAŽINA SKAUSMĄ IR PALENGVINA JUDĖJIMĄ!

3⁹⁹ €

**FREST® 1 MG/G GELIS.** 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g gēlo ya 1 mg dimēdriēno māleto. **Terapijas indikācijas.** Pret vīrstarpas nēiējēmo, sūsiēso su dermatozēmo, diēlēno, valēdēdē jādēmo, nēdēpēmo no sūo sūēlēsi dērēsi i pārvērtēno dēo nēdēpēmo (pirmo lāpēro) trūpākānē malnēsu, sūsiēsiēno, pāpūlēsi i l mēnēsi bē vīrsnēis vāpēmo. **Dēvāzēms i vāpēmo bēdē.** Sūsiēsiēno, pāpūlēsi i vāpēms gētē rēkēti pēli plūksnē atē pāzēstē i nēiēdēno dēo vīēti s i kārē p ar. **Kontraindikācijas.** Pādējējē vāpēmo vēlēkē atē bē kūrē pāgēnē bēdē. Pret gēlāto vāpēmo pūēns nē i mēnēis vāpēmo, yē nēēsiēstēno. **Speciāli pēlēsi i atzargēno pēriēnē.** Jēgi pāgēnē bēl sūnē nēiējē atē dēo lāpēstē, kūrē su lūkālā vāpēmo dēimēdēno māleto lētiēvāno rēkēdēmo sūo sūēlēsiēno pēvokē gēriēnāms vāstēlēns pēpārātē. **Wēlēns rēkēdēns tēstē tēstē tēstē atzovēns** (tēstē. Grēnēks Kālēks Lētiēvā. Rēkēdēmo tēstē pāriēnēto dēo 2025-03-14)

SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO GYDYMAS

2⁹⁹ €

APAP EXPRESS, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje „APAP express“ minkštojoje kapsulėje yra 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos: simptominio lengvo ar vidutinio skausmo ir (arba) karščiavimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir paaugliams, svariantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 m.): 1–2 minkštosios kapsulės (500–1000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė – 3000 mg) kas 24 valandas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas paracetamoliui, žemės riešutams, sojos arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkūs kepenų nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, dehidratuotiems arba nuolat ilgai besimaistantiems, sergantiems astma. Gydančis šiuo vaistiniu preparatu, alkoholio vartoti negalima. Ilgas ir dažnas vartojimas nerekomenduojamas. Jeigu per 3 dienas įsų saviavajta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreiptis į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-04.

NUO 9⁹⁹ €

NIZORAL

NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 60 ml 9⁹⁹ €NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 100 ml 14⁹⁹ €

Ketokonazolas

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: ketokonazolas, 20 mg/g. Indikacijos: vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukelia grybeliai, gydyti: seborėjiniam galvos odos pleikanojimui (Plitvits capitis), seborėjiniam dermatitui (tačiau raudos dėmės, padengtos gleivėmis arba baltomis pleiskanomis), vainikinei dermatitui (Plitvits versicolor) (turi kremo esančios mažos raudos ar baltos spalvos, neryškios kraštais dėmės), trichitritritrit capitis ir seborėjinio dermatito profilaktikai. Vartojimo būdas ir dozavimas: širdis vartoti paaugliams ir suaugusiems. Po oda reikia sudrėkinti „Nizoral“ šampūnu ir palaukti 3–5 min., kad įsigertų. Po to oda ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas kaip gydyti, ar jos profilaktikai. Kontraindikacijos: šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarus su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėjus vartoti „Nizoral“, reikia suvokti, kad „Nizoral“, kaip ir kitos šampūnos, nepašalina į odą. Jeigu taip atsitinka, jas reikia nuplauti vandeniu. Reklamos teksto parengimo data: 2022 balandžio mėn. 2204_SB_„Nizoral“_V01_11

NUO REFLIKSUO

-30%



NEOBIANACID

NEOBIANACID PEDIATRIC, granules, 36 paketėliai 24⁹⁹ 17⁴⁸ €NEOBIANACID, 14 tablečių 12⁹⁹ 9⁶⁰ €NEOBIANACID, 45 tablečių 26⁹⁹ 18⁷¹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

- Mašina vėmė, skausmas, gastroezofaginio refliksas
- Mašina funkcinės dispepsijos simptomus
- Saugo skrandžio ir stemplės gleivinę
- Gali būti vartojamas profilaktikai, kai sudirginama skrandžio gleivinė
- 100 % natūralus
- tinka vartoti nėštumo, žindymo metu

6⁹⁹ €

SEPTABENE

3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septabene“ deinfekuojama burna ir ryklę bei lengviau ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu). Dozavimas: suaugusiems rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai išgerti burnoje kas 3–6 valandas. 6–12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai išgerti burnoje kas 3–6 valandas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosoms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika: „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis slopina cefitipridino chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2022-10-12.

TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

-30% 9⁷⁸ €

SMECTAGO®

12 paketėlių

MEDICINOS PRIEMONĖ

- „SmectaGo“ paruoštas vartoti
- „SmectaGo“ pradeda veikti iš karto

„SmectaGo“ suništ bakterijas, virusus ir toksinus, ir padeda juos pašalinti iš organizmo

Suaugusiųjų ir vyresnių kaip 8 metų amžiaus vaikų ūminiam viduriavimui gydyti. Vartojamas suaugusiems ir vaikams, vyresniems kaip 15 metų: iš pradžių gerti 2 paketėlius, vėliau – po paketėlį po kiekvieno paūstėjimo skystoms išmatoms, vartoti ne daugiau kaip 6 paketėlius per parą. Vaikai (8–15 metų): iš pradžių gerti 2 paketėlius, vėliau – po paketėlį po kiekvieno paūstėjimo skystoms išmatoms, vartoti ne daugiau kaip 6 paketėlius per parą. Siekiant išvengti dehidratacijos, būtina vartoti geriamąjį rehidracinį tirpalą, padedantį atkurti viduriuojant prastą skysčių pusiausvyrą. „SmectaGo“ galite vartoti ne ilgiau kaip 3 dienas. Jeigu viduriavimas tęsiasi ilgiau kaip 3 dienas, pasikonsultuokite su gydytoju. Suaugusiųjų lėtiniam viduriavimui arba pilvo skausmui gydyti. Vartoti ne daugiau kaip 3 paketėlius per parą. Nepasikonsultavus su gydytoju „SmectaGo“ galima vartoti ne ilgiau kaip 2 savaites. Praneškite apie šalutinį poveikį gamintojo vietiniam atstovui Mayoly Balcis UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com. Reklamos teksto parengimo data 2024-02-15. Paruošta 2024 m. gegužės mėn. SCGO-11-2024-0009

„SMECTAGO“ – STABDO IR GYDO VIDURIAVIMĄ KUR BEBŪTUMĖTE!

6⁹⁹ €

NASOMETIN 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas, 60 dozių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje išpurškiamojo dozėje yra 50 µg mometazono furato. Terapinės indikacijos: vaistas skirtas anksčiau gydytojo diagnozuoto suaugusiųjų sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą, vėliau – po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, nesugydyta vietinė nosies gleivinės infekcija ar neužgyjusi žaizda po nosies operacijos ar traumos. Specialūs įspėjimai: kvepavimo takų tuberkuliozė arba kita infekcija. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136094. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

KANKINA ALERGINĖ SLOGA? METAS TAI PAKEISTI!

PERŠALIMO IR GIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 5⁹⁹ €



GRIPEX

GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plevėle dengtų tablečių 5⁹⁹ €
GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plevėle dengtos tabletės 8⁹⁹ €
GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plevėle dengtų tablečių 5⁹⁹ €
GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plevėle dengtų tablečių 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklos medžiagos, stiprumas: 1 tablete: „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrinio hidrochlorido, 15 mg dekstrometorfano hidrobrovrido. 1 tablete: „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrinio hidrochlorido, 10 mg dekstrometorfano hidrobrovrido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą, „Gripex 325/30/10 mg“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletes 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima gerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; lėtinis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites busius juos vartoti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutikus mitybos ar dienos kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydančis šias vaistas, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2024-04-02. „GRIPEX“. VEIKIUI!

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

NUO 2⁹⁹ €



ELFIMEST

ELFIMEST, 20 mg, 7 skrandyje neišsijusios tabletės 2⁹⁹ €
ELFIMEST, 20 mg, 14 skrandyje neišsijusių tablečių 4⁹⁹ €
Esomeprazolas

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Elfimest 20 mg skrandyje neišsijusios tabletės. Kiekvienoje skrandyje neišsijusioje tablete yra 20 mg esomeprazolo (atitinkančio 21,75 mg esomeprazolo magno druskos dihidrato). Terapinės indikacijos. Elfimest skirtas suaugusių žmonių gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties nereguliacijos) trumpalaikiam gydymui. Dozavimas. Rekomenduojama dozė – 20 mg esomeprazolo (vieną tabletę) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali priimti vartoti 2–3 paras 6 eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiška 6 eilės, gydymo reikia nutraukti. Reikia nuryti visą tabletę, užgertą puodeliu vandens. Tablečių negalima naudoti kaip kramtalo. Nėra įrašytas: tablete galima išgerti pusę tabletes reaguojant vėdu. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeičiamiesiems benzimidazolams arba pagalbinei medžiagai. Esomeprazolo negalima vartoti kartu su neflivanu. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pacientus reikia informuoti, kad kreipęsi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomo priežastį, psichomotorinį vėmimą, disagiją, vėmimą krauju ar mėlyną ar mėlyną įtarimą ar diagnozuojama skrandžio opa, baltima išmatų, ar nėra piktų rūgšties, nes gydymas esomeprazolu gali palengvinti šiuos simptomus ir uždelsti diagnozę nustatymą. Jeigu anksčiau sirgus skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją, jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepašalinamas simptominis neįveikimo arba rėmens gydymas, je serga gelta arba sunkia kepenų liga, je yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba neįveiktą piktų rūgščių simptomų. Protonų siurblio inhibitoriai sąveikauja su labor. reagentais PPIV atvejais. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. Reklamos teksto parengimo data 2025 kovas. EBF-11-00009

GREITAI IR INOVATYVI PAGALBA NUO RĖMENS!

PERŠALIMO, YPAČ SUSIJUSIO SU VIRUSINE INFEKCIJA, GYDYMAS

7⁹⁹ €



ENGYSTOL, 50 tablečių

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra veikliųjų medžiagų: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 375 mg, Sulfur D10 375 mg. Indikacijos. Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo būdas. Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol išstips), uminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną), 6–11 metų vaikams: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną, uminiais atvejais – po 0,5 tabletes kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). Tablete lėtai išstipinti burnoje. Je reikia vartoti ne valgo metu. Vaikams tablete galima susmulkinti ir išstipinti nedidelėmis kiekiais vandens. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – žapų laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Registravimas. „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). Registruotojo atstovas. UAB „Farmahel“, www.heel.lt Teksto parengimo data 2022-12-07. KOVOJA SU VIRUSAIS NUO PIRMŲJŲ PERŠALIMO POŽYMIŲ. TINKA IR VAIKAMS.

PERŠALIMO IR GIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 5⁹⁹ €



GRIPEX THERMAL

GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketai 7⁹⁹ €
GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketai 9⁹⁹ €
GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketai 5⁹⁹ €
GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketai 7⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklos medžiagos, stiprumas: 1 paketai: „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido. „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 6–12 m. vaikams: 1 paketai kas 4–6 val.; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketai kas 4–6 val. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusiems ir vyresni nei 12 m. vaikais: po 1 paketai kas 4–6 val. Nepažįstam su gydytoju, neviršykite ligos nei 7 d. Nevartokite didesnę nei rekomenduojama dozę. Pasakykite gydytojų, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholio. Kontraindikacijos: alergija veikliosios arba pagalbinės medžiagos, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminų; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfordehidrogenozės arba metilgloboino reduktazės stoka; sunkūs kepenų ar inkstų nepakankamumas; traukuliai; šlapimo užklijavimas arba heochromocitoma; židnuotum, MAO inhibitorių vartojimas; netikslus ar klaidus žymėjimas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: paartitute su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Remo sindromu (orka ir kaip pirči, ausies kraštų) ir nosies galūnė išblykimas, dažnai skausmas šaltis arba emocijos streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2024-07-05. „GRIPEX THERMAL“. VEIKIUI!

KRAUJOTAKAI IR ATMINČIAI

9⁹⁹ €



GINKOBIL 120 mg, 40 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklos medžiagos stiprumas: 1 kietoji kapsulė yra 120 mg rafinuoto ir kietųjų kapsulių įvertinto ginkmedžių lapų sausio ekstrakto. Indikacijos: lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar žvynu ausyse, svajuliu ar galvos skausmu, simptominiams gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną (atitinka 160–240 mg dienos dozė). Kontraindikacijos: vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: kadangi drėkiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto poveikis depresinei nuotakai ir galvos skausmams, nusėjusius su slėpnių vystysies sindromu, kol kas nėra pakankamai ištyrus, medikamentų gydymą šiuos simptomus galima tik laikintis visu būtinu atsargumo priemonių. Teksto peržiūros data 2017-05-22. VEIKSMINGAI GERINA SUTRUKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!

NUO ALERGIJOS

5⁹⁹ €



FENKAROL 25 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma. „Fenkarol“ 25 mg tabletės. Kalybinė ir kietųjų kapsulių. Kiekvienoje tablete yra 25 mg kifenadino hidrochlorido. Terapinės indikacijos. Simptominiams alerginės slogos (su kosuliu, čiauduliu ar be jo), dermatito (egzemos, dilgėlinės) ir niežulio gydymui. Dozavimas ir vartojimo metodas. Vartoti per burną. „Fenkarol“ tabletes yra geriamas iš karto po valgio. Suaugusiems žmonėms. Dozė yra 25–50 mg (1–2 tabletes) 2–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė yra 200 mg. Gydoma 10–20 parų. Prieškus gydymo kursą galima pakartoti. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Vaikams ir paaugliams. Vyresniems negu 12 metų vaikams dozė yra 25 mg (1 tablete) 2–3 kartus per dieną. Gydoma 10–15 parų. Prieškus gydymo kursą galima pakartoti. „Fenkarol“ reikia vartoti suaugusiems kaip 12 metų vaikams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas kifenadino hidrochloridui ar preparato eksantoms pagalbinės medžiagos. Pirmasis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Atsargiai vaistinio preparato reikia vartoti ligoniams, sergantiems sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo trakto, kepenų ir (arba) inkstų ligomis. Nevartoti jeigu, nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Pirmajį nėštumo trimestrą kifenadino vartoti draudžiama. Antrąjį ir trečiąjį nėštumo trimestrą kifenadino vartoti nerekomenduojama. Pradome plėmąi perskaityti pakutes lapelį ir vartoti, kaip nurodyta. Netikimai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepageria ar atsidaro šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būdina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu žartate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojų, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir, paštu Nepagadėjama@rvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.rvkt.lt. Reklamos teksto parengimo data 2020 sausio mėn. 06 d.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

*Akcija tiekuma geltona etiķete pažymētiem produktiem

[illegible]

6⁹⁹ €**STREPSILS**

STREPSILS HONEY & LEMON, 1,2 mg/0,6 mg, 24 kietosios pastilės
STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS, 1,2 mg/0,6 mg/8 mg, 24 kietosios pastilės
STREPSILS VITAMIN C, 1,2 mg/0,6 mg/100 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI


Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties („Strepsils Vitamin C“) ir 8 mg levomentolio („Strepsils Menthol & Eucalyptus“). Terapinės indikacijos: lokalus simptominis ryklės uždegimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“: suaugusiems ir vyresniems nei 6 m. amžiaus vaikams bei paaugliams: 1 kietoji pastilė kas 2-3 val., bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val.; „Strepsils Menthol & Eucalyptus“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. amžiaus vaikams bei paaugliams: 1 kietoji pastilė kas 2-3 val., bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. Vartoti 1 burnoje ir ryklėje. Kietajai pastilei leisti ištirpti burnoje. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai; jaunesniems nei 12 m. vaikams („Strepsils Menthol & Eucalyptus“); jaunesniems nei 6 m. vaikams („Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“). Specialūs įspėjimai: dėl užspringimo pavojaus nerekomenduojama vartoti mažiems vaikams. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. „Strepsils Vitamin C“ sudėtyje yra azodoksilio – Parson 4R (E124) ir saulėgelio geltonos (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Jeigu pacientas yra alergiškas kvečiams (ši liga skiriasi nuo celakijos), tuomet šių vaistų vartoti negalima. „Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“ kvapiosios medžiagos sudėtyje yra citralo, citranelolio („Strepsils Vitamin C“ sudėtyje), d-limoneno, geraniolio ir linalolio. Citralis, d-limonenas, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų. „Strepsils Menthol & Eucalyptus“ kvapiosios medžiagos sudėtyje yra d-limoneno. D-limonenas gali sukelti alerginių reakcijų. Šių vaistų sudėtyje yra sieros dioksido (E220). Retais atvejais gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-14.

SKAUSMUI MALŠINTI2⁹⁹ €**MIALDEX 25 mg, 10 plėvelės dengtų tablečių**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. „mialdex“ yra vaistas skausmui malšinti, priklausančias nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). „mialdex“ veiklioji medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). „mialdex“ vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmų, skausmingų mėnesinių, dantų skausmų malšinti. Vartojimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletės (12,5 mg) kas 4-6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandas, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). Kontraindikacijos: jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamolui arba bet kuriai pagalbinei „mialdex“ medžiagai; **įspėjimai:** jeigu sergate arba sirgote inkstu, kepenų ar širdies ligomis, sirgiate nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sisteminė raudonoji vilkligė ar mšiomis jungiamojo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. **Galimas šalutinis poveikis:** šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data: 2022.11.17

NUO KARŠČIAVIMO IR SKAUSMO6⁹⁹ €**IBUPROM 40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams, 100 ml****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „ibupro“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis šilpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimas malšinimas. „ibupro“ skiriamas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. 3-6 mėn. kūdikiams (3-5 kg) gerti po 1,25 ml 3 kartus per parą, 6-12 mėn. kūdikiams (6-10 kg) – po 1,25 ml 3-4 kartus per parą, 1-3 m. vaikams (10-15 kg) – po 2,5 ml 3 kartus per parą, 3-6 m. vaikams (15-20 kg) – 2,5 ml 3 kartus per parą, 6-5 m. vaikams (20-30 kg) – po 5 ml 3 kartus per parą, 9-12 m. vaikams (30-40 kg) – po 7,5 ml 3 kartus per parą. Nurodyta vaisto dozė reikia skirti maždaug kas 6-8 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui, ūminis nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paveldimas nėsimo trimeris, tromboцитопения, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praeitę baltosios padidėjęs jautrumo reakcijos (odma, rinitas, angio-neurozinis padirkinimas, dilgulinė) vartojant kitą NVNU, skaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, susijęs su anksčiau NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. **Specialūs įspėjimai:** senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiems diabetu, sisteminė raudonoji vilkligė, širdies nepakankamumas, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, rikiaritinis pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įprastas portinio apykaltos sutrikimas, dehidratacija, vartojantiesiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimų pavojų, ibuprofeno reikia vartoti atsargiai. **Reklamos teksto parengimo data 2024-11-29. YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.**

SKAUDANČIAI GERKLEI8⁹⁹ €**POLOVOX**

8,75 mg/dozėje burnos gleivinės purškalkas (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: vienoje dozėje (3 išpurkimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Indikacijos:** skaudantis gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni: vieno dozė (3 išpurkimai) į gerklę kas 3-6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozių per 24 valandas. Per įpurkimą nekvėpti. „Polo-Vox“ skirtas vartoti tik trumpą laiką. **Kontraindikacijos.** „PoloVox“ vartoti negalima pacientams, kuriems yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškę alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo du ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo arba žarnų opos atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolės būtiną laiką, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėjant vartoti „PoloVox“, jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinės tonzilitų uždegimas; jeigu pacientas serga arba sirgo astma; sisteminė raudonoji vilkligė ar mšiomis jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligomis (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė nežinia pirmuosius 6 mėnesius arba malšina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data- 2020 m. 07 mėn.

-30% 10^{48€}**CATIONORM® akių lašai, 10 ml****MEKINIOS PREKĖ**

„Cationorm“ veiklioji medžiaga yra unikali apsauginė drėkinamoji ir gydymoje terpe akies paviršiuje – unikali nanomemulsija. Dėl teigiamo elektrostatinio krūvio lipai išlaikoma drėgmė akies paviršiuje. Atstato visus 3 akies sluoksnius. Ypač efektyviai malšina sausų akių simptomus, kurie pasireiškia tiek ryte, tiek vakare, taip pat kai atsiranda akys.

1. Apsaugo – atkuria pažeistą akies lipidų sluoksnį, sumažina akies išdžiūvimą, palaido drėgmę.
2. Drėkina – apripiama medžiaga visus 3 akies plėvelės sluoksnius iki optimalaus akies kiekio ir balanso.
3. Skatina gijimą.

Tinka naudoti su visų rūšių kontaktiniais lęšais, 3 mėnesius nuo atidarymo.

BE KONSERVANTŲ!**PALENGVINA ATSIKOSĖJIMĄ**5⁹⁹ €**HADORTA SIRUPAS, 100 ml****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml sirupo yra 5,556 mg Hedera helix L. folium (gebenių lapų) sausio ekstrakto (4-8 : 1); 5 ml sirupo yra 27,78 mg gebenių lapų sausio ekstrakto. **Terapinės indikacijos:** augalinis vaistinis preparatas, skirtas suaugusiųjų, paauglių ir vyresnių kaip 2 metų vaikų atsišokėjimui lengvinti esant produktiviam (drėgnam) kosuliui. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** vyresni kaip 12 metų paaugliai, suaugusieji ir senyvi pacientai: 5 ml sirupo 2-3 kartus per parą (atitinka 55,56-83,34 mg gebenių lapų sausio ekstrakto per parą). 6-11 metų vaikai: 2,5 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 41,67 mg gebenių lapų sausio ekstrakto per parą). 2-5 metų vaikai: 1,6 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 26,67 mg gebenių lapų sausio ekstrakto per parą). Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, Alergizacija šeimoms augalams ir Apiaceae (Umbelliferae) šeimoms augalams (pankoliai, kymynai, salierai, kalendros ir krapai) ar anetoliui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų amžiaus vaikams, nes yra bendra kvėpavimo takų simptomų pasunkėjimo rizika dėl sekreto išsiskyrimą skatinančių vaistinių preparatų vartojimo. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** esant nuolatiniams ar atsinajinančiam kosuliui 2-4 metų vaikams prieš pradėjant gydymą turi būti nustatyta medicininė diagnozė. Pasireiškus dusuliui, karščiavimui ar atsisakymui gerti, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Atsargiai vartoti rekomenduojama pacientams, sergantiems gastritu ar jei yra skrandžio opa. **Reklamos teksto parengimo data 2023 m. spalio.**

BURNOS INFEKCIŲ LIGOMS GYDYTI

7⁹⁹ €



JOX 85/1 mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalo (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 ml tirpalo yra 85 mg jodo ir 1 mg alantoino. **Terapinės indikacijos:** papildomas lokalus lengvos burnos ir ryklės infekcinių ligų (faringito, stomatito, gingivito) gydymas; papildomas bakterijų sukeltų tonzilito gydymas kartu su antibiotikais; burnos ertmės infekcijos profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. „Jox“ purškalo gali vartoti suaugusieji ir vyresni kaip 8 m. vaikai. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 8 m. vaikams įprastinė dozė – purškšti 2–4 kartus per parą, bet jeigu būtina, galima vartoti ir dažniau (kas 4 val.), purškšti ne daugiau kaip 3 kartus į dieną ir kairę burnos ertmės pusę, bet ne daugiau kaip 6 kartus per parą. Perteklia tarp abiejų įpurškimų turi būti ne mažesnė kaip 4 valandos. Vaistinio preparato negalima įkvėpti ar nuryti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; inkstų funkcijos sutrikimas; dekompensuotas širdies nepakankamumas; nėštumo ir žindymo laikotarpis. 2 sav. prieš planuojamą tyrimą arba gydymą radioaktyviu jodu ir 2 sav. po to; nuolat vartoti ligoniams, kuriems diagnozuotas skydliaukės funkcijos sutrikimas; nuolat vartoti ligoniams, kurie kartu vartoja lėdo vaistinių preparatų; jaunesniems kaip 8 m. vaikams (dėl farmacinės formos). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jeigu „Jox“ atsitiktinai patenka į akis, jas reikia gerai nuplausti vandeniu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, „Jox“ purškalo reikia vartoti atsargiai. Šiems pacientams preparatas gali sukelti kepenų transaminazių kiekio padidėjimą. Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, „Jox“ vartoti draudžiama. Vaistinio preparato vartoti ilgiau kaip 7 dienas negalima. Jeigu pasireiškia jautrumas arba nuolatinis lokalus dirginimas, vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, vaistinio preparato galima vartoti tik būtinu atveju. **Reklaminiame tekste parengimo data 2024-07, OT-IT-00080 „Jox“ – VIENTELIS TOKS!**

NUO 6⁹⁹ €



VOLTAREN EMULGEL

VOLTAREN EMULGEL 23,2 mg/g gels, 50 g 6⁹⁹ €
VOLTAREN EMULGEL 23,2 mg/g gels, 150 g 18⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Diklofenakas dietilaminas. **Indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumėnų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nuogas skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 k. per parą (geriausia rytė ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbrėmimo ar egzemos vietos, didelę odos plotą, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nemuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepaileidžiančiais tvarais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitoluena. Teksto parengimo data 02/2023. Prekių ženklai priklauso Haleon arba Haleon turi jiems licenciją. ©2023 Haleon arba licencijos turėtojas. NP-LT-VOLT-23-00001

METANTIESIEMS RŪKYTI

19⁹⁹ €

NIQUITIN

NIQUITIN, 14 mg/24 val., 7 transderminiai pleistrai
NIQUITIN, 21 mg/24 val., 7 transderminiai pleistrai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: viename „NiQuitin“ 14 mg/24 val. transderminiame pleistre yra 78 mg nikotino (5 mg/cm²); viename „NiQuitin“ 21 mg/24 val. transderminiame pleistre yra 114 mg nikotino (5 mg/cm²). **Terapinės indikacijos:** „NiQuitin“ naudojamas nikotino abstinencijos simptomams, skaitant nenumaldomą norą rūkyti, lengvinti. Jei yra galimybė, metus rūkyti, „NiQuitin“ turėtų būti naudojamas kartu su elgsenos programa. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 pleistras naudojamas 1 kartą per parą, geriausia vos pabudus, ir laikomas ant odos 24 valandas. Gydymo programa sudaryta iš 3 etapų, kurių reikia laikytis nuosekliai. Kiekvieno etapo pleistrai yra skirtingų stiprumų. Naudojamas suaugusiems žmonėms, skaitant senyvo amžiaus pacientus; jei surūkote daugiau kaip 10 cigarečių per parą, reikia gydytis toliau: pirmąjį etapą (6 savaites) naudojami „NiQuitin“ 21 mg/24 val. transderminiai pleistrai; antrąjį etapą (2 savaites) naudojami „NiQuitin“ 14 mg/24 val. transderminiai pleistrai; trečiąjį etapą (2 savaites) naudojami „NiQuitin“ 7 mg/24 val. transderminiai pleistrai. Jei surūkoma 10 ar mažiau cigarečių per parą, gydytis pradėdama nuo antrojo etapo: antrąjį etapą (6 savaites) naudojami „NiQuitin“ 14 mg/24 val. transderminiai pleistrai; trečiąjį etapą (2 savaites) naudojami „NiQuitin“ 7 mg/24 val. transderminiai pleistrai. **Specialūs įspėjimai:** jeigu jūs esate 12–17 m. amžiaus; jeigu esate nėščia, ketinate pastoti arba žindote kūdikį; sutrikusi jūsų širdies veikla ar kraujotaka, skaitant širdies nepakankamumą ir stabilią krūtinės anginą, arba yra padidėjęs kraujospūdis; sergate ar anksčiau sirgote dermatitu arba kita oda liga; sergate sunkia kepenų arba inkstų liga; sergate skrandžio opalige arba yra susiję su skydliaukės funkcija; sergate cukriniu diabetu ir vartojate insuliną; jums diagnozuotas antinksčių navikas; jeigu kada nors patyrėte traukulius ar esate nuo jų gydomi; vartojate kofeiną, teofiliną, imipraminą, pentazoną, fenacetolį, fenilbutazoną, takriną, klomipraminą, vaistų nuo bronchinės astmos ar padidėjusio kraujospūdžio; jeigu jums yra skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opaligė arba stemplės ar ryklės uždegimas. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija nikotinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu nerūkote arba rūkote retkarčiais; jaunesniems kaip 12 m. vaikams; jeigu neseniai jūs išliko miokardo infarktas ar insultas; jeigu jums pasireiškia greitas, neritmiškas širdies plakimas, nestabili ar progresuojanti krūtinės angina ar neprognozuojanti krūtinės angina. Reklaminiame tekste parengimo data 2025-05-19. **MESK RŪKYTI SU „NIQUITIN“!**



NORFOS
VAISTINĖJE GALITE
PASISKIEPYTI NUO
PNEUMOKOKO

SKIEPO KAINA

84⁰⁰ €

SU LOJALUMO KORTELE

77⁰⁰ €

Nuolaidos taikomos su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“ nuolaidos netaikomos.





-40 % PREKIŲ ŽENKLAMS

-40%



MÖLLER'S ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS

MAISTO PAPILAI

Möller's – tai šimtmečiais puoselėjami žuvų taukai visi šeimai. Möller's žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniu. Tyri ir gerai išvalyti Möller's žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Įvairaus skonio kramtomosios žuvies „Möller's Junior“ yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikui organizmui naudingų medžiagų.

OMEGA-3 EKSPERTAI JAU 170 METŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%



LIVOL VITAMINAI

MAISTO PAPILAI

Skandinaviečiai maisto papildai „Livol“ sukurti, remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl labai veiksmingi. Gaminami Danijoje nuo 1959 m. Kurdami „Livol“, Skandinavijos mokslininkai įvertino skirtingus žmonių poreikius ir pasiūlė saugią dozę bei efektyvius pasisavinimo (su EC gamybos technologija) vitaminus.

„LIVOL“ – NR.1 SKANDINAVIŠKI MULTIVITAMINAI LIETUVOJE!

* Lietuvoje Nr.1 multivitaminų kat., vadovė 2024 m. (šaltinis: UAB „SoftBent“ farmacijos rinkos duomenų bazė „Pharma2009“, duomenys pagal kiekį ir vertę).

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%



VIRONOX

MAISTO PAPILAI

„Vironox“ – originalinė linija, sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų. „Stiprus imunitetas“ – sudėtyje esantis vitaminas C, cinkas bei dygliuotųjų šaltalankių vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Energijos šaltinis – „Jėgoms atstatyti“ – Kinijos žemėnų šaknų ekstraktas, padeda palaikyti normalią organizmo gyvybingumą, vitaminas B6 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir miegą. „Stiprus imunitetas“ – profilinė veikla. Raugų rodiklių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. Niasinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. „Vironox gerklės“ – šlapimo pūslės tabletės esantis išdardintų kepenų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų (gerklės, ryklės ir balso stygų) sistemos funkciją.

„VIRONOX“ – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%



ODONTE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ODONTE – tai patikimumas ir dėmesys detalėms, užtikrinantis nepriekaištingą burnos priežiūrą kiekvieną dieną.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%



INOLAB

MAISTO PAPILAI

„Inolab Atsparumas stresui“ – tai 8 veiklių medžiagų kompleksas nervų sistemai ir gerai nuotaikai. „Afroni“ šafrono ekstraktas padeda palaikyti psichinę sveikatą, teigiamą nuotaiką ir atspalaiduoti. Vitaminas B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną. „Inolab Stiprus magnis“ – tai magnio, kurkumino ir pipirinio derinys aktyviai gyvenimo būdai. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą. „Cavacurmin“ kurkuminas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių būklę. Vartojimas: gerti po 1 paketėlį per dieną. „Inolab Sirdžiai ir cholesterolio balansui“ – tai 4 veiklių medžiagų kompleksas jūsų sirdžiai, kraujagyslėms ir cholesterolio balansui. ABG25+ juodųjų ęsenakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Resveratrolis „Veri-te“ padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

ŠVEICARIŠKAS PRECIZIŠKUMAS IR SINERGINIS POVEIKIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

Skaudančiai gerklė

-40%

RHINOLAYA

MEDICINOS PRIEMONĖS

Himalajų druskos purškiklis Jums ir Jūsų kūdikiui

Vienintelis Himalajų druskos nosies purškiklis.

• Natūraliai išvalo, drėkina ir padeda atkurti užsikimšusią nosį

• Tinka šalčio, ūso ir alerginių (namų dulkių, oro taršos, gyvūnų plaukų, žiedadulkių) pažeistai nosies gleivinei

• Nedingina ir nesausina nosies gleivinės

• Skystina gleives

• Pasizymi greitu veikimu

• „RHINOLAYA“ nosies purškiklis yra bekvapis.

„RHINOLAYA PROTECT“ izotoninis, 50 ml – alerginę pažeistai nosies gleivinei.

„RHINOLAYA“ izotoninis, 100 ml – kasdieninei nosies priežiūrai, išsausėjusiai nosies gleivinei.

„RHINOLAYA FORT“ hipertoniškas, 50 ml – sloguojant, persušus, sinusito metu.

„RHINOLAYA KIDS“ izotoninis, 50 ml – užburkusiui ir išsausėjusiai kūdikio nosies gleivinei.

„RHINOLAYA“ – IS HIMALAJŲ GELMIŲ PRIEŠ ALERGIJĄ IR SLOGĄ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



Odos priežiūra ir apsauga

-40%



SUDOCREM®

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Sudocrem“ Multi-Expert skirtas įvairių iššūkių ir vystyklų bėrimų gydymui ir profilaktikai. Tinka kūdikių ir suaugusiųjų odos priežiūrai. Dėka subalansuotos sudėties, kremas švelniai gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirgiklių suformuojamas apsauginį odos barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinas gerai sugeria drėgmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebiųjų sluoksnio odos paviršiuje kaip kiti kosmetiniai kremai nuo iššūkių. Tepkite plonu sluoksniu.

„SUDOCREM“ – TRIGUBAS EFEKTAS: ŠVELNIAI GYDO, RAMINA, APSAUGO

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

MULTI-EXPERT



JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.

-40%

„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS



Pagaminta Kanadoje

-40% 8^{99€}



AMBIO

REGĖJIMUI FORTE, 30 kapsulių
REGĖJIMUI SU GINKMEDŽIO EKSTRAKTU, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

IKI -40%



VITADAY

CHOLESTEROLIUI MAŽINTI SU ČESNAKU, 30 kapsulių 9⁹⁹ 5⁹⁹ € -40 %
GINKMEDŽIO EKSTRAKTAS, 60 kapsulių 8⁹⁹ 5⁹⁴ € -35 %
MAISTO PAPILDAS

IKI -25%



COREGA

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Naudokite COREGA dantų protezų priežiūros priemones kasdien, kad drąsiai galėtumėt valgyti, juoktis ir kalbėti. COREGA pilnų/dalinųjų dantų protezų fiksuojamieji kremai suteikia trįgumą naudą: ypač stipri fiksacija visą dieną, apsauga nuo maisto dalelių bei komfortas. Be cinko, todėl tinka kasdieniam naudojimui. Visapusiškai kasdieniai dantų protezų higienai užtikrinti, naudokite COREGA valomąsias tabletes. Jos sunaikina 10 kartų daugiau kenksmingų bakterijų nei dantų pasta*.

*Laboratoriniuose tyrimuose, tik mikant.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

IKI -40%



MICROLIFE

MICROLIFE BP A7 TOUCH, automatinis kraujospūdžio matuoklis 99⁹⁹ 64⁹⁹ € -35 %
MICROLIFE BP B6 CONNECT, automatinis kraujospūdžio matuoklis 94⁹⁹ 56⁹⁹ € -40 %
MICROLIFE BP B3 COMFORT PC, automatinis kraujospūdžio matuoklis 84⁹⁹ 50⁹⁹ € -40 %
MICROLIFE NEB400, inhaliatorius, mėšiuokas 78⁹⁹ 47³⁹ € -40 %
MICROLIFE NEB 200, inhaliatorius 69⁹⁹ 45⁴⁹ € -35 %
MICROLIFE NC 200, skaitmeninis bekontaktis termometras 45⁹⁹ 29⁹⁹ € -35 %
MICROLIFE OXY 300, pulsoksimetras 47⁹⁹ 28⁷⁹ € -40 %
„MICROLIFE“ INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS

-40% 16^{97€}



GLIUKOZAMINAS PLUS KOLAGENAS, CHONDROITINAS, MSM, 120 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Padeda palaikyti sąnarių funkciją.
- Padeda didinti judėjimo komfortą.
- Padeda palaikyti išvėrimės lygį.

„GLIUKOZAMINAS PLUS KOLAGENAS, CHONDROITINAS, MSM“ – KOMPLEKSAS JŪSŲ JUDĖJIMO DŽIAUGSMUI.

NUO 4⁹⁹ €



OLFEN

OLFEN, 1 % gelis, 50 g 4⁹⁹ €
OLFEN, 1 % gelis, 100 g 7⁹⁹ €
OLFEN, 23,2 mg/g gelis, 50 g 6⁹⁹ €
OLFEN, 23,2 mg/g gelis, 100 g 9⁹⁹ €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikimo medžiaga, stiprumas. 1 g gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos arba 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkanti 20 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems ir 14 metų bei vyresniems paaugliams skirtingi lokalūs skausmo simptomai malšinti, esant ūminiams (temporiniam, patempimams ar sumušimams po blyksio traumos; minkštųjų audinių uždegimui slopinti (esant tendinitui, bursitui), 14 metų ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtingi trumpalaikiai gydymai. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Atsivėlgiant į gydymosi kimo dalies dydį, 2-4 g (maždaug 1-2 pilnos arbatšaukos), Olfen 1% gėlio tepama 3-4 kartus per parą ir toliau paskirstoma (dėl noreikio). Neviršyti 16 g gėlio paros dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo terapinio indikacijos bei vaistinio preparato poveikio. Nepažįstams su gyvybiškai, suaugusiems, Olfen 1% gėlio negalima tepti ilgiau kaip 14 parų, o paaugliams – ilgiau kaip 7 parą, jeigu per 7 dienas simptomai (skausmas, patinimas, raudonėlis, patinimas) nepagerėja, reikia kreiptis į gydytoją. Olfen 23,2 mg/g reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsivėlgiant į gydymosi patalies vietos dydį, reikia nuo viršaus iki galvos kryptimi nuolat daryti gėlio kiekio, atitinkanti 1-4 g gėlio, kuris atitinka 20-80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gėlio, kuris atitinka 185,6 mg diklofenako dietilamino (atitinkanti 180 mg diklofenako natrio druskos). Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinio ligos. Be gydytojo patarimo, Olfen negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę, jeigu per 5-5 dienas simptomai nepagerėja arba net pablogėja, būtina gydytojo konsultacija. **Kontraindikacijos.** Olfen negalima: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu žais kada nors anksčiau pavartavus acilfenilacilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kepenims (astma, bronchų spazmas), dilgėlinė sloga, vėdu arba lėtinio patinimas; esant odos arba gleivinių uždegimui, uždegimui arba infekcijai, taip pat sergant egzema; po chirurginio narkotiko vartojimo; įvairioms kaip 14 metų vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės** reikalauja, jei sergate astma, širdies, nosies gleivinės patinimas ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, širdies ir kraujagyslių ligomis, inkstų ligomis arba jų padidėjęs pavojus kitiems skausmą malšintiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumatų, taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcija, niežulys arba dilgėlinė. Kai Olfen vartojamas dideliu odos plotu ir ilgai gyvyti, negalima parengti galimo sisteminio šalutinio poveikio. Olfen galima vartoti tik ant neapibūdintų ir sveikų odos. Venkite patinimo ir jausmo kintant su gleivėmis. Nesinaudokite oral neapibūdintais vaistais. Olfen vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartojant šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų paliesti šio vaisto gydymui odos vietoje. Olfen 1% vartoti atsargiai, jeigu inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, arba turite ar buvę anksčiau skrandžio opa, žarnyno uždegimas ar esate linkęs į kraujavimą. **Tekstų peržiūros data.** Olfen 1%: 2022-06-28; Olfen 23,2 mg/g: 2023-08-19. OLF-01-00005. **Reklaminių medžiagų parengimo data** 2023 m. liepa.



LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais
8-9 val. ir 14-15 val.*

Sekmadieniais
14-15 val.*



-30%

Perkant 3**
ir daugiau
prekių

-25%

Perkant
2* prekes

-20%

Perkant
1 prekę

**nereceptiniams vaistams -25%
receptiniams vaistams -20%

* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemonė ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniais vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. 8 800 10008.

N VAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS

KOSMETIKAI „ŽIEDĖ“

iki **-40%**



IKI -40%

**EPITOME**

VITAL WOMAN'S S FORMULA, 60 minkštųjų kapsulių **27⁹⁹ 16⁹⁹ € -40 %**
 CARE SKIN FORMULA, 60 kapsulių **29⁹⁹ 17⁹⁹ € -40 %**

CARE BEAUTY MARINE COLLAGEN, milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **49⁹⁹ 32⁴⁹ € -35 %**
MAISTO PAPILAI

IKI -40%

**DAILEE****HYGIENOS PRIEMONĖS**

DAILEE LAZY PREMIUM (klotai- ora laido, ploni daup superintys, minkšti ir švelni. Pavėsius impregnavus alijošiaus ekstraktu, sauganti odą nuo sudirginimo. Pukiai prilimpa, kvatin dydžiu. **Kvapo kontrolė iki 12 val.**
 DAILEE MEN PREMIUM Level 1- klotai vyrams, patiriantiems lengvą šlapimo nelykumą. Anotomines formas, papildomi borteliai saugo nuo pratęjimo, pukiai prilimpa. **Kvapo kontrolė iki 12 val.**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-25%

**CUMLAUDE LAB****GINEKOLOGINĖS KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS**

Ispanijos ginekologų sukurti intymios higienos produktai, iš kurių kiekviena moteris išsirinkt sau tinkantį – nuo kasdienei higienai skirtų pusraklių iki priemonių lytinių organų nemaloniems simptomams ir uždegimams pašalinti bei jų dyginti.

Atraskite intymios higienos ritualus su „Cumlaude Lab“.

„CUMLAUDE LAB“ – NAUJAS POŽIŪRIS Į MOTERIS LYTINĘ SVEIKATĄ

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

SKUBIOS PAGALBOS KONTRACEPTIKAS12⁹⁹ €

AVODELE 1,5 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Avodele yra skubios pagalbos kontraceptikas, kuri galima pavartoti per 72 valandas (t. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudota kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele sudėtyje yra sintetinio hormono, veikliosios medžiagos, vadinamos levonorgestrelu. Suvaržtas per 72 valandas po nevaisingo lytinio akto, jo 79 % atvejų apsaugo nuo nėštumo. Vartojimas šiais atvejais:

– lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė.

– jei kontraceptinė priemonė naudota netinkamai.

Kaip vartoti Avodele. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Po nesaugaus lytinio akto išgerkite vieną tabletę kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 72 valandų (3 parų). Tabletę geriausia išgerti per 12 valandų. Antra tabletė išgerkite praėjus 12 val. (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgerimo. Jei žinote arba manote, jog nevalėte vėičia, Avodele galite vartoti bet kuria kito dienos, tabletę nuriję nevalėdami, užsigerkite vandeniu. Jūs bus tuo veiksmingai apsaugoti, kuo greičiau ją išgeriate. Avodele vartoti negalima, jeigu yra abejojimų levonorgestrelu arba bet kuria pagalba išvengti nėštumo (jos išvengimo informacinio lapelis šį slytį). Išėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartodama, pasitarkite su gydytoju, nes Avodele, kaip skubios kontracepcijos priemonė, jums gali netikti. Gydytojas gali jums skirti kitą skubios kontracepcijos priemonę, kaip dažnai galima vartoti Avodele. Avodele vartojama tik neatidėliotinu atveju ir nėra reguliarios kontracepcijos metodu. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visoms žmonėms. Labai dažnai: šiekulys (pykinimas); Gali būti nereguliarios pakraujavimas iki prasidedant mėnesinėms; Gali skaudėti pilvo apačią; Nuovargis; Galvos skausmas. Dažni vėrimas; Gali pakeisti mėnesinių ciklus; Išgėrus šio vaisto, gali atsirasti krūtinės jautrumas, viduriavimas, svargulo pojūtis. Labai retas: Berimės, diptelė, nešulys, vesdo patinimas, dubens srityje skausmas, skausmingos mėnesinės. Pradome įėjus perskaityti pakuotės lapelį ir vėly vartoti, kaip nurodė. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant informacinio lapelyje neminėtą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2023-09-01.

NUO 4⁹⁹ €

CANESTEN®, 10 mg/g kremas, 20 g **4⁹⁹ €**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 1 g kremo yra 10 mg klotrimazolo. **Terapinės indikacijos:** odos ir durinių gleivinių infekcija, sukeltą klotrimazoliu jautrių mikroorganizmų, grybelių, Candida sukeltą balandų grybelius. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartojamas 2-3 kartus per parą. Užtepti plonu sluoksniu ir švelniai įtrinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas klotrimazoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gali sumažinti laktacijos gamtinį veiksmingumą ir saugumą, jeigu topana lytinių organų uždeg. Poveikis pasireiškia tik gydymo metu, todėl jo metu naudokite alternatyvius apsaugos priemonės. Venkite sąlyčio su akimis. Nedėkite kremo į burną ir nerūkykite. Pacientai, gydymui imunosupresantais, chemoterapija, sirgantieji diabetu, infekcija ŽIV, jaunesni kaip 16 m. paauklę, nėščiosios per pirmąsias tris nėštumo mėnesius, prieš vartodami turi pasitarti su gydytoju. Vaikams (jaunesniems negu 12 m.) ir senyviems pacientams vartoti tik prižiūrint gydytoją. Vengti ilgalaikio gydymo dėl didesnio odos pūlimo. Galima vartoti žindymo metu, jeigu vartojamas specialus šifras, prieš maitinant reikia nusipirkti krūtis. Sudėtyje yra cisteatario alkoholio ir benzilo alkoholio, kurie gali sukelti vidinių odos bei alerginių reakcijų. **Bekamos laktacijos pareigijimo data 2024-11, CH-20240226-30**

„CANESTEN“ KREMAS - GRYBELINĖS INFЕКЦИJOS GYDYMOI!
 Nr. 1 pasakyje pagal pardavimus nereguliacijai ginekologinių, priešgrybelinių preparatų kategorijoje. Remiantis 2023 m. pasauline Nicholas Hall's OFC duomenų baze DB6

CANESTEN® 500 mg makšties minkštioji kapsulė **11⁴⁹ €**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kapsulėje yra 500 mg klotrimazolo. **Terapinės indikacijos:** makšties ir moters šoninių lyties organų infekcija, sukeltą klotrimazoliu jautrių mikroorganizmų, tokių kaip grybeliai, grybelius. **Duavimas ir vartojimo būdas:** saugojamas moters ir paauklę nuo 16 m. 1 kapsulė įdedama į makšties įėjimą (makšties), naudotant palankius esant aplinkai, geriausia gulint, vakare prieš miegą. Nėštumo metu kapsulę turi būti įdedama prieš 7 dienas apikantais. Reikalinga gydytojo konsultacija, jei simptomai nepagerėja per 7 dienas. Jaunesnės kaip 16 m. paauklę galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Saugumas ir veiksmingumas jaunesnėms kaip 12 m. mergaitėms neįrodyti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas klotrimazoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** reikia kreiptis gydytoja, jeigu makšties infekcija pasireiškia pirmą kartą, pirmąjį nėštumo trimestro metu, per pastarąsias šešis mėnesius infekcija pasikartoja daugiau nei du kartus, yra karščiavimas (≥ 38 °C), skauda apatinę pilvo dalį, nuopatai atsiranda nemalonus kvapo iškyros iš makšties; vyriaus, kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pat metu jautumas pojo skausmas. Neveiksminguma gydyti mėnesinių metu. Vartojant vaistą negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių makšties vartojamų preparatų, rekomenduojama vengti lytinių santykių. Laikyti kontraceptinių priemonių veiksmingumas ir patikimumas gali sumažėti. **Bekamos laktacijos pareigijimo data 2024-11, CH-20240226-30**

„CANESTEN“ MAKŠTIES MINKŠTOJŲ KAPSULĖ - 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINĖS INFЕКЦИJOS GYDYMAS!

INTYMIAI HIGIENAI

IKI -30%

**VAGISAN****KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS**

Priemonės „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgštis aplinka – būtina sąlyga, kad laktobacilos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos priemonės „Vagisan“ tinka kasdieni intymiajai higienai. Drėkinamos makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

TAVO INTYMIAI SVEIKATAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

MAKŠTIES MIKROFLOROS ATSTATYMOI

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė NĖMOKAMAI!



ECOCILLIN, 6 makšties kapsulės **14⁶⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

Ecocillin makšties kapsulės skirtos vaginozės, vaginito ir jų pasikartojantiems simptomams (deginimas, niežulys, nemalonus kvapo iškyros iš makšties) mašinai. Sudėtyje yra Lactobacillus plantarum P7630 gerųjų bakterijų. Greitai atstatoma makšties mikrofloros balansas po antibiotikų, kontraceptikų vartojimo bei efektyviai apsaugo nuo makšties infekcijų. Įdėti 1 kapsulę į makštį prieš miegą. Naudoti 6 dienas iš eilės arba kaip pataria gydytojas. Komforto jausmas jau pirmą rytą!

ECOCILLIN ORAL, 15 geriamųjų kapsulių **15¹⁹ €**

MAISTO PAPILAI

5 milijardai gyvųjų laktobakterijų (*Lactobacillus plantarum* P 7630, *Lactobacillus paracasei* 1688, *Lactobacillus salivarius* 1794). Vartoti po 1 kapsulę per dieną. Kapsulę nurijti užsigeriant vandeniu.

-20%

**FEMARELLE®****MAISTO PAPILAI**

„Femarelle® Rejuvenate“ („Jaunatvėskumas“). Gerai nuotaikai, odai ir nuovargio mažinimui. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B2 ir biotino.

„Femarelle® Recharge“ („Energinia“). Hormonų reguliavimui ir normaliai savijautai menopauzės metu. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B6.

„Femarelle® Unstoppable“ („Nesustabdoma“) Moterims po menopauzės normaliai kaulų būklės palaikyti. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ekstrakto, kalcio, biotino, vitamino D ir B2.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



2 UŽ 1 KAINĄ

Miegui ir nervų sistemos

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!!

NEUROMED

MAISTO PAPILDAI

Isbandykite „Neuromed Sleep FORTÉ“ – brejos efekto čulpiamąsias tabletes, kurios padės greičiau užmigti, kokybiškai išsimiegoti ir iš ryto jaustis žvaliai. „Neuromed Sleep“ – greita pagalba, kad pavyktų lengviau užmigti ir ramiai miegoti. Vartoti epizodiškai, neužmiegant, prabundant naktį. „Neuromed Relax“ – streso kontrolė ir nervų sistemos. Vartoti jaučiant laikiną nerimą ir stresą. „Neuromed Good Mood“ su safranu ir kurkuminiu – gerai nuotaikai, psichologinei funkcijai, nuovargiai mažinti. Vartoti patiriant ilgai užsčiusią stresą, jaučiant nuovargį, apledžiant pozityvius mintims.

KARTU | RAMYBĖ SU „NEUROMED“!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



Vitamino D3 šaltinis

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

OLIDETRIM®

OLIDETRIM® 2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių 10³⁵ €

OLIDETRIM® 4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių 14⁹⁹ €

OLIDETRIM® 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių 10⁰⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Imunitetu – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.

Sinčiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.

Kaulams ir raumenims – vitaminai D ir K2.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys (DHR (dokosaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų ir kremzlės funkciją, susidarymą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir raumenų funkciją.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.



Imunitetui

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!!

ISKIAL

ISKIAL MAX, 120 kapsulių 24⁹⁹ €

ISKIAL JUNIOR, 30 kramtomųjų kapsulių 22⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

„Iskial“ – ryškių kepenų aliejus iš Islandijos, papildytas didele doze vitamino D3, kuris yra svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Ryškių kepenų aliejus – tai vienas gausiausių natūralių, vertingų, biologiškai aktyvių medžiagų – alikilglicerolio ir skvaleno – šaltinių. „Iskial Junior“ sudėtyje kartu yra ir žuvų taukų, kuriuose gausu DHR rūgščių, svarbių normaliai smegenų funkcijai ir padedančių išsaugoti normalų regėjimą. Tiks vaikams nuo 3 metų. „Iskial Max“ tiks suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų.

„ISKIAL“ – RŪPINASI VISOS ŠEIMOS IMUNITETUI!



Sąnariams, kaulams, kremzlėms

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!!

MAGNEFLEX

MAGNEFLEX, 30 kapsulių 14⁹⁹ €

MAGNEFLEX, 90 kapsulių 39⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

„Magneflex“ sudėtyje yra II tipo nederatūroto kolageno kartu su magniu, vitaminu C, D3 ir B6, užtikrinančių sinerginį maistinių medžiagų poveikį. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją. Vitaminas C padeda palaikyti normalią kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlės funkcijai, susidarymą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir raumenų funkciją.

JUDEK LAISVA!



ORALFLUX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Reguliariai naudojamas „Oralflux“ gaivina burnos ertmę. Be alkoholio. Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką naudojimą. „Oralflux“ buteliukai turi naudojamas kaip pagalbines priemones valant dantis. Naudojimas: noredami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skysčio atsiras virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Kad poveikis būtų geresnis, nelygite 2 val. po skalavimo. Buteliukas turi INOVATYVŲ DOZATORIŲ – TIKSLŲ IR EKONOMIŠKŲ!

STIPRESNI DANTYS. GAIVESNIS KVAPAS. PLATESNĖ ŠYPSENA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!!

Žarnyno mikroflorai

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

ACIDOLAC® JUNIOR, 20 meškiuko formos tablečių 10¹⁹ €

ACIDOLAC® JUNIOR, 20 meškiuko formos tablečių 10¹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

ACIDOLAC JUNIOR meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų *Lactobacillus acidophilus* La-14TM ir *Bifidobacterium lactis* BI-04TM, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojamas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 meškiuko formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir gliutino.



WALMARK BIORYTHM

MAISTO PAPILDAI

Naujiena – inovatyvios formos maisto papildų linija „Walmart Biorythm“, kurią sudaro 6 produktai: cinkas, selenas, geležis, vitaminas B12, magnis, ašvaganda (migdamosos vitonijos).

Lėto atpalaidavimo mikrogulniulės, esančios „Walmart Biorythm“ linijos produktuose, išskiria medžiagas iki 8 valandų per dieną, todėl organizmas pasima įs tada, kai jam reikia.

„WALMARK BIORYTHM“ VEIKIA TAVO KŪNO RITMŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!!

2 UŽ 1 KAINĄ



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!!

VITIRON™

MAISTO PAPILDAS

„Vitiron“ D3-OMEGA3 STRONG yra didelė vitamino D3 dozė, paruošta linų sėmenų aliejaus pagrindu, o tai yra natūralios kilmės omega-3. Linų sėmenų aliejaus pagrindas skatina gerą D vitamino absorbciją ir biologinį įsisavinimą. „Vitiron“ D3 OIVE SUN – vitaminas D, išdirpintas tyrime alyvuogių aliejuje, kuris užtikrina geresnį jo pasisavinimą. Patogus ir greitas vitaminas D kiekvienam! „Vitiron“ KIDS – tai visų ir usų skonių, įvairių formų krakmolei gumukui su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. „Vitiron“ Kids grow UP – skirti vaikų kaulų augimui ir vystymuisi. „Vitiron“ Kids School for BRAIN – smegenims, normaliai psichologinei būklei, pažinimo funkcijai. „Vitiron“ Kids Sports – normaliai energijos apykaitai, o „Vitiron“ KIDS Immunity – su švamedžiųjų sultimis – imunitetui. „Vitiron“ Mind & Body FORTE – vitaminai ir mineralinės medžiagos ilgalaikiai PROTINEI bei FIZINEI išsivermei. Apropia medžiagomis, kurios yra būtinos psichinei bei fizinei išsivermei palaikyti, esant padidėjusiam stresui. „Vitiron“ Immunity STRONG – tai vitaminai ir vaistinių ekstraktai, skirti organizmo imuninės sistemos apsaugai.

VITAMINŲ GALIA VISAI ŠEIMAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

AMBIO

HYDROCONTROL SLIM, 60 kapsulių 12⁴⁸ €

MAISTO PAPILDAS



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

Inkstams ir šlapimo takams

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių 11³⁹ €

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:
– padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinų asiūklų žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė);
– padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinų asiūklų žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).
Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip 1/2 stiklinės).



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

AMBIO

KIDS VITAMINAS D3, geriamieji lašai, 10 ml 2⁴⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Tavo gliukozės revoliucijai



Stengiatės vartoti mažiau cukraus ir angliavandenių? Siekiate subalansuoti gliukozės lygį kraujyje? NatAspin® Glucose - teisingas pasirinkimas.

NatAspin Glucose – tai inovatyvi, daugiakfunkcinė formulė gliukozės kontrolei ir kraujotakai. Ji sukurta padėti kiekvienam pasiekti savo asmeninę gliukozės revoliuciją. Sudėtyje yra biologiškai aktyvių standartizuotų ekstraktų (cinamono, ožragės, vynmedžio sėklų), chromo, vitamino K₂ ir natokinazės derinys.



GLIUKOZĖS KONTROLEI



ANGLIAVANDENIŲ APYKAITAI



KRAUJOTAKAI



LIPIDŲ LYGIUI KRAUJYJE



SVORIUI IR APETITUI



LAŠTELIŲ APSAUGAI NUO OKSIDACINĖS PAŽAIDOS

Maisto papildas. Labai svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Vaistinės ožragės, cėloniniai cinamonai padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje ir apykaitą. Vaistinės ožragės padeda palaikyti normalų lipidų lygį kraujyje, normalų apetitą. Cėloniniai cinamonai padeda palaikyti normalų svorį, virškinimą bei organizmo gyvybingumą. Vitaminas K₂ padeda palaikyti normalų kraujo krešėjimą. Chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą. Tikrieji vynmedžiai padeda palaikyti normalią kraujotaką ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

1+1

16⁴⁹ €

60 dienų kursas

-40%

**AMBIO**KALIS IR MAGNIS, 60 tablečių ~~11⁹⁹~~ 6⁹⁵ €KALIS 300 mg IR MAGNIS 350 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių ~~12⁹⁹~~ 7⁷⁹ €MAGNIS, 20 tirpiųjų tablečių ~~4⁹⁹~~ 2⁶⁹ €**MAISTO PAPILDAI**

-40%

**AMBIO**ŠIRDŽIAI, 30 kramtomųjų tablečių ~~7⁹⁹~~ 4³⁷ €GELEŽIS SU B12, 30 tablečių ~~13⁹⁹~~ 8³⁹ €**MAISTO PAPILDAI**

-30%

8^{39€}**DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS D & E, 30 kapsulių****MAISTO PAPILDAS SU SALKINDKLIU**

Maisto papildas sudėtyje yra omega-3 riebiųjų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E. EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksano rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą; DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą; vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę; vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

-40%

22^{19€}**EPITOME VITAL****CARDIOVASCULAR FORMULA, 90 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

• Augalinės sudėties produktas.

• Didelės išskirtinių aktyviųjų medžiagų dozės 1 kapsulėje:

- Fermentuotų sojų ekstrakto, kuriame yra 2000 FU (fibрино vienetai) **natokinazės**- Fermentuotų ryžių ekstrakto, kuriame yra 2,9 mg **monakolino K**- Bergaminių citrinmedžių vaisių sulčių ekstrakto, kuriame yra 50 mg **polifenolų**• Dažnių ciberžolių šaknų ekstrakto kuriame yra 20 mg **kurkumino** ir 20 mg **polikosanolio**

• Sudėtyje esantis dažnių ciberžolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje bei normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją.

KOJŲ VENOMSNUO 11⁹⁹ €**VENORUTON FORTE** 500 mg, 30 tablečių ~~11⁹⁹~~ €**VENORUTON** 1000 mg, 15 šnypščiančių tablečių ~~14⁹⁹~~ €

O-(β-hidroksietil)-rutozidai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje „Venoruton forte“ tableteje yra 500 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų; kiekvienoje Venoruton šnypščioje tableteje yra 1000 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų (HR). **Indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomams (edemos, kojų nuovargio, sunkumo, skausmo, mėšlungio, parestezijos) lengvinti, hemorojaus simptomams mažinti. Papildomai diabetinės retinopatijos (diabeto komplikacijos trinkelės kraujagyslių pažeidimo) ir limfos sąstovio gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Venoruton forte“ – 1 tablete 2 kartus per parą; Venoruton šnypščiosios tabletės: 1 tablete – 1 kartą per parą. Venoruton neskirtas vartoti vaikams. Dozavimas, esant vioms indikacijoms, patenkiamas pakaitomis lapekyje arba www.vki.lt. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bei kitiems pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atargumo priemonės:** negalima vartoti, jeigu yra kojų edema dėl širdies, inkstų arba kepenų ligų. Venoruton 1000 mg šnypščiojų tablečių sudėtyje yra kalio ir natrio. Reklamos teksto parengimo data 2023 balandžio mėn. S304_S8_Venoruton_V01_LT

-40%

0^{89€}**VALIDOL, 10 čiulpiamųjų tablečių****MAISTO PAPILDAS**

Sudėtyje esantis valstinių valerijonų ekstraktas padeda atsipalaiduoti bei palaikyti gera psichologinę būseną.

Vartojimas: Tablete reikia laikyti po liežuviu tol kol ji visiškai ištirps. Vartojama po 1 tablete 2-4 kartus per dieną.

VALIDOL ACONITUM – JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!

AŠ – NE % AŠ – GYVENIMAS

Skirk 1,2% GPM ir suteik
galimybę gyvenimui tęstis



POLA
Pagalbos onkologiniams
ligoniams asociacija



-40%



AMBIO

PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 20 kapsulių 7⁹⁹ 4⁴⁹ €

VALERIJONAS PLUS, 50 tablečių 5⁹⁹ 3⁵⁹ €

MAISTO PAPILDAI

IKI -40%




AMBIO

TIRUBEN COMPLEX, 20 tablečių 7⁹⁹ 4⁷⁹ € -40 %

PASIFLORA, 60 tablečių 9⁹⁹ 6⁴⁹ € -35 %

MAISTO PAPILDAI

-40%



AMBIO

VITAMINŲ B KOMPLEKSAS FORTE, 90 tablečių 13⁹⁹ 8³⁹ €

VITAMINAS B12, 60 tablečių 5⁹⁹ 3⁵⁹ €

MAISTO PAPILDAI

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



AMBIO

ATMINČIAI PLUS, 30 tablečių + 30 kapsulių 21⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- Tiaminas, riboflavinas, niacinas, vitaminai B6, B12 ir C padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
- Tiaminas, niacinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.
- Foliatas padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą.
- Cinkas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją.
- Tik 1 kapsulė ir 1 tabletė per dieną.

-35%

4⁹³ €


RAMEVAL® 15 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- „Rameval“ – ramybės augalų puokštė lengvai nervinei įtampai, sukurta iš valerijonų, melisų, pipirinių metų, ramunų ir apynių.
- „Rameval“ padeda:
 - palaikyti normalią nervų sistemos būklę (vaistiniai valerijonai),
 - atsipalaiduoti (vaistinės melisos, pipirinės mėtos, vaistinės ramunės),
 - palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę (vaistinės melisos, paprastieji apyniai),

IEŠKAI RAMYBĖS? ATRASK JĄ SU RAMEVAL.

NORMALIAI RAUMENŲ FUNKCIJAI, NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI, ENERGIJAI

IKI -50%



MAGVIT

MAISTO PAPILDAS

- „Magvit Platinum“ – greitas ir ilgalaikis poveikis. Tabletė magniją į organizmą išskiria trimis skirtingomis fazėmis ir leidžia magnijui greitai ir ilgai veikti. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Tik 1 tabletė per parą. „Magvit Plus“ skirtas raumenims, nervų sistemai ir širdžiai. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, vitaminai B2, B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Dėl specialios ilgalaikio veikimo Depo formos vitaminai ir magnis išskiriami daugelį valandų. Tik 1 tabletė per parą. „Magvit B Complex“ sudėtyje yra 400 mg magnio ir 8 B grupės vitaminai. Tinka vartoti fizinio krūvio metu. Magnis, vitaminai B2, B6, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 m. – gerti po 1 tabletę per dieną. „Magvit G0“ – raumenims, nervų sistemai, energijai. „Magvit G0“ buteliukuose esantis magnis gaunamas iš organinės formos ir jau šitip, todėl organizmas lengviau jį pasisavina, palyginti su įprastomis tabletėmis. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Magnis taip pat padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją. Naudojimas: suaugusiems ir paaugliams nuo 14 m. gerti 1 buteliuką per dieną.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

LENGVAI NERIMUI MALŠINTI IR MIEGUI PALENGVINTI

NUO 6⁹⁷ €


LILANDOR

LILANDOR 80 mg, 14 minkštųjų kapsulių 6⁹⁷ €

LILANDOR 80 mg, 28 minkštųjų kapsulių 11⁹⁷ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

- „Lilandor“ 80 mg minkštųjų kapsulių, Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus, „Lilandor“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliąsiai arba bet kuriai nurodytai pagalbine medžiagai. **Specialūs spėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes lavandulio aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai salinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštąjoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolo. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštąji kapsulė viena kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesuskramtytą užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos išspleto po vaisto vartojimo vartojimo. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163 Panuosta 2023 m. gruodžio mėn. LT_21_2023_VI_pirnt

ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ

-40%


B TOTAL + MAGNE, 60 kapsulių 12⁹⁹ 7⁵⁵ €

MAGNIS + B₆ COMPLEX, 30 kapsulių 14⁹⁹ 7¹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- „B total + magne“ sudėtis praturtinta ir magnijui, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei normalią raumenų funkciją ir padeda mažinti nuovargį. Pakuotėje yra 2 mėnesių kursas. „Magnis + B₆ complex“ sudėtyje magnis yra magnio oksido pavidalu. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą, Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda palaikyti normalią kaulų, dantų būklę, normalią raumenų funkciją, padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-40%

**AMBIO**LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS SU S.BOULARDI, 20 kapsulių **14⁴⁸ 8⁶⁹ €**LAKTO-BIFIDOBAKTERIJŲ KOMPLEKSAS, 20 kapsulių **9⁹⁸ 5⁹⁹ €**KOMPLEKSAS ŽARNYNUI SU GEROSIOMIS BAKTERIJOMIS, 30 kapsulių **12⁴⁸ 7⁴⁹ €****MAISTO PAPILDAI**

-35%

**AMBIO**KEPENIMS SU MARGAINIU FORTE, 30 kapsulių **9⁹⁸ 5⁹⁸ €**DETOX COMPLEX, 10 kapsulių **5⁴⁸ 3⁵⁶ €****MAISTO PAPILDAI**

-30%

7^{48€}
~~10^{48€}~~**AMBIO**

HYDROLIT COMPLEX, 10 pakelių

MAISTO PAPILDAS

- Ašvielių skonio milteliai.
- Kalis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą.

-30%

0^{41€}
~~0^{58€}~~**VITADAY**

AKTYVINTOJI ANGLIS, 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

IKI -40%

**LINEX®****MAISTO PAPILDAI**

Vienoje „Linex® Complex“ kapsulėje yra 10 mld. moksliškai ištyrty gyvų *Lactobacillus rhamnosus* GG bakterijų, taip pat vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje „Linex® Forte“ kapsulėje yra 2 mld. gerai žinomų ir moksliškai ištyrty gyvų *Lactobacillus acidophilus*, DSM 13241, ir *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954, bakterijų. Vienoje „Linex® Kids“ paketėlyje arba 6-ioje „Linex® Baby“ lašuose yra 1 mld. *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954, bakterijų. **Vartojimas:** „Linex® Complex“ suaugusiems ir vyresniems nei 6 m. vaikams gerti po 1-2 kapsules per dieną. „Linex® Forte“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams gerti po 1 kapsulę 1-3 kartus per dieną; 3-12 m. vaikams – po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną. „Linex® Kids“ kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 1 pakelį 1 kartą per dieną. „Linex® Baby“ naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 6 lašus 1 kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52403156085. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

KOKYBĖ, KURIA GALIMA PASITIKĖTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO PILVO PŪTIMO

-20%

**SIMETIGAST FORTE**240 mg kapsulės, 10 kapsulių **2⁹⁸ 2³⁷ €****SIMETIGAST FORTE**240 mg kapsulės, 60 kapsulių **9⁴⁸ 7⁵² €****SIMETIGAST FORTE BABY**geriamieji lašai, 30 ml **5⁴⁸ 4³⁵ €****MEDICINOS PRIEMONĖS**

„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, rugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2-3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.

GREITAI PAGALBA ĮSPŪSTAM PILVUI.**ESANT HEMOROJUI**

-20%

**MASTU**MASTU, tepalas, 30 g **10⁹⁸ 8⁷⁸ €**MASTU, 10 žvakučių **11⁹⁸ 9⁵⁸ €****MEDICINOS PRIEMONĖS**

Veiklosios medžiagos: biogeno subgalatas, titano dioksidas (E171). „Mastu“ tepalas ir žvakutės yra medicinos priemonės, skirtos naudoti esant hemoroidams. Jos slopina negalavimus, kurie dažnai atsiranda esant hemoroidams: sudirginimą, niežulį, uždegimą, šlapinimą, skatiną žaizdos gijimą. Naudojimas: tepalo – 2-3 kartus per dieną, žvakučių – 2 kartus per dieną. „Mastu“ tepalą ir žvakutes vartoti draudžiama, jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) vienai iš sudedamųjų dalių.

PAGALBA ESANT HEMOROJUI.NUO 5⁴⁹ €**FORLAX,**FORLAX, 10 g milteliai geriamajam tirpalui paketėlyje, 10 paketėlių **5⁴⁹ €**FORLAX, 10 g milteliai geriamajam tirpalui paketėlyje, 20 paketėlių **9⁴⁹ €****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Terapinės indikacijos. Simptominis suaugusių žmonių ir vyresnių negu 8 m. vaikų vidurių užkietėjimo gydymas. Vaikams gali būti skiriamas ne ilgiau kaip 3 mėnesių trukmės gydymo kursas. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Vartoti per burną. Reikia gerti 1-2 paketėlius per parą. Paros dozė geriau gerti iš karto ryte. Kiekvieno paketėlio turinį prieš pat vartojimą reikia išpilti stiklinėje vandens (mažiausiai 50 ml). **Kontraindikacijos.** Sunkios uždegiminės žarnų ligos (ovz., opinis kolitas, Krono liga), toksiinė didelė gaubtinė žarna (megacolon); virškinimo trakto perforacija arba jos išsivystymo rizika; žarnų nepraeinamumas, žarnų žarnų obstrukcija ar simptomine stenozė; neaiškios priežasties pilvo skausmai; padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Suaugusiems, vartojusiems preparatų, kurių sudėtyje yra makrogolio (polietilenglikolio), pasireiškė alerginių reakcijų, įskaitant bėrimą, veido ir gerklės patinimą (angioneurozinę edemą). Buvo užregistruotos kelios sunkios alerginės reakcijos, įskaitant alpimą, kolapsą, dusulį ir prastą bendrą savijautą. Jeigu jums pasireiškia šie simptomai, nutraukite „Forlax“ vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Kadangi šis vaistas kartais gali sukelti viduriavimą, prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, jeigu: yra sutrikusi kepenų ar inkstų funkcija; vartojate diuretikus (šlapimo išskyrimą skatinančius vaistus) arba esate vyresnio amžiaus, nes tuomet galima natūralio išdžiūvimo ar kelių kitokių sumažėjimo kraujyje rizika. Jei žinoite, kad jums yra rimto sutrikimas, prieš vartojimą „Forlax“ pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. **Registruotojas.** „IPSEN Consumer HealthCare“. Praneškite apie šalutinį poveilį registruotojui vietiniai atstovai: „Mayoly Baltics“, UAB, el. paštu vigilance.BAL@mayoly.com. Teksto peržiūros data 2024-04-01. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-01. FOR-LT-2025-0019

12⁹⁷ €**VOLTAREN AKTIGO**

140 mg vaistinis pleistras, 5 vnt.

Diklofenako natrio druska.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos. Trumpalaikis (ne ilgiau kaip 4 d.) vietinis simptominių ūminių patempimų, audinių įbrėkimų, sumušimų, atsitakančių dėl rankų ir kojų taušimų (pvz., sporto taušimų), gydymas.

Vartojimas. Suaugusiems ir paaugliams nuo 16 m.: priklijuoti 1 vaistinį pleistrą ant skausmingos vietos 2 k. per parą, ryte ir vakare. Negalima vartoti daugiau kaip 2 pleistru per parą.

Kontraindikacijos. Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, aktyviam skrandžio ar žarnyno opa, paskutinis nėštumo trimestras, vėdikis ir paangijimas, įaugęs nei 16 m., žvėris ar šunys, įaugęs, dirgli oda, nosies gleivinės sudirginimas ir tirimas, paviršius antibiotikų vartojimo ar kitų vaistų nuo skausmo ir uždegimo. Negalima pleistro klijoti ant padėtos odos.

Specialūs įspėjimai. Po pleistro odos išbėrimas, reikia nedelsiant nuimti pleistrą. Skatinti poveikį galima sumažinti, vartojant mažesnę veiksmingą dozę trumpesniu laiku. Pleistras neturi būti klijuojamas ar kitaip kontaktuoti su akimis ar gleivinėmis, atsargiai naudoti senyviems pacientams dėl didesnės šalutinio poveikio tikimybės. Nenaudokite šio pleistro ir kitų vaistų su diklofenaku tuo pačiu metu. Pleistras su gydytoju, siegiant ar sirgiant bronchine astma arba alergija, keičiate nuo riebių, širdies ar kepenų uždegimų, vėdikio esant kardiopatiškai ar žarnyno opa, žarnyno uždegimo arba būtinai padidėjusį polinkį kraujavimui. Po pleistro nuėmimo, vėdikio gydymas vietos kontakto su saule ar saulės spinduliais, teksto parengimo data 02/2023, NP-17-VOLT-23-00000.

AUSŲ SKAUSMUI MALŠINTI-20% 8^{63€}**FONIX® EAR PAIN** purškalas, 15 ml**MEDICINOS PRIEMONĖ**

Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip:

- skausmas
- infekcijos
- susikaupusi siera
- dirginimas

„Fonix“ Ear Pain“ yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra augalinių aliejų mišinio, skirto ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti.

Sudėtis: alyvuogių aliejus, indrių sezamų aliejus, guščijų senųjų ekstraktas, filosterolių kompleksas, bisabololis, kvapiųjų murejų lapų aliejus, celiuliozės cinamono lapų aliejus, vėglinių ekstraktas, medų aliejus.

Suaugusiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams.**Vartojimas:** purškšti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.-25% 5^{02€}**AMEDIPLUS**

Šildantis arklų balzamas, 250 ml

Šaldantis arklų balzamas, 250 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖSNUO 2⁹⁹ €**VOLTAREN AKTI**12.5 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 2⁹⁹ €25 mg, 10 minkštųjų kapsulių 5⁹⁹ €

Diklofenako kalio druska.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos. Trumpalaikis nesunkus ir vidutinis sunkumo skausmas (pvz., galvos, dantų, mėnesinių, nugaros, sąnarių ir raumenų), persilimo ir gripo simptomų, įskaitant karščiavimą, malšinimas.

Vartojimas. Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: **12.5 mg tabletes** pradinė dozė – 2 tab., vėliau vartoti po 1 ar 2 tab. kas 4–6 val., jeigu reikia. Nevirškinti daugiau kaip 8 tab. per 24 val. 25 mg kapsules: pradinė dozė – 1 kapsulė, vėliau vartoti po 1 kapsulę kas 4–6 val., jeigu reikia. Torteli ne daugiau kaip 3 kapsules per 24 val. Vartoti ne ilgiau kaip 5 paras skausmo malšinimui ir ne ilgiau kaip 3 paras karščiavimo malšinimui.

Kontraindikacijos. Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, širdies ligos, galvos smegenų kraujagyslių ligų, sutrikusi kraujotaka, skrandžio ar žarnyno opa, sunkus inkstų ar kepenų nepakankamumas, kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo pakartojimas, paskutinis nėštumo trimestras.

Specialūs įspėjimai. Skatinti poveikį galima sumažinti, vartojant mažesnę veiksmingą vaisto dozę trumpesniu laiku. Pleistras su gydytoju, jeigu kada nors turėjote vėdikimo traktą sutrikimų, siegiant ar sirgiant žarnyno ligomis, yra pasireiškę nemalonus pojūtis skrandyje ar rėmu, neseniai atlikta arba bus atliekama skrandžio arba žarnyno operacija, vartojate kitų vaistų nuo skausmo ar uždegimo, sergate bronchiu astma arba šienlige, kepenų ar inkstų ligomis, sergate arba sirgote širdies liga arba yra padidėjęs kraujospūdis, bėrimas pėdos, esant reikiu daug skysčių, yra kraujavimų sutrikimų ar kitų kraujavimų, rūkote, sergate diabetu, yra padidėjęs cholesterolis ar trigliceridų kiekis. Senyviems pacientams labai svarbi slauga praeiti gydytoju apie padėtinius šalutinius poveikius. Tablečių sudėtyje yra laktozės ir natrų, kapsulių sudėtyje yra sorbitolio ir manitolio. Teksto parengimo data 02/2023, NP-17-VOLT-23-00000.

-25% 2^{24€}**AMEDIPLUS**

pleistrai nuospaudoms, 7 x 2,2 cm, 10 vnt.

MEDICINOS PREKĖS**AUSŲ UŽDEGIMUI GYDYTI**5⁷⁵ €**OTIPAX®** 40 mg/10 mg/1 g, ausų lašai (tirpalas)

Fenazonas / lidokaino hidrochloridas.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: veikliosios medžiagos yra fenazonas ir lidokaino hidrochloridas. 1 g ausų lašų yra 40 mg fenazono ir 10 mg lidokaino hidrochlorido. Farmacinė forma: ausų lašai (tirpalas).

Terapinės indikacijos: ūminio neperforuoto (kai ausies būgnelis nėra įtrūkęs) vidurinės ausies uždegimo, pūslinio virusinio ausies uždegimo ir slėgio pokyčių metu atsiradusios traumos sukeltos ausies uždegimo gydymas, turi skausmo malšinamąjį poveikį.

Vartojimo būdas ir dozavimas: lašinti po 4 ausų lašus 2–3 kartus per dieną į išorinę ausies ertmę.

Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Otipax“. Prieš vartojant „Otipax“ ausų lašus, Jūsų gydytojas turi patikrinti, ar nėra pažeistos ausies būgnelis. Šio vaisto negalima nuryti ar įkvėpti. Saugokitės, kad jo nepatektų į akis ar ant gleivinių.

Kontraindikacijos: „Otipax“ vartoti draudžiama, jei yra ausies būgnelio įtrūkimas, atsiradęs dėl traumos ar infekcinio ligų; jeigu yra alergija fenazonui, lidokaino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai.

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą: „Biocodex Oy“ Lietuvos filialas, Savanorių pr. 345, LT-51480 Kaunas, tel. +370 37 408 681, el. paštas info@biocodex.lt.

ID dab69672. Reklamos parengimo data 2025-03-14.

ABRAKADABRA – IR AUSŲ SKAUSMO KAIP NEBŪTA!Pasiūlymai galioja **2025 04 01 – 2025 04 30**.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoji, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbų įvairi ir subalansuota

mitybė bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. +370 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 29 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2025 03 19.



— ŠLAPIMO TAKŲ SISTEMAI —

-30%



URINAL

MAISTO PAPILDAI

„Urinal“ – šlapimo takų sistemos. Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys.
„Urinal Akut“ – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „ExoCyan“, paprastųjų rykštenių ekstrakto ir vitamino D derinys.
„Urinal sirupas“ – tirkla vaikams nuo 1 metų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-25%



„SMARTHIT IV“ EFEKTYVAUS PASISAVINIMO MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

Mūsų technologijos dėka pagaminami produktai, kurie pasisavinami itin gerai. Be to, mikrokapsulės sumažina šaltinių poveikio riziką. Efektyvus pasisavinimo maisto papildas SMARTHIT IV turi šiuos ypatumus:

SMARTHIT IV Lactoferrin – Laktoferrinas – tai galingi šaltiniai, turintys daugybę naudingų savybių. Galima vartoti kartu su SMARTHIT IV Ferum kapsulėmis arba SMARTHIT IV Ferum Liquid skysta geležies forma, tinkama suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.
SMARTHIT IV Ferum Gummies – pirmoji mikrokapsulė geležies guminukai.
SMARTHIT IV Vitamin B5 – kaulams, dantims, sausumams.
SMARTHIT IV Vitamin B5-K2 – silpnėjusiems, vitaminų B5 ir K2 poveikis kaulams ir kraujotakai.
SMARTHIT IV Vitamin B12 – normalia kraujotakai bei psichologinei funkcijai palaikyti ypač daug dirbančioms ir besimokančioms.
SMARTHIT IV Polifenol – polifenolų šaltinis gerai saugojamas.
SMARTHIT IV Curcumin – mikrokapsulė turinti formą, kuri padeda geriau įsisavinti šaltinį, palaikyti imuninę sistemą, normaliai cholesterolio lygį kraujyje palaikyti.
Naujesnis SMARTHIT Curcumin-Beta-glucan – mikrokapsulė turinti formą, kuri padeda geriau įsisavinti šaltinį, palaikyti imuninę sistemą, cholesterolio ir gliukozės kontrolę. Išbandykite!
„SMARTHIT IV“ – MENAS VEIKTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-15% 36^{97€}

LIDONIUM® 700 MG, 42 tabletės

SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS SU UGNIAŽOLE

Tik mitybos reguliavimui esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, vėžio profilaktikos metu, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvyminį kokybę, bei esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūslės latakų kvėpavimo takų spazmams, uždegimams

-20%



FLEXISEQ

FLEXISEQ OSTEOARTHRITIS gelis sąnariams 50g, N1 ~~34⁹⁹~~ 25⁹⁹ €

FLEXISEQ JOINT WEAR&TEAR gelis sąnariams 50g, N1 ~~23⁹⁹~~ 19⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Flexiseq Osteoarthritis“ – didelio veiksmumo formulė, sukurta specialiai osteoartrito sukeltiems simptomams mažinti. Gelis pagamintas iš nanostruktūros mikrokapsulių „Sequessome™“, kurias sudaro natūralios, žmogaus organizme esančios molekulės, vadinamos fosfolipidais. Mikrokapsulės prasiskverbia į odą ir tiesiogiai jungiasi prie sąnario kremzlės paviršiaus, todėl padeda mažinti sąnarių paviršių trintį, skausmą ir gerina sąnario skysčio kokybę. Ne sukelia širdies ir skrandžio sutrikimų rizikos.

Jei esate aktyvus, sportuojate, bet jaučiate sąnarių skausmus ir sąstingį, sąnariams kasdien prižiūrėti rinkitės optimaliausią veiksmingumą preparatą „Flexiseq Joint Wear & Tear“.

„Flexiseq“ tinkamas reabilitacijai pooperaciniu laikotarpiu. Naudoti gelį visiškai saugu – jo sudėtyje nėra farmaciniai aktyvių sudedamųjų dalių, galinčių sąveikauti su kitais vartojamais vaistais. Gelį galima naudoti ir su receptiniais vaistais nuo uždegimo.

NANOTECHNOLOGIJOS ŠIANDIEN – JUO DĖJIMO LAISVĖ RYTOJ!

AR SĖDĖDAMI KENČIATE
NUO SKAUSMO IR NIEŽĖJIMO
IŠANGĖS SRITYJE?
**TAI GALI BŪTI
HEMOROJAUS
SIMPTOMAI!**



Procto-Glyvenol
EFEKTYVIAI MAŠINA
HEMOROJAUS
SUKELTUS
SIMPTOMUS:
• SKAUSMA, NIEŽULI,
• DEGINIMO JAUŠMA
• GERINA
• KRAUJAGYSLIŲ
TONUSĄ

PROCTO-GLYVENOL žvakutės, N10

PROCTO-GLYVENOL tiesiosios žarnos kremas, 30 g

PROCTO-GLYVENOL skirtas lokaliu simptomams vidinio ir išorinio hemorojaus gydymui. Vartoti į tiesiąją žarną, po 1 žvakutę du kartus per parą arba kremu galima tepėti išangės aplink du kartus per parą, ryte ir vakare, kol išimama ligos požymiai išnyks, paprastai 7-10 dienų. Po to doze galima sumažinti ir vartoti vieną kartą per parą ne ilgiau kaip 3 savaites, jei reikia. Vartoti draudžiama jei yra padidėjęs jautrumas viena ar abiejų kuriai pagalbiniui PROCTO-GLYVENOL medžiagai. Atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sunkia kepenų liga, šaugofis, kasd nepateikiu j oks, negalima nuryti. Nerekomenduojama vartoti vaikams.
Reklaminių medžiagų paruošimo data – 2025/03

RECORDATI

-30% 11^{19€}

ISEREN, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių izoflavonų.

Vartojimas: po vieną tabletę per dieną.

-20% 4^{39€}

GLICINAS, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: glicinas (65 % grynojo kiekio), dekstrozės monohidratas, kukurūzų krakmolas, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebiųjų rūgščių magnio druskos. Grynosios druskos: 7,6 g. Vartojimo būdas: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Tabletes laikyti po liežuviu, kol ištirps. Rekomenduojame suvartoti per parą kiekį (3 tabletes) yra 300 mg glicino. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakeikalas. Laikyti sausoje, tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g. 28, Vilnius. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Žarijų g. 28, Vilnius

-40%

ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 50 ml ~~9⁹⁹~~ 5⁹⁹ €ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 100 ml ~~12⁹⁹~~ 7⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Šaltalankių aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir širdies veiklą, normalų virškinimą, normalią odos būklę. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.

-25%**SILVANOL****MEDICINOS PRIEMONĖS, MAISTO PAPILDAI**

„Silvanols“ derina žinias apie augalų gydomąsias savybes su naujausiomis technologijomis, siekiami geriausių rezultatų ir patenkinti žmonių poreikius. Mums garbė naudoti tik natūralias medžiagas, išsaugant jų vertingąsias savybes.

Visos „Faringo spray“ sudėtyje esančios medžiagos – natūralios aliejai, kurie padengia gerklės gleivinę, mažina peršėjimo pojūtį, lengvina rijimą, mažina skausmą ir skatina pažeistos gleivinės gijimą. Galite rinktis iš kelių skonių: apelsinų, mėty ir klasikinio. Veiklosios medžiagos: šaltalankių aliejus, medetkų žiedų aliejinis ekstraktas.

„Laringo spray“ naudojamas burnos ertmės ir ryklės gleivinės sudirginimui mažinti esant uždegimui arba po atliktų procedūrų. Veiklosios medžiagos: propolio tirpalas etilo alkoholyje, medetkų žiedų tinktura.

„Faringo lollipop“ – šaltalankių ledinukai su vitaminu C, „Faringo Soft pastilles“ – minkštos pastilės gerklės su šaltalankių aliejumi, hialurono rūgštimi, vitaminais B₁, B₂ ir C bei biotinu. Dvigubotėje šaltalankiai padeda drėkinti gleivinę ir palaikyti normalią jos būklę. Dvigubotėje šaltalankiai ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Silvadeo“ kapsulės – natūrali priemonė su augalų ekstraktais emociškai pusiausvyrai palaikyti. Sudėtyje esančios medžiagos prisideda prie nervų sistemos veiklos ir geros savijautos.

„Atmosil“ kapsulės ir balzamas – augalinė pagalba kvėpavimo takams, lengvesniam kvėpavimui ir gerai savijautai.

**RAUMENIMS, SĄNARIAMS IR ODAI****-25%****DR.THEISS PREPARATAI****KOSMETIKOS PRIEMONĖS IR MEDICINOS PRIEMONĖ**

KAULAZOLIŲ PREPARATAI dėl sudėtyje esančio regeneruojančiomis savybėmis pasižymio alantoino tinko nugarai, raumenims, sąnariams (įtrinti). Taip pat surušimams, patempimams, odos pažeidimams, skilinėjantiems kulnams priežėtai. Pagal poreikį galima rinktis kaulazolių tepalą, gelį ar šildantį kremą. DR.THEISS SILDOMASIS PLEISTRAS. Šildo ir mažina skausmą ir joje esančios medžiagos padeda drėkinti odą ir mažinti skausmą.

DR.THEISS KAULAZOLIŲ PREPARATAI – SENOLIŲ IŠMINTIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

SKYSTI VITAMINAI VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS**-15%****OILEDIXIN****MAISTO PAPILDAI**

„Oiledixin vitaminai A+E“ vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. „Oiledixin vitaminas D3“ skirtas papildyti mitybą vitaminu D3 (cholekaliferoliu). Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir normalią kaulų būklę.

„Oiledixin Niam-Niam“ skirtas papildyti vaikų ir suaugusių mitybą vitaminais ir mineralais. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą.

„Oiledixin Vitaminas C“ pagamintas specialiai vaikams lašu forma, todėl jame esanti vitamina C patogu dozuoti mažioms, t.y. vaikams skirtoms, dozėmis.

„Oiledixin B grupės vitaminai“ skirti papildyti kasdieninę mitybą B grupės vitaminais ir GABA. Vitaminai B6, B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-10%**2^{96€}****GINTARO RŪGŠTIS, 20 tablečių****MAISTO PAPILDAS**

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną valant.

Rekomenduojamame suvartojimo paraiškijoje yra 0,3 g gintaro rūgšties.

Gaminioje: UAB „Medicada Filia“, Žarijų g.28, Vilnius

Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 28, Vilnius

NUO ALERGIJOS**4^{49€}****CETIRIZIN ACTAVIS 10 mg, 10 dengtųjų tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

„Cetirizin Actavis“ 10 mg plevėle dengtos tabletės. Kiekvienoje plevėle dengtoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems žmonėms ir 6 metų amžiaus bei vyresniems vaikams cetirizinas vartojamas sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus: 5 mg (pusė tabletės) du kartus per parą. Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams: 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, dozė reikia mažinti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino darinui. Pacientai, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas mažesnis negu 10 ml/min.). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarus su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Cetirizin Actavis“, jeigu sergate inkstų nepakankamumu (jei būtina, jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Keikalinga dozė nustatys gydytojas); jei yra rizikos veiksniai, galintys sukelti šlapimo susilaikymą; jei sergate epilepsija ar jums gali būti traukulių. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 gegužė. OT-C-00060

-30% 251^{30€}**VILIM BALL****MEDICINOS PRIETAISAS**

„VILIM ball“ yra medicinos mechaninių virpesių fizioterapijos prietaisas, kuris gali laikinai sumažinti **esencialinio tremoro** ir **Parkinsono ligos** sukeliamus rankų drebinimo simptomus. Po terapijos ranka tampa stabilesnė, lengviau atlikti kasdienes veiklas: valgyti, rašyti, dirbti kompiuteriu / telefonu ir pan. Teigiamas terapijos poveikis gali trukti **iki 4 valandų** (vidutiniškai apie 1,5 val.).

-30%**VIRIDIAN****MAISTO PAPILDAI**

„Viridian“ – aukštos kokybės maisto papildai bei cheminių užpildų, risikių ir pridėtinių priedų. Atsiradę didelį „Viridian“ maisto papildų asortimentą sau ir visai šeimai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

5⁹⁹ €

ACIC 5 % kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** odos ir lūpų pūslelinė, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciclovirui, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms medžiagoms. Netepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vartoti draudžiama nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals“ d.d. filialas, Upės g. 21-1, LT-08028 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 265 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240336084. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-03.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!

7⁹⁷ €

TERBINAFIN-RATIOPHARM 10 mg/g kremas, 15 g.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremas. 1 g kremo yra 10 mg terbinafino hidroklorido. **Indikacijos:** Odos infekcija, sukelta dermatofitų, tokių kaip Trichophyton, Microsporum canis ir Epidermophyton floccosum; mielaiagrybių, daugiausia Candida genties; įvairiaspalvė dermė, sukelia Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Suaugę ir pagyuliai (>12 metų amžiaus): pėdos grybelis, blauzdos grybelis ir liemens grybelis: 1 k. per parą savaitę laiko; odos kandidozė: 1 k. per parą 1-2 savaites; įvairiaspalvė dermė: 1-2 k. per parą 2 savaites. Tepti ant sausos ir švarios odos. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremas turi būti tepamas ant pažeistos ir aplinkinės odos plonu sluoksniu ir tada švelniai įtrinamas. Jei infekcija yra raukšlėse (po krotimi, tarpupirščiuose, sėdmenų raukšlėje arba kirkšnyje), po kremo užtepimo odą galima uždenkti steriliu marės gabaliu, ypatingai naktį. Simptomų palengvėjimas dažniausiai atsiranda per kelias paras. Nereguliarius vartojimas arba ankstyvas nutraukimas padidina simptomų pasikartojimo riziką. Jei per 2 sav. nesterėbama pagerėjimo, diagnozė turi būti svarstoma iš naujo. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą nepakanka. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremas yra skirtas tik išoriniam vartojimui. Sąlyčio su akimis turi būti vengjama. Galai atbrasti akių dirginimo požymius. Įvykus atbrastai sąlyčio su akimis, gerai išplaukite jas tekančiu vandeniu. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje esantys cetoestearilo alkoholis ir cetilo alkoholis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų ir nesukyti vietinių sudirginimų. **Reikiamos teksto parengimo data:** 2023 gegužė. OTC-LT-00061

-20%





TYLUS RŪPESTIS

Pastebėkite tuos, kurie rūpinasi
ir slaugo savo artimuosius.
Padėkite jiems kasdienybėje,
kad jie nesijaustų vieni.



Skenuokite QR kodą
ir sužinokite daugiau
apie iniciatyvą.

www.gintarine.lt/tylus-rupestis



Gintarinė
vaistinė

rūpinkimės tais, kurie rūpinasi kitais

NUO NAGŲ GRYBELIO

-30%



NAILNER

Įrodytas veiksmingumas:

• gydo nagų grybelį;

• su oru lėdžiu nagų lakus;

• padeda nepažeistoms odos ir pažeidimus, atsiradusiems nagų pažeidimų infekcijai.

Nailner Tęptukas nagų grybeliui gydyti 2in1 5ml, Nailner Pielėtuks nagų grybeliui gydyti 2in1 4ml – greitai matomiems rezultatams. Ši priemonė ne tik gydo nagų grybelį, bet ir greitai pašalina infekcijos pažeistą nagą. Papildoma švelniama medžiaga leidžia nagui atgauti dailesnę išvaizdą vos per 7 dienas. **Kaip velti „Nailner“?** Priemonė „Nailner“ efektyviai gydo ir užkerta kelią grybelinei nagų infekcijai. Unikali patarimo sistema leidžia komponentams visiškai prasiskirti į nagą ir kovoti su grybeliu iš pagrindo – priemonė padeda nagui apsikvi, kart tampa nepažeidžiamu grybeliui. Apsaugo nagą atėjusį nagų nuo infekcijos. Medžiagos priemonė „Nailner Treat & Colour“ specialiai sukurta nagų grybelio pašalinimui. **Tęptukas „Nailner“, Nailner Pielėtuks nagų grybeliui gydyti 2in1 4ml** gydo ir užkerta kelią grybelinei nagų infekcijai. Jis tįsiai kovoja su grybeline nagų infekcija.

• praskiedžiama: įvairios sudedamosios dalys įsigeria į nagą ir kovoją su grybeliu;

• šalina infekciją: „Nailner“ sumažina nagų griūvį, padidina nagų grybelio pašalinimą ir grybelio sunaikinimą;

• užkerta kelią naujoms infekcijoms: profilaktiškai tepamas kasdien, „Nailner“ apsaugo nagą išvengti naujų nuo infekcijos.

Oru lakus nagų lakus „Nailner“ padeda nepažeistoms, nudžiūdimoms nagų patalaukti natūralia spalva, todėl tai yra idealus sprendimas avint abivus batūs. Oru lakus nagų lakus gali būti naudojamas ir užkirstiems, ir sveikoms nagams lakuoti.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -30%



URGO

„Urgo“ pleistrai – inovatyvūs produktai padės prižiūrėti paviršines žaizdas. Tai patogūs, alergijos nesukeliantys bei oru pralaidūs pleistrai, kurių neliopio pleistro pagalvėlė impregnuota antiseptiniu tirpalu, žaizdeles sauganti nuo bakterijų.

„Urgo Filmogel“ geliai – naujos kartos technologija pažeistiems nagams, pūslelinė, burnos žaizdoms, gelis odos įtrūkimams ir purkšiamas pleistras maziems odos įtrūkimams.

„URGO“ – PLEISTRŲ EKSPERTAI JAU 60 METŲ. PRIŽIŪRIMAS ŽAIZDOS GYJA GREIČIAU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

DANTŲ PROTEZŲ KLJIAI

-30% 9^{79€}

BLEND-A-DENT

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

BLEND-A-DENT REGULAR, 47 g (x2 pakuotės)

BLEND-A-DENT FRESH, 47 g (x2 pakuotės)

Fiksujamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgoite, galite patikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantenių bei dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezus. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivarždami.

-40% 12^{89€}

boderm



OLIPROX nagų lakas grybeliui

(gelis vandens pagrindu), 12 ml

„Oliprox“ nagų lakas (gelis vandens pagrindu) – veiksminga priemonė, padedanti užkirsti kelią grybelinei infekcijai bei pagalbiniu priemonė gydant onichomikozę (nagų grybelį).

IKI -30%



JORDAN

BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai – nuo pirmo dantuko! Rinkitės dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.

„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną pakuotę, antrą tokią patį arba pigesnę – NĖMOKAMAI!!



ROYAL DENTA dantų šepetėliai

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Royal Denta“ dantų šepetėliai valo geriau! Įsigykite dabar ir įsitikinkite!

Atsirkite „Royal Denta“ dantų šepetėlių valymo galią ir mėgauskites spindinčia šypsena ir gaiviu burnos kvapu.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-35%



VELYM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

VELYM 100 ml balinamasis dantų kremas. Dabar virš 95% ingredientų yra natūralios kilmės medžiagos.

Nauja, tvirta, perdirbtos plastiko tubelė.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-25%



TEPE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Produkcija „TePe“ pagaminta bendradarbiaujant su Švedijos ir tarptautiniais odontologijos specialistais. Visi tarpdančių šepetėliai turi unikalius laikiklius, specialiai parinktus šerelius ir plastiku padengtą vielutę, todėl tarpdančių valymas labai veiksmingas. Dantų šepetėliai „TePe“ patikimi ir kokybiški.

„TEPE“ RŪPINASI SVEIKĄ ŠYPSENĄ!

*Akcija taikoma kainų skirtuku pažymėtomis prekėms

MAŽYLIUI IR MAMAI



IKI **-40%**

AMBIO

KIDS MULTIVITAMINAI VAIKAMS, 50 guminukų **13⁴⁶ 8⁰⁹ € -40 %**
KIDS VITAMINAS C, geriamieji lašai, 30 ml **3²⁶ 2¹³ € -35 %**
MAISTO PAPILAI



7⁹⁷ €

KAMISTAD N, gelis 10g

Lidokaino hidrochloridas, 20 mg/g, ramunėlių žiedų skystasis ekstraktas, 185 mg/g.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos: gelis vartojamas esant nesunkiam dantenų ir burnos gleivinės uždegimui.

Vartojimas: suaugusiems ir vaikams, vyresniems nei 12 metų, reikia tepėti 0,5 cm ilgio gelio juostelę 3 kartus per parą. Gelis tepamas ant pažeistų vietų ir švelniai įtrinamas.

Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: gelio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Saugoti, kad gelio nepatektų į akis ir ant atvirų žaizdų. Panaudojus gelio, kruopščiai nuplauti rankas.

Pakuotės lapelio peržiūros data: 2022 sausio mėn.

Reklamos teksto parengimo data:

2201_SB_Kamistad_N_V01_LT

„KAMISTAD N“ – PAGALBA ESANT BURNOS GLEIVINĖS UŽDEGIMUI!



NUO **4⁴⁹ €**

IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **4⁴⁹ €**
IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **7⁴⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Ibustar“ 20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, „Ibustar“ 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams. Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg ibuprofeno. Viename geriamosios suspensijos ml yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: „Ibustar“ yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo, NVNU), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis (antpiretikas). „Ibustar“ vartojamas trumpalaikiams simptominiams gydymui: karščiavimo mažinimui, silpno ar vidutinio stiprumo skausmo mažinimui. „Ibustar“ 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, svėrenčiams nuo 5 kg iki 29 kg (dienų amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). „Ibustar“ 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams svėrenčiams 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), saugojamas ir suaugusiems. Vartojimo būdas. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir suaugusiems reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, reikia pasitarti su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką reikia storiai supurtyti. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praityje buvo alerginių reakcijų vartojant acetoilsalicilo rūgštį ar NVNU, pvz., bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės patinimas; jeigu buvo odos reakcijų (pvz., paraudimas, paburkimas, dilgėlinė ar kiti panašūs reiškiniai); jeigu yra medžiagų kraująms sutrikimų; jeigu yra ar buvo praityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa (pepsinė opa) arba kraujavimas (su ar daugiau atskirų įvykių išėjimo ar kraujavimo epizodų); jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar ja praturtintas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra kraujavimas iš smegenų arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos nepakankamumas; jeigu nustatytas sunkus širdies nepakankamumas; nebekas daug skysčių (dėl vėmimo, viduriavimo ar dėl neapokankamo skysčių vartojimo); jeigu yra padidintas vidutinio traukimo. Specialūs įspėjimai ir atargumo priemonės: Požiūriu su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Ibustar“. Šalutinis poveikis gali sumažinti vartojant mažesniais veiksmingą vaisto dozę trumpąja laika būtiną simptomų kontrolę. „Ibustar“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 (ciklooksigenazės-2 selektyvius) inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikai atsidaro skrandžio kraujavimas ar išėjimas, nutraukite „Ibustar“ vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks nepageidaujamas poveikis. Požvelkęs pirmąjį odos išbėrimą, gleivinės patinimą ar kita padidėjusio jautrumo reakcijos požymį, „Ibustar“ vartojimą reikia nutraukti. „Ibustar“ gali slopinti bakterinės infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl „Ibustar“ gali velti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą ilgą laiką infekcinė liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaupais reikia vengti vartoti „Ibustar“. LT_Lbu_016_2023_VI_pirnt Reklama paruošta 2023 m. gruodžio mėn.

GREIT IR VĖL KARALIUS!



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

AMEDIPLUS

Ovuliacijos testas, 2 vnt. **3⁷⁹ €**
MEDICINOS PRIĖ

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ

VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS





SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SU
LOJALUMO
KORTELE

31⁹⁵ €

SKIEPO KAINA
BE KORTELĖS

34⁹⁵ €

Galima išankstinė registracija:

- internetu www.nvaistine.lt/skiepai
- telefonu **+370 800 10 008**



Nuolaidos taikomos
su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“
nuolaidos netaikomos.