MANO vaistinė

KOVAS 2025

Kokybė | Patirtis | Specialiai Jums gaminami vaistai | Sutaupytas laikas | Profesionalumas

Šį mėnesį žurnale rasite

1330 SPECIALIAI JUMS

paruoštus naudingus pasiūlymus

MANO vaistinė

TOP PASIŪLYMAI

03-01 – 03-31

3,07 €

NEOCITRAMONAS 240 mg/200 mg/30 mg tabletės N20

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas trumpalaikio lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinio skausmo malšinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia vartoti nekramtant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml vandens kiekiu. Priklausomai nuo ligos sunkumo vartoti po 1 tabletę 1–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė - 4 tabletės. Negalima vaisto vartoti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliąjai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinamojo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukelė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki aukšto kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, diglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginé operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, pakinta ūlapimo kiekis, pasireiškia pabrinkimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, patamsėja išlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti dirglumą, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. Pradėjus jėdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai neprasena ar atsiranda šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu jtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujamas@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos internete svetainėje www.vvkt.lt. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 11 14

1,29 €

1,91 €

VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS geriamasis tirpalas, 30 ml ir 50 ml

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų šaknų tinktūra, 1 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, vartojamas nestiprems nervines įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinanti priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Nervinės įtampos simptomams malšinti gerti iki 3 kartų per parą po 0,5 - 1 arbatinį šaukštelį. Miegui pagerinti gerti 1 arbatinį šaukštelį valandą ar pusę valandos prieš miegą. Jei reikia, galima gerti du kartus: vakare ir prieš miegą. Maksimali paros dozė: 4 vienkartinės dozės. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliąjai medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra nuo 65 iki 70 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-20.

3,14 €

4,56 €

Diklofenako kalio druska

VOLTAREN AKTI 12,5 mg plėvele dengtos tabletės
VOLTAREN AKTI 25 mg minkštosios kapsulės

Nereceptinis vaistas

Indikacijos. Trumpalaikis nesunkaus ir vidutinio sunkumo skausmo (pvz., galvos, dantų, menesinių, nugaros, sąnarių ir raumenų), persalimo ir gripo simptomų, jskaitant karščiavimą, malšinimas. **Vartojimas.** Suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: **12,5 mg tabletės:** pradinė dozė – 2 tab., veliau vartokite po 1 ar 2 tab. kas 4-6 val., jeigu reikia. Nevartokite daugiau kaip 6 tab. per 24 val. **25 mg kapsulės:** pradinė dozė – 1 kapsulė, veliau vartoti po 1 kapsulę kas 4-6 val., jeigu reikia. Vartoti ne daugiau kaip 3 kapsules per 24 val. Vartoti ne ilgiau kaip 5 paras skausmo malšinimui ir ne ilgiau kaip 3 paras karščiavimo mažinimui. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, širdies ligos, galvos smegenų kraujagyslių liga, sutrikusi kraujotaka, skrandžio ar žarnyno opa, sunkus inkstų ar kepenų nepakankamumas, kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakiurimas, paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai.** Šalutinį poveikį galima sumažinti, vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką. Pasitarkite su gydytoju, jeigu kada nors turėjote virškinimo trakto sutrikimų, sergate ar sirgote žarnyno ligomis, yra pasireiškęs nemalonus pojūtis skrandyje ar nėrinos, esenešu atlikta arba bus atliekama skrandžio arba žarnyno operacija, vartojate kitų vaistų nuo skausmo ar uždegimo, sergate bronchų astma arba žlenlige, kepenų ar inkstų ligomis, sergate arba sirgote širdies liga arba yra padidėjęs kraujospūdis, brinksta pėdos, esate netekę daug skysčių, yra kraujavimo sutrikimų ar kitų kraujo sutrikimų, rūkote, sergate diabetu, yra padidėjęs cholesterolio ar trigliceridų kiekis. Senyviems pacientams labai svarbu skubiai pranešti gydytojui apie pastebėtus šalutinius poveikius. Tabletių sudėtyje yra laktozės ir natrio, kapsulių sudėtyje yra sorbitolio ir manitolio. Teksto parengimo data 02/2023. Prekių ženklai priklausė GSK arba GSK turi jiems licenciją. ©2023 GSK arba licencijos turėtojas. NP-CF-VOLF-23-00001

5,12 €

Palengvina atsikosėjimą

HADORTA sirupas, 100 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

Sudėtis: 1 ml sirupo yra 5,556 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (4 - 8 : 1). 5 ml sirupo yra 27,78 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto. **Indikacijos:** Augalinis vaistinis preparatas, skirtas suaugusiųjų, paauglių ir vyresnių kaip 2 metų vaikų atsikosėjimo lengvinimui esant produktyviam (drėgnam) kosului. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vyresni kaip 12 metų paaugliai, suaugusieji ir senyvi pacientai: 5 ml sirupo 2-3 kartus per parą (atitinka 55,56 – 83,34 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto per parą). 6-11 metų vaikai: 2,5 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 41,67 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto per parą). 2-5 metų vaikai: 1,6 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 26,67 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto per parą). Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų vaikams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliąjai medžiagai, Araliaceae šeimos augalams ir Apiaceae (Umbelliferae) šeimos augalams (pankolių, kmynų, saliero, kalendrų ir krapsnių) ar aneto lui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų arčiau vaikams, nes yra bendra kvėpavimo takų simptomų pasunkėjimo rizika dėl sekreto išsiskyrimą skatinančių vaistinių preparatų vartojimo. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Esant nuolatiniam ar atsinaujinančiam kosului 2–4 metų vaikams prieš pradėdant gydymą turi būti nustatyta medicininė diagnozė. Pasireiškus dusuliui, karščiavimui ar atsiradus pūlingų skreplių, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Atsargiai vartoti rekomenduojama pacientams, sergantiems gastritu ar jei yra skrandžio opa. **Reklamos teksto parengimo data: 2023 m. spalio mėn.**

www.manovaistine.lt

nuo 5,69 € iki 9,72 €

THERAFLU ND 1000 mg/60 mg/30 mg milteliai geriamajam tirpalui N6
THERAFLU NT 1000mg/60mg/30mg/4mg milteliai geriamajam tirpalui N6

Nereceptinis vaistinis preparatas

Indikacijos. Theraflu ND: perdalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės uždegimo, erzinančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Theraflu NT: perdalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės uždegimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimas.** Suaugusiems žmonėms bei 16 m. ir vyresniems paaugliams: geri po 1 pak. kas 6 val. pagal poreikį. Negalima vartoti daugiau kaip 4 pak. per 24 val. Gydymo trukmė neturi viršyti 3 parų. 1 pak. turinį ištirpinti stiklinėje karšto, tačiau ne verdančio vandens (maždaug 250 ml). Vartoti per burną. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jei vartojate ar per paskutines 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos arba Parkinsono ligos, vadinamų MAOI, vartojate kitų simpatomimetikų, yra uždari kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), nėštumo laikotarpis. Theraflu ND: lėtai aukštas kraujospūdis, širdies kraujagyslų liga, sunkus inkstų veiklos sutrikimas, yra kvėpavimo nepakankamumas, plaučių liga ar astmos priepuolis, jei vartojate oksazolidinono klasės antibiotikų, žindymo laikotarpis. Theraflu NT: sunki širdies liga, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas. **Specialiosios įspėjimai.** Nevartoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio. Nevartoti alkoholio. Pasitarti su gydytoju, jei yra inkstų ar kepenų liga, lėtinis alkoholizmas, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės nepakankamumas, padidėjęs širdies ritmas, aukštas kraujospūdis, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, cukrinis diabetas, padidėjusi prostata, psichikos liga, kosulys su dideliu skreplių kiekiu, lėtinis kosulys, aukšta temperatūra, išberimas, pastovus galvos skausmas, jei vartojate vaistų nuo depresijos ar psichozių, netekus sąmonės ar badaujant. Pasireiškus karščiavimui ir išplitusiai odonei su smulkiais pūslinėliais, stiprėjant galvos skausmui, kaupiamui iš tešiosios žarnos ar kitiems išeminio kolito simptomams, likus kelioms dienoms iki operacijos, būtina nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Gali sukelti priklausomybę. Sudėtyje yra aspartamo ir sacharozės. Theraflu ND: Pasitarti su gydytoju, jeigu yra širdies liga ar artimųjų susirgę, vyresniems nei 60 m. Pasireiškus stipriam galvos skausmui, pykinimui, vėmimui, regėjimo sutrikimams, būtina nutraukti vaisto vartojimą. Theraflu NT: Pasitarti su gydytoju, jeigu yra kepenų liga, hemolizinė anemija. Daugiau informacijos pateikta šių vaistų pakuotės lapelyose. Teksto parengimo data 2022 m. NP-LT-THRFL-22-00001

5,36 €

ILOXEN 200 mg/30 mg plėvele dengtos tabletės

Nereceptinis vaistinis preparatas

DVIGUBAS SMŪGIS SINUSITUI!*

Veikliosios medžiagos ir stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrino hidochlorido. **Terapinės indikacijos:** ILOXEN vartojamas suaugusiųjų ir 15 metų bei vyresnių paauglių perdalimo (nosies uždegimo, pasireiškusiam kartu su galvos skausmu ir/arba karščiavimu*) simptominam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletę reikia nuryti nepaženkintą ir nekramtytą, užgeriant didele stikline vandens, geriausia – valgio metu. Suaugusiesiems ir 15 metų bei vyresniems paaugliams po 1 tabletę kas 6 val. pagal poreikį. Jeigu simptomai išnyksta stiprėjus po 2 tablėtes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tablėtes per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbiniams šio vaisto medžiagoms; pacientas yra vaikas iki 15 metų; moterims trečią nėštumo trimestrą, žindymo laikotarpis; ankstesnė pasireiškusi alergiškos reakcija arba dusulys, astma, išberimas, nosies nuožulys ir varvėjimas arba veido patinimas, sukelti acetilsalicilio rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU); virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, anksčiau pasireiškę vartojant NVNU; skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimas arba anksčiau buvę 2 arba daugiau atskiri patvirtintos opos ar kraujavimo epizodai; sunkus kepenų nepakankamumas; sunki širdies ar lėtinė inkstų liga arba sunkus širdies ar lėtinis inkstų nepakankamumas; sunkus širdies nepakankamumas; sunkus širdies arba kraujagyslių sutrikimas (širdies liga, aukštas kraujospūdis, krūtinės angina, padidėjęs širdies susitraukimai), padidėjęs skydliaukės aktyvumas, diabetas arba feochromocitoma (antinksčių navikas); jei anksčiau patyrėte širdies priepuolį (miokardo infarktą); patyrėte insultą arba gydytojas yra Jums sakęs, kad turite padidėjusį insulto riziką, yra labai padidėjęs kraujospūdis arba jeigu hipertenzija neįsunkėjusioje skirtoje vaistų; jei Jums yra buvę traukulių; dėl neaiškios prieširdžio sutrikusi kraujo gamyba; padidėjęs akispūdis (sergėte uždaro kampo glaukoma); pasunkėjęs išlapninimas dėl prostatos sutrikimų; diagnozuota sistemine raudonoji vilkėgė; negalima vartoti kartu su kitais vaistais nuo nosies uždegimo, metifenidatu, kai kuriais vaistais nuo depresijos. **Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės:** ILOXEN reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei sergate bronchų astma, cukriniu diabetu, psichoze, yra padidėjęs skydliaukės aktyvumas, yra buvęs kokis nors virškinamojo trakto sutrikimas ar sergate arba sergote virškinamojo trakto liga, padidėjęs kraujospūdis, nosveiki inkstai ar kepenys, sutrikęs kraujo krešėjimas, sergate infekcine liga, sergate širdies liga, įskaitant širdies nepakankamumą ir krūtinės angininę (krūtinės skausmą), arba jeigu anksčiau Jus buvo išėjęs širdies priepuolis, atlikta kraujagyslių kuntavimo operacija, sergate periferinių arterijų liga arba Jus buvo išėjęs bet koks insultas, jeigu padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, Jūsų šeimos narai serga ar sirgo širdies liga ar insultu, rūkote. Nutraukite ILOXEN vartojimą ir susisiekite su gydytoju arba skubiai kreipkitės medicinos pagalbos, jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš tešiosios žarnos ar kiti išeminio kolito simptomai, jei Jums pasireiškių odos išberimas, gleivinių pažeidimas, pūslės ar kitų alergijos požymių, jeigu staiga praradote regėjimą, jeigu Jums pasireiškių užpakalinės gliptarnosios encefalopatijos sindromo (UGES) ar gliptarnosios smegenų vazokonstrikcijos sindromo (GSVS) simptomų: stiprus staiga pasidėjęs galvos skausmas, pykinimo jausmas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi regė. Prašome jdėmai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistų vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu jtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį pranešite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerjos el. paštu Nepageidaujamas@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos internete svetainėje www.vvkt.lt. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-11-12

8,26 €

Acetilsalicilo rūgštis SANITAS 500 mg tabletės N100

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 500 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** Acetilsalicilo rūgštis SANITAS trumpai vartojama lengvam ir vidutinio stiprumo skausmui (pvz., galvos, dantų, gerklės, raumenų, sąnarių, menesinių, nugaros) ir karščiavimui mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ne dažniau kaip 3–4 kartus per parą po 1–2 tablėtes. Didžiausia leistina paros dozė yra 8 tablėtės. Tablėtes rekomenduojama gerti valgant arba po valgio, užgeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** alergija acetilsalicilo rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; buvusi astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo; pacientas jauneselis negu 12 metų; paskutinisi trys nėštumo mėnesiai; žindymo laikotarpis; yra ar buvo skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa; kraujavimas, hemofilija ar kitoks kraujo krešėjimo sutrikimas; vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė; sunki kepenų, inkstų ar širdies liga. **Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, sąnarių ir jungiamųjo audinio sutrikimais, kraujodaros sistemos ligomis, sustiprėjusi skydliaukės veikla, yra virškinimo trakto sutrikimų, sutrikus inkstų, kepenų ar širdies veiklai, padidėjęs jautrumas kitiems vaistams nuo uždegimo. Prieš operaciją (įskaitant dantų) chirurgui bei anesteziologui būtina pasakyti apie acetilsalicilo rūgšties vartojimą. Acetilsalicilo rūgšties karščiuojantiems vaikams ir pasaulgiams, ypač jauneseniems negu 16 metų ir sergantiems virusinėmis ligomis, gali sukelti kepenų bei smegenų pažeidimą (Reje sindromą). Jei karščiuojantiems vaikui prasideda nuolatinės vėmimas (tai gali būti Reje sindromo požymis), būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Jeigu jtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį pranešite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerjos el. paštu Nepageidaujamas@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos internete svetainėje www.vvkt.lt. Prašome jdėmai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024.11.11

5,15 €

SEPTANAZAL suaugusiems 1 mg/50 mg/ml nosies purškalas, 10 ml
SEPTANAZAL vaikams 0,5 mg+50 mg/ml nosies purškalas, 10 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

ATKEMŠA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSĖJUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ

Septanazal nuo 6 metų amžiaus vartojamas:
- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.

Rekomendujama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną purškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. Septanazal suaugusiesiems vartoti negalima, jeigu yra alergija kalomeazolino hidochloridui, dekspanteniolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui šiuo chirurginiu būdu padaleita posmegninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. Reklamos teksto parengimo data 2024.02.06.

nuo 1,27 € iki 4,98 €

Nuo skausmo ir karščiavimo

APAP, 500 mg, 12 ir 24 plėvele dengtų tablečių
APAP, 250 mg, granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

„APAP". KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „APAP, 250 mg" yra 250 mg paracetamolio; 1 plėvele dengtoje tabletėje „APAP, 500 mg" yra 500 mg paracetamolio. **Indikacijos:** silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Apap, 500 mg" plėvele dengtos tablėtės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams geri po 1–2 tablėtes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tablėtes per parą. „Apap, 250 mg" granulių paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bei kurai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. **Specialios įspėjimai:** prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: padėmitos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Didesnes nei rekomenduojamos dozės suketia vidaus organų pažeidimus. Reklamos teksto parengimo data 2023-12-19.

4,41 €

Lūpų pūslelinės gydymui

ACYCLOVIR STADA 5% KREMAS 5 g

Aciclovirum

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1g kremo yra 50 mg acikloviro. **Indikacijos:** preparatu gydoma Herpes virusų sukelta pasikartojantį lūpų arba lyties organų pūsleline (Herpes labialis, Herpes genitalis), slopinamas jos sukeltas skausmas ir niežėjimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama 5 kartus per parą kas 4 val. šiuo kremu plonai patepti virusо pažeistą odą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui arba vienai iš sudedamųjų vaisto dalių. Jo negalima tepti arti gleivinės (pvz., burnos, akių, makties), kadangi preparatas gali sukelti lokalų uždegimą. **Šalutinis poveikis:** gali būti juntamas trumpalaikis degėnimas arba dūrimas, kai kada oda parausta, tampa sausa, pleiskanoja, retais atvejais atsiranda kontaktinis dermatitas.

14,50 €

Tikrųjų skaistminių vaisių sausasis ekstraktas
Lengvina priešmenstruacinio sindromo negalavimus

PREFEMIN 20 mg plėvele dengtos tabletės, 90 tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg Vitex agnus-castus L., fructus (tikrųjų skaistminių vaisių sausojo ekstrakto (6 – 12:1), atitinkančio 120 - 240 mg tikrųjų skaistminių vaisių. **Indikacijos:** priešmenstruacinio sindromo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę per parą. Gerti kasdien tuo pačiu laiku, užsigeriant reikdeliu kiekiu vandens. Rekomenduojama gydymo trukmė yra ne mažiau kaip 3 mėnesiai. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliagai arba bet kuriai pagalbinei „Prefemin" medžiagai. **Specialios įspėjimai ir atsarguno priemonės:** jei sergate arba sirgote nuo estrogenų priklausomais navikais, prieš vartodami „Prefemin" turite pasitarti su gydytoju. Jei vartojate dopamino receptorių agonistus ir antagonistus, estrogenus ir antiestrogenus, prieš vartodami „Prefemin" turite pasitarti su gydytoju. Jaunesniems nei 18 metų mergaitėms ir pauaugliems vaisto vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie vaisto vartojimą šios grupės pacientams negalima. Jei vartojant „Prefemin" simptomai pasunkėjo, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Manoma, kad tikrųjų skaistminių vaisių ekstraktas turi įtakos pogumburio – hipofizės veiklai, todėl pacientės, kuriems nustatyti hipofizės sutrikimai, prieš vaisto vartojimą turi pasitarti su gydytoju. Sergant protektinę kiaušinėlio hipofizės navikais, tikrųjų skaistminių vaisių ekstrakto vartojimas gali maskuoti naviko sukeltus simptomus. Todėl „Prefemin" sudėtyje yra laktozės monohidrato. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netolerujate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. **Nereceptinis vaistas.** Pakuotėje yra 90 tablečių. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-01-12

3,80 € 5,28 €

NALGESIN S 275mg plėvele dengtos tabletės N10
NALGESIN S 275mg plėvele dengtos tabletės N20

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

NALGESIN S UŽTENKA VARTOTI KAS 12 VAL.!

Nalgesin S numalšina dažniausiai pasitaikančius skausmus vartojant kas 12 val.:
- Galvos skausmą
- Nugaros skausmą
- Menstruacijų skausmą
- Dantų skausmą
- Sąnarių skausmą
- Raumenų skausmą

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 275mg natrio naprokseno.
Vartojimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų pauagliams iš pradžių vartojama 1-2 tab., vėliau – po 1 tab. kas 8-12 val. Vaikams ir pauagliams iki 18 metų Nalgesin S plėvele dengtų tablečių vartoti negalima, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas bet kurai sudedamajai vaisto medžiagai. Aktyvios ar pasikartojančios virškinimo trakto opos arba kraujavimas iš virškinimo trakto. Sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas. Paskutinis nėštumo trimestras. Kraujavimas iš smegenų kraujagyslių ir kiti kraujavimai. Hemopozės ir kraujo krešėjimo sutrikimai dėl neaiškių priežasčių. Reklamos teksto parengimo data 2024.02.28.

* Prašome jdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu jtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį pranešite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerjos el. paštu Nepageidaujamas@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos internete svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

nuo 7,22 € iki 10,38 €

STREPSILS HONEY & LEMON 1,2 mg/0,6 mg kietosios pastilės
STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS 1,2 mg/0,6 mg/8 mg kietosios pastilės
STREPSILS VITAMIN C 1,2 mg/0,6 mg/100 mg kietosios pastilės

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties (Strepsils Vitamin C) ir 8 mg levomentolio (Strepsils Menthol&Eucalyptus). **Terapinės indikacijos.** Lokalus simptominis rykles uždegimo gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Strepsils Honey & Lemon, Strepsils Vitamin C: suaugusiesiems ir vyresniems nei 6 metų amžiaus vaikams bei pasuaugliams: 1 kietoji pastilė kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. Strepsils Menthol&Eucalyptus: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus vaikams bei pasuaugliams: 1 kietoji pastilė kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. Vartoti į burną ir rykle. Kietąsias pastilės leisti lėtai ištirpti burnoje. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliąjai arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai. Jaunesniems nei 12 metų vaikams (Strepsils Menthol&Eucalyptus). Jaunesniems nei 6 metų vaikams (Strepsils Honey & Lemon ir Strepsils Vitamin C). **Specialūs įspėjimai.** Dėl užsprigimo pavojaus šių vaistinių preparatų nerekomenduojama vartoti mažiems vaikams. Vaistų kiekvienoje kietojoje pastilėje yra gliukozės. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistų kiekvienoje kietojoje pastilėje yra sacharozės. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netolerancija, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltozės stygius. Strepsils Vitamin C sudėtyje yra azodažiųkių – Ponso 4R (E124) ir saulėlydžio geltonojo (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Jeigu pacientas yra alergiškas (alergiškai kvečiamas (ši liga skiriasi nuo celiakijos), tuomet šių vaistų vartoti negalima. Strepsils Vitamin C ir Strepsils Honey & Lemon kvapiosios medžiagos sudėtyje yra citralio, citronelolio (Strepsils Vitamin C sudėtyje), d-limonemo, geraniolio ir linalolio. Citralis, citronelolis, d-limonemas, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų. Strepsils Menthol & Eucalyptus kvapiosios medžiagos sudėtyje yra d-limonemo. D-limonemas gali sukelti alerginių reakcijų. Šių vaistų sudėtyje yra siersos dioksido (E220). Retais atvejais gali sukelti sunkų padidėjusio jautrumo reakciją ir bronchų spazmą. Reklamos tekstas parengtas 2025-02-05.

nuo 4,48 € iki 7,03 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti

GRIPEX 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių
GRIPEX 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės
GRIPEX 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių
GRIPEX 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

„GRIPEX". VEIKIU.

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Vienoje „Gripex" tabletėje yra: 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 10 mg dekstrometorfano hidrobromido. Vienoje „Gripex 500/30/15 mg" tabletėje yra: 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. **Indikacijos:** peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir uždūrkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Gripex" tabletės: suaugusiems pacientams ir vyresniems negu 12 m. vaikams įprastine dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. „Gripex 500/30/15 mg" tabletės: suaugusiesiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. **Kontraindikacijos:** šių vaistų negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudėtinėms medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroniniu alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba arkaciau negu 2 savaites beigus juos vartoti. „Gripex" tabletėmis negalima vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. „Gripex 500/30/15 mg" tabletėmis negalima vartoti vaikams. **Specialūs įspėjimai:** esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas Jūsų sanijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data 2024.04.02.

4,02 €

Vaistinis preparatas nosies gleivinės paburkimui mažinti

RHINO-STAS, nosies purškalas 10 ml

1mg/ml. Ksilometazolino hidrochloridas.

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** Rhino-stas yra simpatikomimetikas. Purškalas siaurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant slėoga arba priemsomių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 metų vaikams bei pasuaugliams, reikia purkšti po 1 dipurškimą Rhino-stas tiesiai į kiekvieną nosies landą 1-3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliąjai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jei yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Rhino-stas galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartoja ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį, kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždara kampo glaukoma, sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija), sergant feochromocitoma (antinksčių naviku), sergant porfirija, sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertireoze, cukriniu diabetu).

2,19 €

MENOVAZINAS 25/10 mg/ml odos tirpalas, 40 ml

Vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos: 1 ml odos tirpalo yra 25 mg raseminio mentolio, 10 mg benzokaino. **Indikacijos:** vietinio naudojimo anestetikas, vartojamas lokaliam odos skausmo ar niežulio mažinimui. Veikliosi medžiaga mentolis dirgina odos nervų galūnes, šiek tiek anestezuoja, sukelia nedidelį perėjėjimą ir šalčio pojūtį, pagerina odos ir gilesniųsiančių audinių kraujotaką. Benzokainas veikia jutiamųjų nervų galūnes ir sukelia odos receptorių laikinąblokadą, todėl slopina impulsų srautas iš patologinio židinio ir mažėja skausmas. **Vartojimas:** vartoti ant odos. Skaudamas vietas 2-3 kartus per dieną reikia įtrinti 2 – 3 ml vaisto. **Kontraindikacijos:** vaisto vartoti negalima, jei padidėjęs jautrumas bet kuriai medžiagai, esančiai vaisto sudėtyje. Be to, jo negalima vartoti, jei yra žaizdų, pūlinių, egzema, žvynelinė ir (arba) odos uždegimas bei išbėrimas. **Specialūs įspėjimai:** būtina saugoti, kad vaisto nepatekėtų į akis, žaizdas bei ant gleivinės. Atsargiai vaistą reikia vartoti veido, lyties organų, lenkiamųjų paviršių bei odos kiosčių srityje. Netepti apie akis. Pavartojus vaisto, rankas reikia nusiplauti su muilu ir šiltu vandeniu. Reklamos tekstas parengimo data: 2018-08-30.

nuo 6,63 € iki 7,13 €

Nuo gerklės skausmo

INOVOX HONEY LEMON 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės N24
INOVOX MENTHOL 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės N24
INOVOX ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

„INOVOX". EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio. **Indikacijos:** gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ir tinės uždegimų būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** po 1 kietąją pastilę kas 2 – 3 val. ir kairėkia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastilės per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastilės). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** jei simptomai neišnykstą ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti žmonę liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant žmonės burnos ir gerklės žaizdoms, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydžio geltonojo ir kolemilio raudonojo. Reklamos tekstas parengimo data 2022-06-09.

5,82 €

KAMISTAD N burnos gleivinės gelis, 10 g

Nereceptinis vaistinis preparatas

KAMISTAD N – PAGALBA ESANT BURNOS GLEIVINĖS UŽDEGIMUI!

Lidokaino hidrochloridas 20 mg/g, ramunėlių žiedų skystasis ekstraktas 185 mg/g. **Indikacijos:** gelis vartojamas esant nesunkiam dantenų ir burnos gleivinės uždegimui. **Vartojimas:** suaugusiems ir vaikams vyresniems nei 12 metų reikia tepti 0,5 cm ilgio gelio juostelę 3 kartus per parą. Gelis tepamas ant pažeistų vietų ir šveiniai įtrinamas. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** gelio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliąjai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Saugoti, kad gelio nepatekėtų į akis ir ant atvirų žaizdų. Panaudojus gelio, kruopščiai nusiplaukite rankas.
Pakuotės lapelio peržiūros data: 2019 04 15
Reklamos teksto parengimo data: 2020 02 03

15,55 € 24,93 €

Silpniems ir slenkantiems plaukams

BEOTEBAL 10 mg tabletės N30 ir N60

Nereceptinis vaistinis preparatas

SLENKA PLAUKAI? PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJA GALIA!*

Terapinės indikacijos. „BEOTEBAL" priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiesiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų sirkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkčnis, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, pareistėjos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, peršėjimas, šalimas, dirginimas, tirpimas) simptomus. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems, jokiatant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, t.y. 1 tabletė „BEOTEBAL" per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir pasuaglams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliąjai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba nesenai vartojote „BEOTEBAL", nes biotinas gali turėti takoto tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atlekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingi mažesni. Reklamos tekstas parengimo data 2022-04.
*Slenkantys, silpni, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebal" yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

1,32 €

Nervinės įtampos ir nervinės kilmės širdies negalavimų simptomams palengvinti

SUKATŽOLIŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas

GYDANTI VAISTAŽOLIŲ GALIA!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: sukatžolių tinktūra, 1 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu; skirtas nervinės įtampos simptomams malšinti. Taip pat šis tradicinis augalinis vaistinis preparatas gali būti vartojamas palengvinti nervinės kilmės širdies negalavimų simptomams, pvz., smarkiam širdies plakimui, jeigu gydytojas yra patvirtinęs, kad nėra sunkios medicininės būklės. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, reikia gerti 3–4 kartus per dieną prieš valgį po 30–50 lašų. **Kontraindikacijos:** jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliąjai medžiagai, vaisto vartoti negalima. Negalima vartoti nėštumo laikotarpiu. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išliekia, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra nuo 64 iki 70 % (V/V) etanolio.
Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-21.

MANO vaistinė

3,69 € | **9,16 €**

FERRETAB comp. 152,1 mg/0,5 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės N30 ir N100

Geležies (II) fumaratas / folio rūgštis

Nereceptinis vaistinis preparatas

Ferretab comp. vartojamas kombinuotam geležies ir folio rūgšties trūkumui šalinti bei jo profilaktikai, ypač nėštumo metu. Ferretab comp. atstato arba papildo geležies ir folio rūgšties kiekį, kai to negali atlikti savarankiškai žmogaus organizmas. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams esant nedideliam geležies trūkumui, geri po vieną kapsulę per parą. Kai yra mažakraujystė, paros dozę galima padidinti iki vienos kapsulės 2-3 kartus per parą. Kai kada nėštumo metu reikia gerti didesę geležies dozę. Kapsules nuryti nekramtytas, užsigeriant stikline vandens. Nekramtykite arba neišdalykite kapsulių, nes gali sustiprėti šalutinis poveikis. Geriausia kapsules išgerti nevalgius. **Kontraindikacijos.** Ferretab comp. vartoti negalima, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) geležies fumaratui, folio rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu nustatyta su geležies ir folio rūgšties stoka nesusijusi anemija; geležies perteklius organizme arba blogė, kuri sutrikdo normalų geležies pisavinimą; hemoglobinopatija; jeigu sergate hemolizine aplazine ar perniciozine anemija; virškinimo trakto ligomis. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Gydymas turi būti tęsiamas keletą savaičių (maždaugiai 8-12 sav.) po to, kai eritrocitų skaičius bamps normalus iki vaisiko geležies atokos atstatymo. Vartojant Ferretab comp. kapsules kartais dėmės spalva tampa juoda, tačiau tai normalu. Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Ferretab comp. medžiagas. Sudėtyje yra 34,47 mg laktozės monohidrato (pieno cukraus). Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netolerianjate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į gydytoją prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Sudėtyje yra dažiklio azorubino (E122). Galė sukelti alergišką reakciją.
Pakuotė: 30 arba 100 pailginto atpalaidavimo kietųjų kapsulių. Farmakoterapinė grupė – vaistinės preparatai nuo anemijos, geležies derinyje su folio rūgštimi. ATC kodas – B03AD02.

nuo 2,57 € iki 9,72 €

NUROFEN 200 mg dengtos tabletės
NUROFEN FORTE 400 mg dengtos tabletės
NUROFEN FORTE EXPRESS 400 mg dengtos tabletės

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

NUROFEN sudėtyje yra 200 mg ibuprofeno. **NUROFEN FORTE** ir **NUROFEN FORTE EXPRESS** sudėtyje yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, menesinių sukelto skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **NUROFEN dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, geri po 1-2 tabletes kas 4 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 6 tabletes (1200 mg). **NUROFEN FORTE** ir **NUROFEN FORTE EXPRESS dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, geri po vieną tabletę kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (1200 mg). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, niežas, angioneurozinis patinkimas, dilgėlinė); sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis trijų nėštumo mėnesių laikotarpis; esama ar buvusi peptinė opa (du ar daugiau atskirų žodyno išopėjimo ar kraujavimo epizodų); bovejs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurtimas, susijęs su anksčesniu NVNU vartojimu; kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kitokis kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sistemine raudonoji vilkligė; anksčiau buvo padidėjęs kraujspūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkus inkstų pakenkimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkūs kepenų funkcijos sutrikimai; pacientams, kurie serga opinis kolitu, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistinių preparatų bei vaistų, galinčių padidinti išopėjimo ar kraujavimo pavojų. Retais atvejais pastebėta sunkių odos reakcijų (kai kurios iš jų buvo mirtinos), įskaitant eksfoliacinį dermatitą, Stivenso-Džonsono (Stevens-Johnson) sindromą bei toksinę epidermio nekrolizę - Lajelio (Lyell) sindromą, susijusių su NVNU vartojimu. Gauta pranešimų apie žmonės generalizuotos egzantemės pustulizės (UGEP) atvejus. Pasireiškus pirmesiems sunkių odos reakcijų požymiams ir simptomams, pvz., odos išbėrimui, gleivinės pažeidimams ar kitiems padidėjusio jautrumo požymiams, ibuprofeno vartojimą reikia nutraukti. Šie vaistai gali būti susijęs su neišdėstu širdies priepuolio ("insokado infarkto") ar insulto pavojaus padidėjimu. Šie vaistiniai preparatai gali maskuoti infekcijos simptomus, dėl to gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o tai gali pablogėti infekcijos gydymo rezultatus. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - fruktozės netolerantiškumas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tabletėje yra natrio, būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Reklamos tekstas parengtas 2023-02-05.

nuo 3,78 € iki 5,57 €

FLAVAMED 30 mg tabletės
FLAVAMED 60 mg šnypščiosios tabletės
FLAVAMED 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas
FLAVAMED 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

EFEKTYVUS DRĖGNO KOSULIO PALENGVINIMAS

Nereceptinis vaistas. Flavamed 30 mg tabletės. Flavamed 60 mg šnypščiosios tabletės. Flavamed 15 mg/5 ml ir 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas. **Flavamed vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pasišalinti.** Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštį. Šnypščiosios tabletės ištirpinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. 30 mg tabletes reikia nuryti neskramtytas po valgio, užsigerti pakankamu skysčio kiekiu. Suaugusiems ir vaikams vyresniems kaip 12 metų po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 3 kartus per parą geriamasias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus per parą. 6-12 metų vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2-3 kartus per parą, 2-5 metų vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4-5 dienas Flavamed vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 30 mg tabletių negalima vartoti vaikams iki 6 metų. Flavamed 60 mg šnypščiųjų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. Flavamed 30mg/5ml ir 15 mg/5ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. **Specialūs įspėjimai.** Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikusio bronchų epitelio mozerkiai ir esant gausai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų ligą; prieš tai buvus peptinę opą; esant histamino netolerantiškumui. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Flavamed, jeigu jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ir Lajelio sindromas). Flavamed 15 mg/5 ml ir 30 mg/5 ml geriamajame tirpale bei šnypščiosiose tabletėse yra sorbitolio bei benzenkalboksirūgšties. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netolerujate kokių nors angliavandenių arba Jums (ar Jūsų vaikui) nustatytas retas genetinis sutrikimas (įgimtas fruktozės netolerumas prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jo Jūsų vaikui), pasakykite gydytojui. Flavamed šnypščiosioje tabletėje yra benzilo alkoholio, kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Dėl susikaupimo ir toksinio poveikio rizikos (metabolinės acidozės) didesi kiekiai turi būti vartojami atsargiai ir tik tuo atveju, jeigu būtina, ypač nėščioms ar žindančioms moterims, asmenims, kuriems yra kepenų arba inkstų pažeidimas. Galimos odos alergines reakcijos.
LT_Fla_08_2023_V1_print Reklama parvoita 2023 m. gruodžio mėn. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com

2,24 €

IBUSTAR – efektyvus nuskausminimui ir temperatūros mažinimui

IBUSTAR 400 mg plėvele dengtos tabletės, N10

Nereceptinis vaistinis preparatas

Nereceptinis vaistas. Ibustar 400 mg plėvele dengtos tabletės. **Indikacijos: Simptominis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo gydymas. Simptominis karščiavimo gydymas.**
Dozuotė: Suaugusiesiems – vienkartinė dozė yra 200 mg - 400 mg (3-4 kartus per parą, tačiau ne dažniau nei kas 6 valandos). Didžiausia paros dozė yra 1200 mg (3 Ibustar plėvele dengtos tabletės). **Vaikų populiacija:** Vaikams ir paaugliams Ibustar skiriama pagal kūno masę arba amžių. Vienkartinė dozė yra 7-10 mg/kg kūno svorio. Didžiausia paros dozė - 30 mg/kg kūno svorio. Vienkartinės dozės geriamos 3-4 kartus per parą, tačiau ne dažniau nei kas 6 valandos. **Kontraindikacijos:** Ibustar vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums, pavartojus acetilsalicilo rūgšties turinčių vaistų arba kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, yra buvę alerginių reakcijų, tokių kaip astmos priepuoliai, nosies gleivinės paburkimas; odos reakcijos; jeigu yra nežinomos kilmės kraujodaros sutrikimų; jeigu Jums yra aktyvi arba pasikartojanti skrandžio arba plonosios (dvylikapirštės) žarnos opa arba kraujavimas; jeigu Jums yra buvęs su ankstesniu NVNU gydymu susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo perforacija; jeigu Jums yra galvos smegenų kraujagyslių arba kitokis aktyvus kraujavimas; jeigu Jums yra sunkus kepenų arba sunkus inkstų nepakankamumas; jeigu Jums yra sunkus širdies nepakankamumas; jeigu Jums yra paskutinieji trys nėštumo mėnesiai; vaikams, kurių svoris yra mažesnis nei 20 kg (jaunesniems nei 6 metai). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 (cikloksigenazės-2 selektyviuosius) inhibitorius. Jei vartojant Ibustar pasireiškia kraujavimas iš virškinimo trakto arba opojimas, vaisto vartojimą būtina nutraukti. Pastebėjus pirmųjų odos išbėrimo, gleivinės pažeidimo ar kitų padidėjusio jautrumo reakcijos požymių, Ibustar vartojimą reikia nutraukti. Ibustar gali slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėlinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgdami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaraupsiais reikia vengti vartoti Ibustar.
LT_Ibu_07_2023_v1_print Reklama parvoita 2023 m. gruodžio mėn. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com

5,11 €



Nuo alergijos

TAVEGYL, 1 mg, 20 tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliojі medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 1,34 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** tinka šieno sloga ar kitokiai alergiai nuopalčiai, įvairių priežasčių sukeltai dilgėlinei, jskaitant dermatografinę dilgėlinę, niežuliui, niežėjimą sukeliančiai dermatozei, vabzdžių įgėlimui ir įkandimui gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2 kartus per parą iš ryto ir vakare geri po 1 tabletę (1 mg), 6–12 m. vaikams – prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 (0,5 mg) arba 1 (1 mg) tabletę, 3–6 m. vaikams – prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletės (0,5 mg). Tabletes reikėtų geri prieš valgį užsigeriant vandeniu. Vartoti tik per burną. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** padidėjęs jautrumas klemastinui, kitokiems antihistaminiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, porfirija, pacientas jaunesnis nego 3 m. vaikas. Atsargiai vartoti tui pacientai, sergantys: uždara kampo glaukoma; stenozę sukeliančia peptine opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susiaiko diapemas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Tavegyl tabletių sudėtyje yra laktozės. Tavegyl negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės netolerantiškumas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistinį preparatą reikia atsargiai skirti epilepsija sergantiems arba praeityje traukulius patyrusiems pacientams. Pakuotės lapelio peržiūros data 2022-06-01.

2,43 €

AMBROLAN 30 mg, 20 tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas

Ambroksolio hidrochloridas

NUGALĖKITE KOSULĮ!

Ambrolan yra labai veiksmingas vaistas, kurio veikliojі medžiaga ambroksolis yra bromheksino metabolitas. Ambrolan mažina susikaupusių skreplių klampumą, gerina viprumpo epitelio aktyvumą ir taip skatina sekrecją pasišalinti iš bronchų, skystina pemelyg klampias gleives ir palengvina jų išsiskyrimą, vartojamas sergantiesiems ūmine arba lėtine bronchų ir plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas, kvėpavimo takų sekretui skystinti. **Vartojimas.** Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams įprastine doze yra 1 tablete tris kartus per parą. Vartojama po valgio, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Ambrolan vartoti negalima, jeigu yra: alergija ambroksoliui; skrandžio ir/arba žarnyno opa; pirmusiusius 3 nėštumo mėnesius ir maitinant krūtimi; jaunesniems nei 12 metų vaikams. Kiekvienoje tabletėje yra 100 mg laktozės (pieno cukraus). Tekstas per būrios data 2016-08-29. Reklamos data – 2024-08.

2,63 € | **3,19 €**

Sloguojant

GALAZOLIN 0,05 % ir 0,1 % nosies lašai, tirpalas (10 ml)

Nereceptinis vaistinis preparatas

IŠLAISVINS TAVO NOSĮ!

Veikliojі medžiaga: kslometazolino hidrochloridas. **Indikacijos:** nosies gleivinės paburkimo mažinimas perdaug ar susėrgus alergine sloga, nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. **Dozavimas:** 2-6 metų vaikams (kiekvieną nosies landą reikia lašinti po 1-2 lašus 0,05% koncentracijos tirpalo kas 8 val. Vyresniems negu 7 metų pacientams (kiekvieną nosies landą reikia lašinti po 2-3 lašus 0,1% koncentracijos tirpalo kas 8-10 val. Kslometazolino tirpalo vartoti ilgiau kaip 5-7 dienas negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausasis rinitas, uždara kampo glaukoma, palalinta hipofizė arba atlikta tokia operacija, kurios metu buvo atvertas kietasis smegenų dangalas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** preparato negalima vartoti pacientams, sergantiems lėtine ar vaizmotorine sloga, jei jos gydymas užtrunka ilgiau negu dvi savaitės. Ilgiau negu dvi savaitės vartojamas preparatas gali sukelti antrinį kraujagyslių išsiplėtimą, dėl kurio atsiranda medikamentinė sloga (Rhinitis medicamentosa). Kadangi vaisto galima netyčia nuryti, ligoniui, kuriems simptokami-metikų vartoti negalima gydyti medikamentu reikia atsargiai. Preparato negalima vartoti kartu su MAO inhibitorais bei tricikliais antidepresantais. Reklamos teksto parengimo data 2022 m. 10 mėn.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaRi@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos internete svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-30% -25%

CARDIOACE, 30 tablečių
CARDIOACE PLUS, 60 kapsulių

Maisto papildai

CARDIOACE – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!

CARDIOACE – Vidutiniu dietos nauda sukoncentruota vienoje tabletėje. Sinerginio veikimo komplekse derinama omega-3 naudingosios savybės su česnaku, vitaminais, mineralais bei antioksidantais. Sudėtyje yra medžiagų normaliai širdies veiklai (vitaminas B1, EPA, DHA), kraujotakai (česnaka), ląstelių apsaugai nuo oksidacinio pažeidimo (varis, selenas, vitaminai C,E), homocisteino apykaitai (vitaminai B6, B12, folio rūgštis)
CARDIOACE PLUS – sudėtis papildyta net 1300 mg veikiančiųjų augalinių sterolių normaliai cholesterolio koncentracijai, patentuotu Cardiol kompleksu, L karnitino tartrata, kofermentu Q10. Teigiamas poveikis jaučiamas suvartojant per parą ne mažiau 0,8 g augalinių sterolių.

3,96 € 2,95 € 2,91 €

THROMBO ASS 100mg tab. N100
THROMBO ASS 50mg tab. N100
THROMBO ASS 75mg tab. N100

Nereceptinis vaistinis preparatas

SKYSTINA KRAUJĄ – GYVENIMĄ SAUGO!

Veikliąji medžiaga: acetilsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiesiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinų arterijų nuorašėsio operacijos. Antrinė praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skandinkite neiną tabletę, reikia nuryti nesukramtytą, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu valgio metu arba tarp valgymų tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros doze ilgalaikiam vartojimui yra 50-150 mg. Daliytų dalis Thrombo ASS skrandyje neirios tablietės negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plėvelė. Norint, kad tiktų individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliąjai medžiagai arba bet kurai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNO; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikytis tiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės pabiurkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolitine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opaligę ar kraujavimą iš virškinimo takto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgšties reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Pakuotė: **50 mg, 75 mg, 100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių.** Farmakoterapinė grupė - antitrombotiniai preparatai, trombocitų agregaciją slopinantys vaistai. ATC kodas - B01AC06. **Tekste peržiūros data:** 2020-05-13. Registruotojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.

11,80 € 10,05 €

Kojų venoms VENORUTON

VENORUTON FORTE, 500 mg, 30 tablečių
VENORUTON, 1000 mg, 15 šnypščiųjų tablečių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename „Venoruton forte" tabletėje yra 500 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų; kiekviename „Venoruton" šnypščiojoje tabletėje yra 1000 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų (HR). **Terapinės indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomams (edemos, kojų nuovargio, sunkumo, skausmo, mėšlungio, parestezijos) lengvinti, hemorojaus simptomams mažinti. Papildomam diabetinės retinopatijos (diabeto komplikacijos tinklainės kraujagyslių pažeidimo) ir limfos sąstovo gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Venoruton forte" – 1 tablete 2 kartus per parą; „Venoruton" šnypščiosios tabletės: 1 tablete – 1 kartą per parą „Venoruton" nerekiantas vartoti vakarai. Dozavimas, esant visoms indikacijoms, pakeičiamas pakuotės lapelyje arba www.vvkt.lt. **Kontraindikacijos:** alergija veikliąjai arba bet kurai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** negalima vartoti, jeigu yra kojų edema dėl širdies, inkstų arba kepenų ligų. „Venoruton" 1000 mg šnypščiųjų tablečių sudėtyje yra kalio ir natrio. Pakuotės lapelio peržiūros data 2021-01-29. Reklamos teksto parengimo data 2022 vasario mėn. 2201_SB_Venoruton_V01_LT

1,33 € 2,08 €

Širdžiai ir kraujagyslėms

GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml ir 80 ml

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas

GYDANTI VAISTAŽOLIŲ GALIA!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: gudobelių vaisių tinktūra, 1 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijų gerinimui. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia geri 5 praskiedus vandeniu po 20–30 lašų 3–4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** alergija erikaitinių šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ligiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 65 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-21.

1,83 €

Širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti

ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS geriamieji lašai (tirpalas), 40 ml

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas

ĮŠIRDĮ IMKITE TIK GERUS DALYKUS.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, sukatžolių tinktūra, gudobelių vaisių skystasis ekstraktas, 0,34ml+ 0,33ml+ 0,33ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia geri 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę sumažinti (geri 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ligiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda dažnesnis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-30
Bendri privalomi įspėjimai vaistams: praėjusie jdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsiranda šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu.

-45%

RAMI ŠIRDIS cholesterolio balansui, 30 kapsulių
RAMI ŠIRDIS, 30 kapsulių
RAMI ŠIRDIS+ geriamieji lašai, 50 ml
RAMI ŠIRDIS, 20 čiulpiamųjų tablečių

Maisto papildai

RAMIAME KŪNE – RAMI ŠIRDIS!

„Rami širdis" – gausios sudėties dvejopo poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augalinėmis ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. „Rami širdis" maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

-25%

HEMATOGENAS VITA+
HEMATOGENAS VITA+ su linų sėmenimis
HEMATOGENAS VITA+ Energy

Maisto papildas

HEMA2GEN. Klasikinio skonio
HEMATOGENAS VITA+ su šokolado glaistu

GELEŽINIS ARGUMENTAS! PAGAMINTA LIETUVOJE.

Hematogenas – maisto papildas, kurį vartoti ne tik skanu, bet ir naudinga, nes ja praturtintas geležimi bei vitaminais. Lietuvoje pagamintame hematogene esanti geležis yra organinės kilmės, todėl organizmas ją geriau jisisavina. Sudėtyje esantis vitaminas C gerina geležies jisisavinimą. Lietuviški Hematogenai gaminami iš natūralių žaliųjų ir etiketės visus aukščiausius Europos Sąjungos reikalavimus. **HEMATOGENAS VITA+.** Klasikinio skonio hematogenas, praturtintas vitaminu C. **HEMATOGENAS VITA+ su linų sėmenimis.** Praturtintas vitaminais C, B12 ir šiais rūgštimi bei linų sėmenimis. **HEMATOGENAS VITA+ su šokolado glaistu.** Tradicinio skonio su šokoladiniu glaistu bei vitaminu C. **HEMA2GEN.** Klasikinio skonio. Patogi forma – dvi lazdelės.

iki -40%

ATEROLIP®

ATEROLIP® COMPLEX CAPS 30 ir 90 kaps.
ATEROLIP® D, 30 kaps.
ATEROLIP® FIBER, 15 paketėlių
ATEROLIP® RYTHMO, 30 kaps.

Maisto papildai

AteroLip® complex caps sudėtyje esantis obelčiolės ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą
AteroLip® D sudėtyje esantys cinamonas ir chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją.
AteroLip® Fiber sudėtyje esantys balkšvieji gysločiai padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje.
AteroLip® Rythmo sudėtyje esantis vienapiesčių gudobelių žiedų ekstraktas padeda palaikyti normalų širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.

MANO vaistinė

nuo 8,44 € iki 15,95 €

Kepenims ESSENTIALE FORTE N

ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 30 kietųjų kapsulių
ESSENTIALE FORTE N, 600 mg, 30 kietųjų kapsulių
ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 100 kietųjų kapsulių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!

Veiklioses medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. **Indikacijos:** simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešiniėje pobriauklinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, maliniinas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paauglams vienkartinė dozė – dvi 300 mg kietosios kapsulės arba viena 600 mg kietoji kapsulė. Paros dozė – po dvi 300 mg kietąsias kapsules arba po vieną 600 mg kietąją kapsulę 3 kartus per parą (1 800 mg sojų fosfolipidų). Essentiale forte N saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 metų neištirti. Dėl šios priežasties Essentiale forte N neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 metų. Kapsules geriamos valgio metu, nekramtytos, užgeriant dideliu skysčio kiekiu (pvz., stikline vandens). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams arba sojoms arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. **Specialios įspėjimai:** Essentiale forte N neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukelto kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. Essentiale forte N gali silpnėti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti pastarųjų vaistų dozę. Essentiale forte N sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis. Reklamos tekstas parengimo data: 2022 m. sausio mėn. 2201_SB_ Essentiale_V01_LT

8,45 €

BLOCTIL 100 mg kietosios kapsulės

Nereceptinis vaistinis preparatas

Kiekvienoje kapsulėje yra 108 mg racekadotrilo. **Indikacija.** BLOCTIL yra skirtas suaugusių žmonių simptominiam ūminio viduriavimo gydymui, kai priežastinis gydymas nėra įmanomas. Jei priežastinis gydymas yra įmanomas, racekadotrilo galima skirti papildomam gydymui. **Dozavimas.** Vartoti tik suaugusiesiems: pradėjus vieną kapsulę nepriklausomai nuo paros laiko. Toliau po vieną kapsulę tris kartus per parą, geriausia prieš pagrindinį valgį. Gydymą reikia tęsti, kol bus užfiksuoti du tuštinimaisi normaliomis sąlygomis. Gydymas neturi būti ilgesnis nei 7 paros. **Kontraindikacijos ir kiti specialūs įspėjimai.** BLOCTIL vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliąjai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Vartojant racekadotrilą, nereikia keisti įprastinės skysčio atkuriamųjų gėrimų vartojimo tvarkos. Racekadotrilo vartoti negalima esant antibiotikų sukeltam viduriavimui. Galimas šalutinis poveikis: galvos skausmas, odos reakcijos (bėrimas, edema, niežėjimas). Pasireiškus sunkiems odos reakcijoms reikia nedelsiant nutraukti gydymą.

Paketuotėje yra 10 kapsulių kodinėje plokštelėje. Tekstas paruošimo data: 2021-05-20.

3,56 €

ESCADRA 20 mg, 7 skrandyje neirios kietosios kapsulės

Nereceptinis vaistinis preparatas

MODERNI KAPSULĖ NUO RĖMENS

Veiklioses medžiagos, stiprumas: esomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos:** skirta suaugusių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgštinės regurgitacijos) trumpalaikam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė – 20 mg esomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaičių nepertraukiamą gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra" vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgštinės regurgitacijos) gydymas". Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaišyti puisėje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeitiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Esomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientus reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar melėną arba jeigu jiems ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina ištirti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas esomeprazolu gali palengvėti jos simptomai ir uždėsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją, jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas, jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba neseniai pakitusį simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantys nevirškinimo ar rėmens simptomai išgalaikia, turi reguliariais intervalais tarkytos pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra" pacientai nėra vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar uriazės kėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Esomeprazolą skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Esomeprazolo derinimas su kisplodogeliu nepatartinas. Kitų PSI arba H2 receptorių blokatorių kartu su esomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra" sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2024.02.06.

1,68 €

Viršikinimui gerinti

MĖTŲ TINKTŪRA VALENTIS geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml

Vaistinis preparatas

Veiklioses medžiagos, stiprumas: 1 ml geriamųjų lašų yra 1 ml pipirmėčių lapų (Mentha x piperita L., folium tinkturis (1:20), kurios sudėtyje yra 65 mg/g pipirmėčių eterinio aliejaus. Ekstrahentas: ~ 90 % (V/V) etanolis. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaiku vartojimu, skirtas virškinimo sutrikimų, tokių kaip nevirškinimas ar vidurių pūtimas, simptomams gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Geriti 3 kartus per dieną po 20 lašų, veiksmo dozę sumažinti iki 10-15 lašų 2 kartus per dieną. Vaistas geriamas praskiedus trupučiu vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas pipirmėčių lapų preparatams arba mentoliui. Vaistinio preparato negalima tepti ant atviros žaizdos. Išpaisujančios egzemos ir gleivinės. **Specialūs įspėjimai:** asmenys, sergantys gastroezofaginiu refliuksu (rėmens graužimu), turėtų vengti pipirmėčių lapų preparatų, nes gali padidėti rėmens graužimas. Asmenys, turintys akmenų tulžies pūslėje ar kitokių tulžies pūslės funkcijos sutrikimų, pipirmėčių lapų preparatus turėtų vartoti atsargiai. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Jei vartojant šį vaistą simptomai pasunkėja, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Šio vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 81 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2017-01-30.

3,06 €

LOPERAMIDUM WZF Polfa 2 mg tabletės N10

Nereceptinis vaistinis preparatas

GREITAI SUSTABDYS VIDURIAVIMĄ

Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptominis suaugusių ir vyresnių nei 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimą sukeliusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje geriama 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išsituštinimo nesufarmuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamido hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jaunesni nei 12 metų pacientai, paralyžinis žarnų neprakinamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčio; pseudomembraninis kolitas, kuri dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitoks bakterinis viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochloridu gydomas pacientas turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochlorido reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdant vartoti loperamido hidrochlorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamido hidrochlorido, gali pasunkėti išpaisymasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto paruošimo data 2022-04 mėn.

-30%

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių

Maisto papildas

KOMPLEKSINĖ PAGALBA INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ VEIKLAI

Fitolizyna nefrocaps PLUS yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:
- padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolės šaknys, dirvinio asiūklio žolė, paprastojo varpučio šakniastebliai, karpotojo beržo lapai, vaistinės gelsvės šaknys, paprastosios ryklėtenės žolė);
- padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepagendajamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinio asiūklio žolė, paprastojo varpučio šakniastebliai, vaistinės gelsvės šaknys, paprastosios ryklėtenės žolė).

Rekomenduojamas vartojimas:
1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau ¼ stiklinės).

-50%

HEPASAN FORTE, 30 kapsulių
HEPASAN FORTE, 60 kapsulių

Maisto papildas

„Hepasan Forte" sudėtyje yra cholino ir augalinių (šiknio marginių sėklų, kiaulpienių šaknų, artišoko) ekstraktų. Cholinas svarbus normaliai lipidų ir homocisteino apykaitai ir normaliai kepenų funkcijai palaikyti. **Vartojimas:** rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną.

-45%

-25%

RANIGAST S-O-S kramtomosios tabletės N12 ir N24

Medicinos priemonės

RANIGAST S-O-S yra skirtas gastroezofaginio refliukso simptomų (rėmens, skrandžio skausmo, dispepsijos) malšinimui.
- Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpsite ar išgersite tabletę.
- Deka ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
- Tinka naudoti ir kaip papildomą priemonę sergantiems gastritu, peptine opa.
- Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.

Suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 metų: rekomenduojama pavaliąus vartoti 2 tabletes. Vaikams (6-12 metų): rekomenduojama pavaliąus vartoti 1 tabletę.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

iki -50%

Gerklei HERBITASSIN®

HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių
HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių
HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių
Maisto papildai

HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt.
HERBITASSIN® ledinukai Herbal extracts + Vit C, braškių ir miško uogų skonio, 4 vnt.
Maisto produktas

HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių
Medicinos priemonė

HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių. Drėkina gerklės gleivinę, ramina sausumo, peršėjimo ir gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimimo simptomus. Hialurono rūgštis intensyviai drėkina gleivinę.
Maisto produktas
HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilanžėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt.
HERBITASSIN® ledinukai Herbal extracts + Vit C, braškių ir miško uogų skonio, 4 vnt.
Įvairių skonių ledinukai valkams nuo 3 metų su vaistažolių ekstraktais ir vitaminu C.
Maisto papildai
HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių
HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių
HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių
Šveicarijoje pagamintos pastilės gerklei ir imunitetui. Sudėtyje esančios islandinės kerpenos, vaistinių šalavijų lapų ekstraktas padeda palaikyti gerklės ir balso stygų funkcijas, o vitaminas C – normalią imunines sistemos veiklą.

-40%

Sausoms akims ARTELAC®

ARTELAC® REBALANCE, 10 ml
ARTELAC® SPLASH, 10 ml
ARTELAC® NIGHTTIME GEL, 10 g

Medicinos priemonės

„ARTELAC®" – PAŽANGŪS SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS

„Artelac® Splash" pasirenkamiausias mūsų produktas su hialuronu skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.
„Artelac® Rebalance" užtikrina maksimalai drėkinantį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildo ašarų plėvelę puoselėjančiais jonais, vitaminu B12, bei sureguliuoja osmosinį akies paviršiaus balansą ir tokiu būdu padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireiškimą.
„Artelac® Nighttime Gel" atkuria ašarų plėvelę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia dideses ir nuolatinis akių sausumas.
2024.11.11.

-45%

BERŽO GRYBAS
Juodojo beržo grybo ekstraktas, 150 ml

Maisto papildas

Sudedamosios dalys: juodojo beržo grybo ekstraktas 1:5 (100 proc.), konservantas natrio benzoatas. 15 ml ekstrakto (rekomenduojamame per parą suvartoti kiekyje) yra 3 g juodojo beržo grybo. Vartojimas. Gerkite po 1 arbatinį šaukštelį ekstrakto (gėrio) (30 ml vandens) 3 kartus per dieną, 20 – 30 min. prieš valgį. Rekomenduojama vartoti 3 – 5 mėnesius; po kiekvieno ekstrakto varojimo mėnesio darykite 7 dienų pertrauką. Produktas pagamintas iš natūralių augalinių ingredientų, todėl jam stovint susidaro nuosėdos, kurios ištirpsta supurčius butelį.

-30%

Magnio šaltinis

SUPMAGNIT pailginto atpalaidavimo trijų sluoksnių magnio tabletės, N30

Maisto papildas

Supmagnit – tai inovatyvios technologijos TRIJŲ SLUOKSNIŲ MAGNIO TABLETĖ, užtikrinanti geresnį magnio pasisavinimą. Trifazis magnio atsipalaidavimas: skirtingu laiku, skirtingose virškinamojo trakto vietose. 1 tabletėje yra 364 mg elementinio magnio. Patogu vartoti – tik 1 tablete per parą. Magnis yra gyybiškai svarbus žmogaus organizmui. Jis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją bei energijos apykaitą.

iki -35%

dr. SODA produktų linija

Kosmetika, maisto papildai, medicinos pagalbos priemonės

Produktai su maistine soda – veikaningas pasirinkimas odos priežiūrai, atsipalaidavimui vonioje, organizmo pH balansui ir burnos gaivai. Švara ir gaiva su maistinės sodos galia!

-10%

LIDONIUM®, 700 mg tab. N42

Specialios medicininės paskirties maisto produktas su ugniažole

Tik mitybos reguliavimui esant susilpnejusiam lėtiniam imunitetui, vėžio prevenciniais tikslais, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę, bei esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūslės lėtiniams uždegimams.

-35%

DIAWELL CAPS, kapsulės N30

Maisto papildas

Alfa lipoinės rūgšties, cinamono, imbiero ir chromo kombinacija.
Normalai gliukozės koncentracijai kraujyje.

iki -55%

GINKOPRIM 40 mg tab. N30
GINKOPRIM 40 mg tab. N60
GINKOPRIM MAX 120 mg tab. N30

Maisto papildai

„GinkoPrim™" – standartizuotas ginkmedžių lapų ekstraktas ir magnio derinys.
„GinkoPrim® Max 100 mg" – didesnio kiekio ginkmedžių lapų ekstraktas ir magnio derinys. Dviskiautis ginkmedis padeda palaikyti normalią kognityvinę funkciją, smegenų veiklą ir psichinę būklę, bei padeda palaikyti normalią periferinę (ausų ir akių) kraujotaką. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. LT Gink 61116

GERAI SAVIJAUTAI

MANO vaistinė

-35%

Miegui

HYPNOZAN, 20 kapsulių

Maisto papildas

- Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę.
- Melisa – gali palaikyti normalų užmigimą, miegą bei psichinę sveikatą ir padeda atsipalaiduoti.

Vartojimas: suaugusiesiems geri 1 kapsulę 30 minučių prieš miegą užgeriant stikline vandens.
Maisto papildas
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

iki -35%

Imuninei sistemai IMUNITAL

IMUNITAL PLUS, 30 kapsulių
IMUNITAL VITAMIN C 1000 SHOTS, 20 buteliukų
IMUNITAL SHOTS, 20 buteliukų

Maisto papildai

MAGIŠKAI TVIRTAS IMUNITETAS

Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neigiamiems aplinkos veiksniams. Tam tikru metų laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz., esant perkaitinę kūrę sezonui) gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai.
„Imunital" – skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai, skirti imuninei sistemai.
Kapsulės „Imunital Plus" su kininiais kordicepsais ir ežiuolės ekstraktu.
Shotai: Imunital Shots – tai stipri programa imunitetui su bičių pienelio, priešpienio koncentratu, reishi ir shitake grybų ekstraktais bei vitaminu B6. Tik 1 buteliukas per dienę! „Imunital Vitamin C 1000 Shots" – didelė dozė stabilizuoto vitamino C imunitetui.

-25%

MEDISTUS® Antivirus pastilės N10

Medicinos priemonės

Nuolatinė sveikatos apsauga esant padidėjusiai infekcijos rizikai. Regulianos Medistus® Antivirus pastilių vartojimas, esant padidėjusiai snuo plintančių infekcijų rizikai, palaiko apsaugą nuo virusinės ir bakterinės kilmės kvėpavimo takų infekcijų, sukurta fizinę apsaugą, barjerą burnos ir nyklės gleivinėje. Veikliosios medžiagos esančios Kistosyn® 200 ekstrakte padengia burnos ir gerklės gleivinės membraną, puriūšių ir yra tarsi fizinis apsauginis barjeras. Tai padeda atskiriančiai virusų ir bakterijų prieš jems patekant į organizmą. Kistosyn® 200 veikliųjų medžiagų kompleksas sudėtyje yra tik natūralios, augalinės kilmės medžiagos.

-50%

Miegui

MIRALO SLEEP, 20 kapsulių

Maisto papildai

„MIRALO". TAVO RAMYBĖS GALIA.

Švedijoje pagamintų maisto papildai su stiprios koncentracijos augalinės ekstraktais „MIRALO SLEEP" sudėtyje esantis melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (reigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti), o magnėzinę vitaminą (angl. Ashwagandha) ekstraktas padeda palaikyti širdies bei kraujagyslių sistemą.

5,12 € **8,68 €**

CARBOSAN 2% gelis
TROPEX ausų lašai, tirpalas, 10 ml

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Carbosan vartojamas Kūno, burnos gleivinės ar apybuntio sužeisimams, pvz., Herpes simplex, Herpes labialis arba Herpes febrilis pažeidimams gydyti. Be to, jis tinka burnos gleivinės žaizdoms bei opoms gydyti. Carbosan 1g gelio yra 20,8 mg karbonoksolono natrio druskos, atitinkančios 20 mg karbonoksolono. **Vartojimas:** Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 3 m. veikamo stonu sluoksniu tepti pažeistą vietą 4k. per parą po valgio ir prieš miegą. Kūno žaizdos ar burnos opas reikia pradėti tepti gelio iš karto, kai tik atsiranda pirmieji pažeidimo simptomai. Gelis ant pažeistos vietos turi likti kiek įmanoma ilgiau. **Carbosan vartoti draudžiama:** jei sergate širdies, kepenų arba inkstų ligomis; jei sukėtes kraujospūdis; jaunesniems nei 3 m. vaikams ir senyviems žmonėms; jei mažas albumino lygis kraujyje; nėščiosioms ir žindyvėms; jei vartojama vaistų nuo širdies ligų. Jei žaizda yra užkrista bakterijomis, reikia pradėti tinkamą gydymą. Jei pažeidimas per 3 savaites neužgija, būtina patikslinti diagnozę ir gydymą.
TROPEX 10 ml. Rekomenduojama vartoti vidurinės ausies uždegimo simptomų lengvinimui. **Veikliosios medžiagos:** 5% fenazono, metilo parahidroksibenzoatas ir glicerolis. **Vartojimas:** vartojami vertikai į išorės ausies landą. Suaugusiems ir vaikams laikeri po 4-6 lašus į ausį 3-4 k. per parą. Tropex visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką. **Galimas šalutinis poveikis:** Tropex, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį. Vartojant lašus gali pasireikšti vietinės ausies landos alergiės reakcijos, sudirginimas, paraudimas. Jeigu pasireiškia sunkus šalutinis poveikis kreipkitės į gydytoją ar vaistininką. Fenazoną vartojant vertikai į ausies landą, perforavimas mažai tikėtinas.

-30%

Miegui ir nervų sistemai MAISTO PAPILDAI

NEUROMED SLEEP, 15 čiulpiamų tablečių miegui
NEUROMED SLEEP FORTE, 30 čiulpiamų tablečių miegui
NEUROMED RELAX, 15 kapsulių streso kontrolei
NEUROMED GOOD MOOD, 15 kapsulių gerai nuotaikai

Maisto papildai

KARTU Į RAMYBĘ SU „NEUROMED"!

Išbandykite **„Neuromed Sleep FORTE"** – trejopo efekto čiulpiamąsias tabletes, kurios padės greičiau užmigti, kokybiškai išsimiegoti ir ryto jausitės švaiai.
„Neuromed Sleep" – geriu pagalba, kad pavyktų lengviau užmigti ir ramiai miegoti. Vartoti epizodiškai, neužmirgant, probundant naktį.
„Neuromed Relax" – streso kontrolei ir nervų sistemai. Vartoti jaučiant laikinę nerviną įtampą ir stresą.
„Neuromed Good Mood" su šafranu ir kurkumina – gerai nuotaikai, psichologinei funkcijai, nuovargiui mažinti. Vartoti patiriant ilgiau užsitęsusį stresą, jaučiant nuovargį, apleistiant pozityviomis mintimis.

-25%

Herbisland – sausam, dirginančiam kosului.

HERBISLAND 6mg/ml sirupas 150ml

Medicinos preké

Herbisland sirupo sudėtyje yra islandinių kerpių ekstrakto. Herbisland rekomenduojamas vartoti pasireiškus: sausam, dirginančiam kosului; užkimimui; gerklės skausmui. Herbisland sumažinakosulio receptorių dirginimą ir sudrėkina sausą gleivinę. Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus. Be cukraus (j sudėtį įeina natūralios kilmės sorbitolis). Malonaus otrinę skonio.
Kaip vartoti Herbisland?
1-4 metų vaikams – 2,5 ml (1/2 matavimo šaukštio) X 4k./d.
4-10 metų vaikams – 5 ml (1 matavimo šaukštas) X 4k./d.
10-16 metų vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukšteliai) X 4 k./d.
16 metų ir vyresniems – 15 ml (3 matavimo šaukšteliai) X 4 k./d.
Negalima vartoti dažniau kaip 4 kartus per parą.
Jei po 7 dienų simptomai nepalengvėja, pasitarkite su gydytoju.

-30%

Nosies purškalas

CLINSIN SPRAY, 30 ml

Medicinos priemonė

Purškalas padeda palaikinti iš nosies ir ančių sunkaupsiras išskyras, slopina bakterijų dauginimąsi, regeneruoja ir drėkina nosies gleivinę. Preparatas yra itin veiksmingas dėl jo sudėtyje esančio sidabro ir vario derinio. Padeda kovoti su infekcijomis veikdamas greitai ir keleriopai. Dėl sidabro savybių preparatas užtikrina gleivinių valymą, antibakterinę apsaugą ir tinkamą priežiūrą. Slopina gleivinėse susikaupusių kenksmingų patogeninių mikroorganizmų dauginimąsi. Varis padeda gydyti grybelių sukeltus pažeidimus nosies ir prienosinių ančių srityje. Panthenolis regeneruoja, sustiprina ir drėkina gleivinę, pagerina bendrą būklę. Eukaliptų aliejus ir fiziologine druska išraisi virbalinius kvėpavimo takus, sumažina nosies išskyras ir palengvina kvėpavimą. Medicinos priemonė „ClinSin spray" įpsė rekomenduojama vartoti esant virbalinių kvėpavimo takų infekcijoms. **Sudėtis:** vanduo, poliosorbatas 28, glicerinas, panthenolis, natrio chloridas, eukaliptų aliejus, kalio sorbatas, hidroksipropilcellulozė, sidabro nanodalelės, varis nanodalelės, citrinų rūgštis. **Vartojimo būdas:** suaugusiesiems purkšti kelis kartus per dieną po 2–3 dozes į abi šnerves. Prieš vartojant pakratyti. Higienos sumetimais rekomenduojama preparatą vartoti vienam asmeniui. Medicinos priemonė skirta suaugusiesiems. Nevartoti jos vaikams, netiesi gydytojas bičių siliksi nurodes kitaip. Nevartoti dulsesnių dozių nepa nurodyta. Sevartoti per 4 savaites nuo pirmojo atidarymo.

iki -10%

PROFERTIL kapsulės N180
PROFERTIL kapsulės N60

Specialios medicininės paskirties produktas

JŲ VYRAI TURI RUOŠTIS NĖŠTUMUI!

PROFertil® yra specialios medicininės paskirties produktas, kurio sudėtyje esančios medžiagos gali padėti pagerinti spermos kokybę, kuri būtina pastojimui.
PROFertil® pagerina spermatozoidų judrumą, morfologiją, spermos koncentraciją ir tūrį. Mokslinės studijos patvirtina PROFertil® veiksmingumą, jų metu buvo pasiektas žymus spermos kokybės pagerėjimas ir 26-41 proc. nėštumo atvejų.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaRj@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-25%

Nervų sistemai ir kokybiškam miegui

ValeroZAN maisto papildas, 60 tablečių

Nervų sistemos veiklai, psichinei sveikatai ir atsipalaidavimui

ValeroZAN Drops maisto papildas geriamasis tirpalas, 50 ml

Maisto papildai

„VALEROZAN" – PADĖS NUSIRAMINTI IR RAMIAI UŽMIGTI.

ValeroZAN maisto papildas, 60 tablečių
- Vaistiniai valerijonai injaprastieji apymai padės greičiau nusiraminti ir pagerinti miego kokybę.
- Paprastosios sukatžolės padės palaikyti normalią nervų sistemos būklę ir pulsai tiks esant stipriam širdies plakimui.
- Vaistinės melisos padės greičiau atsipalaiduoti.
- Nesloginę, galima vartoti dienos metu.

ValeroZAN Drops maisto papildas geriamasis tirpalas 50 ml
- Paprastosios sukatžolės padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
- Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią psichinę sveikatą.
- Vaistinės melisos ir piparės mėtos padeda greičiau atsipalaiduoti.
- Skysta preparato forma užtikrina greitesnį veikimą.

-30%

SYSTANE ULTRA MDPF drėkinantys akių lašai, 10 ml
SYSTANE HYDRATION MDPF akių lašai, 10 ml
SYSTANE BALANCE akių lašai, 10 ml
SYSTANE GEL DROPS akių lašai, 10 ml

Systane® ULTRA MDPF, drėkinantys akių lašai be konservantų. Greitas palengvėjimas. NAUJIENA!!!
Systane® HYDRATION MDPF, drėkinantys akių lašai. Ilgalaikis pažeistų akies paviršiaus ląstelių drėkinimas ir atnaujinimas.
Systane® BALANCE, drėkinantys akių lašai. Sausų akių simptomų palengvinimas ir ašarų plėvelės lipidų sluoksnio atnaujinimas.
Systane® GEL DROPS, drėkinantis akių gelis. Papildoma apsauga nuo sausų akių simptomų.

iki -35%

SWANSON atrinktiems maisto papildams

Maisto papildai

Swanson maisto papildai pagaminti JAV, laikantis aukščiausių kokybės standartų. Įgamintė Swanson gamybos patirtis leidžia užtikrinti, kad visi produktai yra kokybiški, efektyvūs ir veiksmingi.

-55%

Akims ir regėjimui

BLUE BERRY™

Maisto papildai

ORIGINALŪS ŠVEDIŠKI VITAMINAI AKIMS IR REGĖJIMUI!

Originalų švediškų **„New Nordic"** vitaminų akims ir regėjimui **„Blue Berry Omega 3"**, **„Blue Berry Eye Stress"**, **„Blue Berry GUMMIES"**, **„Blue Berry Plus Eye/Vitamin"** sudėtyje yra mėlynių, akinotės ekstrakto, luteino, vitamino A. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą. Mėlynių uogų ekstraktas padeda palaikyti normalų regėjimą. **„Blue Berry Omega 3"** sudėtyje papildomai yra omega 3 riebalų rūgščių – eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir dokozahekseno rūgšties (DHR). DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą, kai jos per parą suvartojama 250 mg. Taip pat svarbu juoti, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

-25%

REFLUXAID Nipio sirupas 150ml
REFLUXAID sirupas 250ml
REFLUXAID tab. N12

Maisto papildas

REFLUXAID® yra medicinos priemonės skirtas gastroezofaginio refliukso (GERL) bei ezofagito simptomams mažinti. Vartojant šį medicinos priemonę susilpnėja tokie simptomai kaip: deginimo pojūtis (pemue), atsirūgimas, apsunkintas rijimas (disfagija), skausmingas rijimas (odinofagija), kosulys, užkimimas.
Refluxaid Sirupo Vartojimas. Prieš naudojimą supurtyti. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti po 10-20 ml sirupo po valgio arba prieš miegą. Jaunesniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti pusę dozės (5-10 ml) po valgio arba prieš miegą.
Refluxaid Tablėtės Vartojimas. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų rekomenduojama vartoti po 1-2 tabletes po valgio ir / arba prieš miegą.
Refluxaid Nipio Vartojimas. Prieš naudojimą supurtyti. Kūdikiams iki 5 kg svorio: rekomenduojama dozė yra 1 ml sirupo, praėjus 5-10 minutėms po maitinimo. Atsiradus vėmimui, rekomenduojama papildomai suvartoti 1 ml sirupo. Iki 3 metų amžiaus vaikams (5-15 kg svorio) rekomenduojama dozė yra 4 ml po valgio ir prieš miegą.

-40%

VITAMIN C PRO forte N30
VITAMIN C prolong N40

Maisto papildai

STIPRINTI IMUNITETĄ DAR NEBUVO TAIP PAPRASTA!

„Vitamin C prolong" kapsulės ir **„Vitamin C PRO forte"** geriausių skonio kramtomosios tabletės yra pasižymėję veikimo patentuotas vitaminas Ester-C®. Mokslinėjai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pasišalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažeidos bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: „Vitamin C prolong" geriš po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stiklinę vandens, o „Vitamin C PRO forte" sukramtyti po 1 tabletę per dieną.

-30%

FOLIO RŪGŠTIS 400µg tabletės N90
FOLIO RŪGŠTIS 800µg tabletės N60

Maisto papildas

IŠBANDYKITE VALENTIS FOLIO RŪGŠTĮ IR DŽIAUKITĖS PUIKIA SAVIJAUTA!

Folio rūgštis svarbi ne tik planuojančiai nėštumą, besilaukiančiai, bet ir kiekvienai moterai, nes padeda:
- Palaikyti normalią kraujodarą;
- Mažinti pavargimo jausmą;
- Palaikyti normalią psichologinę funkciją;
- Laukiantis - padeda palaikyti motinos audinių augimą nėštumo metu.

-50% -55%

LUNESTIL DUO kapsulės N15
LUNESTIL DUO kapsulės N30

Maisto papildas

-35% -40%

Akims

OCUVAL HYDRO MAX, 30 kapsulių
OCUVAL STRONG, 30 kapsulių
OCUVAL, 30 tablečių

Maisto papildai

OCUVAL – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA!

Išbandykite naują sprendimą akių drėgmei – **„Ocuval Hydro Max"**! Šis pačiangus papildas sukurtas taip, kad pridrėkintų akis iš vidaus, mažintų nuovargio ir jautrumo pojūtį, bei suteiktų jūsų akims ilgalaikį komfortą.
Rekiės **„Ocuval Strong"** jei norite palaikyti normalią regėjimą, apsaugoti akis nuo aplinkos veiksnių ar sušvelninti senėjimo poveikį akims.
Atraskite **„Ocuval"** tabletes, kurios padės palaikyti normalią akių sveikatą, vaizdo aiškumą.

iki -35%

microlife

MICROLIFE atrinktiems kraujospūdžio matuokliams, inhaliatoriams ir termometrams

Nereguliarus pulso detektorius
Nereguliarus pulso detektorius (HR) ankstyvai širdies ritmo sutrikimų diagnostikai
Insulto rizikos detektorius
Ypatingai tikslus prieširdžių virpėjimo (AF) detektorius AFIB insulto rizikos prevencijai
MAM technologija
3 matavimai iš eilės tik vienu mygtuko paspaudimu

-40% -45%

MAGNETRANS DRINK 400 mg granulės gėrimui paruošti, N20
MAGNETRANS DIRECT 375 mg burnoje tirpstančios granulės, N20

Maisto papildai

Magnetrans drink 400 mg. 1 pakeltėje yra 400 mg magnio. Magnis naudingas daugeliui procesų mūsų organizme: padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Gaivaus apelsinų ir greipfrutų skonio.
Magnetrans Direct. Burnoje tirpstančios granulės raumenims ir nervų sistemai. Otrinų ir greipfrutų skonio. Tobula keliaujant. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Tinka nuo 12 metų. 2402_SB_Magnetrans_V01_LT

-20%

Augalinai maisto papildai energijai, imunitetui, atminčiai

SUPERFOODS NATURE'S BEST

Maisto papildai

SUPERFOODS NATURE'S BEST. ATRASK JUOS VISUS. ATRASK SAVO SUPER GALIĄ!

SUPERFOODS NATURE'S BEST gamtos išminčių apjungia su biolaikinių inovacijų galia. Taip išgauniamos neįkainojamos maistingosios medžiagos, kurios sutalpinamos į koncentruotas dozes.
SUPERFOODS NATURE'S BEST produktų sudėtyje sukauptos vienos vertingiausių natūralios kilmės medžiagų, išlaikant jų vertingąsias savybes ir tuo pačiu maksimalai koncentruojant jų galią.

-30%

VITAMINAS C 500 mg, 50 tablečių
VITAMINAS C 200 mg, 50 tablečių, braškių skonio
VITAMINAS C 200 mg, 50 tablečių, apelsinų skonio

Maisto papildai

VITAMINAS C – VISOS ŠEIMOS POREIKIAMS IR SKONIAMS!

Išbandykite mėlynaus braškių, apelsinų skonio ir didelės koncentracijos Vitaminą C, kuris padeda:
- palaikyti normalią imunines sistemos veiklą;
- mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;
- apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidos;
- palaikyti normalų kolageno, reikalingo dantenų, odos, kraujagyslių funkcijai, susidarymą.

-40% -45%

GOOD SLEEP CAPS, 30 kapsulių
GOOD SLEEP SPRAY 30 ml

Maisto papildai

Good Sleep Caps ir **Good Sleep Spray** sudėtyje yra melatonino.
Good Sleep Caps – raudonžiedės pasiflorės žolės ekstraktas ir apyniai padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją.

iki -35%

OCUTEIN KRISTAL, 30 kapsulių
OCUTEIN RETIN, 30 kapsulių
OCUTEIN BRILLANT, 30 kapsulių
OCUTEIN FORTE, 30 kapsulių

Maisto papildai

OCUTEIN SENSITIVE PLUS, 15 ml
OCUTEIN RIBO-HYAL, 10 ml

Medicinos priemonės

Ocutein KRISTAL – krištolo tyrumo regėjimui!
Ocutein RETIN – patobulinta formulė daug dirbančių akių mikrocirkuliacijai.
Ocutein BRILLANT – brilianti apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims.
Ocutein FORTE – trejopas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims.
Ocutein SENSITIVE PLUS – jautrioms, daug dirbančioms akims.
Ocutein RIBO-HYAL – regeneracija kiekviename lašei!

-55%

SALUTIL, 10 kapsulių
SALUTIL PREMIUM 9, 30 kapsulių

Maisto papildai

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-50%

Vitamino D3 šaltinis

OLIDETRIM 2000 TV 60 minkštųjų kapsulių
OLIDETRIM 2000 D3 + K2 Omega-3 30 minkštųjų kapsulių
OLIDETRIM 4000 D3 + K2 Omega-3 30 minkštųjų kapsulių

Maisto papildai

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS

- Imunitetui – Vitaminas D 2000 ir 4000 TV
- Širdžiai, smegenims – DHA+EPA omega-3 rūgštys
- Kaulams ir raumenims.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Vitaminas D padeda sumažinti riziką gristi, kuri yra siejama su nestabilia laikysena ir raumenų silpnumu. Griuvimas yra 60 m. ir vyresnių vyrų ir moterų kaulų lūžių rizikos veiksnys. Omega-3 riebalų rūgštys DHA (dokozaheksaenė) ir EPA (eikozapentaenė) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHA ir EPA. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą.
Siekant maksimalaus padidinti vitamino D papildo naudą, jaos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.
Rekomendujama vartoti 1 kapsulę per parą.

iki -40%

Žarnyno mikroflorai

COMPLIFLORA FAMILY, 10 kapsulių
COMPLIFLORA FAMILY+, 10 paketėlių
COMPLIFLORA FEMINA, 10 kapsulių
COMPLIFLORA IMMUNO, 30 kapsulių
COMPLIFLORA KIDS GUMMIES N60
COMPLIFLORA BABY DROPS 10 ml

Maisto papildai

„Compliflora Family" ir **„Compliflora Family+"** – formulė „keturi viename". Bakterijos, kolonizuojančios ir plonąjį ir storąjį žarnyną. Didelė KSV (kolonijas sudarančių vienetų) dozė. Ypatingas gamybos metodas: bakterijos atsparios skrandžio rūgštims, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. **Vartojimas:** 1 kapsulė arba 1 paketėlis per dieną. **„Compliflora Baby Drops"** – formulė „du viename". Bifidobacterium lactis BS01 ir Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53101 kompleksas aliejaus forma. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį vartojant, be to, nereikia specialių laikymo sąlygų. **Vartojimas:** kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną. **„Compliflora Femina"** – formulė „keturi viename", ją sudaro 4 specialiai atrinktos Lactobacillus genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai liaipmo irtyties organų sistemos mikroflorai.
„Compliflora immuno" yra kompleksinis produktas, sukurtas siekiant palaikyti gerą imuninę organizmo būklę. Vienoje kapsulėje yra 4 milijardai mikrokapsuliuotų pieno rūgšties bakterijų, cinko bei vitamino D.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. **Vartojimas:** 1 kapsulė per dieną.

-40%

VAGISAN, drėkinamasis kremas 50 g
VAGISAN, intymios higienos prausiklis 200 ml
VAGISAN, pieno rūgšties ovulės, 7 vnt.

Medicinos priemonės, kosmetikos priemonės

„VAGISAN" prausiklio sudėtyje esančios natūralios ūrūgos, pieno rūgštis ir manoma, prieš uždegimus veikiantis ramunėių ekstraktas švelniai apsaugo tin jautrią zoną nuo bakterijų ir grybelių. Prausiklį galite naudoti kasdien, taip pat menesinių ar nėštumo metu. „VAGISAN" kremas naudojamas esant makšties ir išorinių lytinių organų srities išausejimui. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

iki -50%

Elektrolitai, sąnariams, kaulams ir raumenims

BIOFARMACIJA atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

Maisto papildai nėštelais geriamajam tirpalui ruošti. Išsirinkite rekalingiausią: „Sport & Joints" – elektrolitai su kalciu ir gliukozaminu. „Sport&Protein" – kolagenu, pieno baltymų, magnio ir vitamino C kompleksas raumenų masei augintiir išlaikyti, kremzlėms ir odai. „Sport&Amino WHO" – bene vienintelis net 8 amino rūgščių kompleksas su folio rūgštimi. „Sport&Isotonic" – bene vienintelis izotoninis produktas su augalų ekstraktais, atstatantis praraistus elektrolitus, mikroelementus, vitaminus ir energiją, saugant svaibiausia organą – širdį. „Sport&Hydro+" – reikalingiausią elektrolitų kompleksas su hialuro rūgštimi energijos balansui palaikyti. „bioCalcium 680 mg" – net 600 mg grynio kalcio citratas mineliais su vitaminu D! „bioGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg" – net 1500 mg gliukozamino su vitaminu C, kalciu ir vitaminu D. Gliukozaminas yra sąnario kremzles struktūrine dalis. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapųjų medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje.

-45%

REXSAVIT – naujos kartos maisto papildai liposomose – dar geresniam įsisavinimui!

Maisto papildai

Lipo D3 2000 IU (Imunitetui, Kaulams);
Lipo Magnis (Nervų sistemai, Raumenims, Energijai);
Lipo Magnis+B6 (Nervų sistemai, Raumenims, Nuovargiui mažinti);

- Liposominė technologija užtikrina, kad vitaminai ir mineralai išlaikys savo vientisumą, kol bei kelauja virškiamuoju traktu, o vėlau ir kartu su kraujo iki savo tikslo. Liposominiai maisto papildai yra puikus pasirinkimas norintiems geresnio veikliųjų medžiagų įsisavinimo efekto.

Pagaminta Lietuvoje. Jūsų sveikam ir ilgam gyvenimui.

-25%

BIFOVAL®
Žarnyno mikroflorai

BIFOVAL FORTE, 15 kietųjų kapsulių
BIFOVAL BABE, 25 kramtomosios tabletės

Maisto papildai

„BIFOVAL™" – LAIKAS VEIKTI!

Specialiai parinktos sudėties maisto papildai kiekvieno ryto ritualui 15-30 min prieš kiekvienos pusryčius.
„Bifoval® Forte" – 5 milijardai lacto- ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padermės. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).
„Bifoval® Babe" – braškių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lacto ir Bifido bakterijų kompleksas (3,15 mlrd. 1 tabletėje). Vaikams nuo 3 metų.
Vartojant antibiotikus geri 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo.

-50%

PROPODEZAS, 50 čiulpiamų tablečių

Maisto papildas

BIČIŲ JĖGA IR GERKLĖI, IR IMUNITETUI!

Tai propolis (bičių pikis), bičių pienelis su vitaminu C ir augalinais ekstraktais – ne tik naudingas gerklei ir imunitetui, bet ir gaivai skanus. Pasirinkite savo skonį – su avietėmis, imbieru, eriketuegėmis, vaistažolėmis arba stipresnę versiją – Propodezas Forte su ženvamežiu. Pagamintas Lietuvoje.
Imbieras, ženvamežio uogų ekstraktas, vitaminas C, padeda palaikyti normalią kvėpavimo taką ir imuniteto veiklą.

iki -55%

WALMARK atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

iki -50%

Nervų sistemai, raumenims

BIOFARMACIJA atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

Papildykite organizmą magnio atsargomis iš Negyvosios jūros! Išsirinkite Jums reikalingiausią: tik gryną magnį, kartu su kaliu ar B6 vitaminu, ar visą kompleksą – magnis, kalis, kalcis, cinkas ir vitaminas D.
Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapnių medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje. Negyvosios jūros galia Jūsų organizmui!

iki -30%

Pagalba esant hemorojui

MASTU tepalas 30g
MASTU žvakutės N10

Medicinos priemonės

Veiklosios medžiagos: bismuto subgalatas, titane dioksidas (E171). Mastu tepalas ir žvakutės yra medicinos priemonės, skirtos naudoti esant hemorojui. Jos slopina negalavimus, karie dažnai stiprinda esant hemorojui: sudirginimą, niežų, uždegimą, išpūtimą, skatina žaizdos gijimą. Naudojimas: tepalo: 2-3 kartus per dieną, žvakutės: 2 kartus per dieną. Mastu tepalą ir žvakutes vartoti draudžiama, jeigu pradėjęs jautrumas (alergija) vienam iš sudedamųjų dalių.

iki -35%

Kaulažolių „Dr. Theiss" priemonės

Kaulažolių gelis, 100 ml
Kaulažolių tepalas su vitaminu E, 50 g
Kaulažolių šildantis kremas, 50 g
Dr. Theiss šildomasis pleistras

Medicinos pagalbos priemonės

KAULAŽOLIŲ „DR.THEISS" PRIEMONĖS – SENOLIŲ IŠMINTIS!

Kaulažolių tepalas „Dr. Theiss" su vitaminu E dėl sudėtyje esančio atkuriamosiomis savybėmis išskiriančio alantoino (išpauto iš kaulažolių ekstrakto) tinka nugarai, raumenims, sąnariams (brinti, nuovargiui palaižinti, taip pat sumušimams, patempiamams, odos pažeidimams, skilinėjantiems kulnams prižiūrėti. Sudėtyje esantis vitaminas E prasiskverbia pro ląstelių membranas, paąerina ląstelių maitinimą. Taip pat galima rinktis šildomąjį kaulažolių „Dr. Theiss" kremą su Kajeno pupelkomis ir rozmarinu eteriniu aliejumi, kuris sušildo odą ir skatina kraujo apytaką, padeda palaižinti įtampą, jaučiamą nugaros ir pečių juostos raumenyse, atsikratyti nemalonių pojūčių po fizinių krūvių. Kaulažolių tepalas „Dr. Theiss" pagamintas pagal originalią senąją receptūrą.
Dr. Theiss šildomasis pleistras šildo ir malšina skausmą. Veikia iki 12 h. Naudoti esant įtampoms ir skausmams pomo raumenų grupėms (kaklo, pečių, nugaros), neuralginiams skausmams ir neuralgijai. Pleistras dėl savo savybių atpaleidžia gilesnius raumenų grupes ir malšina skausmą.

-35%

„INTACT" gliukozės tabletės, 40 g

Maistas

„INTACT" GLIUKOZĖ – BURNOJE GREITAI TIRPSTANTI PAGALBA!

Tirpios burnoje įvairių skonių gliukozės tabletės „Intact" padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Gliukozė yra pagrindinis visų organizmo ląstelių maistas. Gliukozė tesosgiai dalyvauja ląstelių medžiagų apykaitoje. Čukras kraujyje svyruoja nergant 1-o tipo cukrinių diabetu, jo trūkstant greitai mažėja tunkiai dirbant ar sportuojant, taip pat įtempią protinį ar fizinį darbą dirbantiems žmonėms, vaikams, jaunimui, sportininkams. Vienoje tabletėje yra 89 % grynos gliukozės. Rekomenduojama suvartoti iki 6 tablečių per dieną.
Skoniai: apelsinų, avietės, gervuogių, citrinų, žemuogių, žemuogių jogurto, mėtyniu jogurto, vyšnių, kokos, juodųjų serbentų, obuolių, mango, pasifloro, bananų.

-20%

FEMARELLE RECHARGE (Perkrovimas) kapsulės N56
FEMARELLE REJUVENATE (Atnaujinimas) kapsulės N56
FEMARELLE UNSTOPPABLE (Nesustabdomas) kapsulės N56

Maisto papildai

Femarelle® Recharge hormonų reguliavimui ir normaliai savijautai menopauzės metu. Sudėtyje yra gausutėlių sojų ir sėjamųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B6.
Femarelle® Rejuvenate geras nuotaikai, odai ir nuovargio mažinimui. Sudėtyje yra gausutėlių sojų ir sėjamųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B2 ir biotino.
Femarelle® Unstoppable moterims po menopauzės normaliai kaulų būklei palaikyti. Sudėtyje yra gausutėlių sojų ekstrakto, kalcio, biotino, vitaminų D ir B2.

iki -55%

Sąnariams ir kaulams

PROENZI ARTHROSTOP 30, 60, 100 tablečių
PROENZI ARTHROSTOP kremas, 100 ml

Maisto papildai

PROENZI MAISTO PAPILDAI SĄNARIAMS SU GLIUKOZAMINU, CHONDROITINU, KOLAGENU, BOSVELIJOS EKSTRAKTU. JUDĖK LAISVAI!

„Proenzi Arthrostop, Intensive" – maistinių medžiagų kompleksas sąnariams. Baltųjų gluonių (Salix alba) ir oberžolių (Curcuma longa) ekstraktų derinys padeda palaikyti normalią sąnarių būklę ir lankstumą. Pluoštinių boswelijų (Boswelia serrata) žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių būklę. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų funkcijai, susidarymą.
„Proenzi Arthrostop Plus" sudėtyje yra gliukozamino ir MSM derinys kartu su žolelių ekstraktu iš pluoštinių boswelijų ir manganu. Pluoštinių boswelijų žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių funkciją.
„Proenzi Arthrostop" – masažinis kremas, skirtas odai sąnarių srityje ir aplink sąnarius. 2305_SB_Proenzi_V01_LT

-45%

BIORYTHM ASHWAGANDHA kapsulės N30
BIORYTHM IRON kapsulės N30
BIORYTHM MAGNE B6 kapsulės N30
BIORYTHM SELENIUM kapsulės N30
BIORYTHM VIT B12 kapsulės N30
BIORYTHM ZINC kapsulės N30

Maisto papildai

-25%

LEPICOL PLUS, 180 g miltelių
LEPICOL, 180 g miltelių
LEPICOL, 180 kapsulių

Maisto papildai

LEPICOL – GERA JAUSTIS LENGVAI!

„Lepicol" – unikalus, natūralios kilmės medžiagų derinys žarnynui ir virškinimui. Balkūnų gysločių/lubelės, inulinas ir pieno rūgšties bakterijos – natūraliai žarnyne gyvenančios laktobacilos ir bifidobakterijos. „Lepicol Plus" papildytas augalinės kilmės fermentais iš imbiero šaknų, pipemečių lapų ir pankolio sėklų normaliai virškinimo funkcijai palaikyti.
Maksimalus grynumas – sudėtyje tik natūralios kilmės veiklosios medžiagos, nėra jokių papildomų ingredientų, konservantų ar kitų cheminių priedų!

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaRj@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-50%

Moterims DIFOLIN

DIFOLIN+, 30 kapsulių
DIFOLIN, 60 tablečių

Maisto papildai

„DIFOLIN" – MAISTO PAPILDAI MOTERIMS.

„Difolin" – moters gerai savijautai: hemoglobinui, energijai, nervams, imunitetui. Mikrokapsuliuota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis. „Difolin" sudėtyje naudojama mikrokapsuliuota liposomose geležis organizme efektyviai pasisavinama, neturi geležies poskonio, nedirgina virškinimo trakto, neturi speigkios šamatistu. Geležis, folio rūgštis, vitaminas B12 – siem būtiniausių kraujo gamybai elementų. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų, naudingų kraujo kūnelių susidarymą, geležis – hemoglobino susidarymą, folatai – kraujodarą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis – nervų sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 – energijos apykaitą.
„Difolin" – planuojančiosms pastoti, nėščioms, žindančioms moterims: folio rūgštis + vitaminas D3. Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį. Mažas folatų kiekis nėščiosios kraujo ir otrocitluose yra besisystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Tinkamas poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 µg folio rūgšties ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja ląstelių dalijimosi procese.

iki -40%

Nuo grybelio **MYCOSAN**

MYCOSAN serumas nuo nagų grybelio (5 ml ir 10 ml)
MYCOSAN priešgrybelinis pėdų gelis (15 ml)
MYCOSAN PROTECT priešgrybelinis pėdų purškalas (80 ml)

Medicinos priemonė

„Mycosan" skirtas nagų ir pėdų grybeliniams infekcijoms gydyti ir apsaugoti nuo jų. „Mycosan" serumas gydo ir užkerta kelią rankų ir kojų nagų grybeliui. Serumas prasiskverbia į nagą ir pagerina jo struktūrą, todėl nagas atauga sveikas. Pažeistoje vietoje „Mycosan" sukuria apsauginį barjerą ir infekcija nebegali plisti į kitus nagus. Labai svarbu gydymą pradėti vos pastebėjus pirmuosius ligos simptomus. Labai svarbu griežtai laikytis produkto naudojimo instrukcijos. „Mycosan" pėdų gelis nuo grybelių skirtas „atleto pėdai" gydyti. „Atleto pėda" yra grybelių sukelta pėdos odos infekcija, kurią reikia gydyti, kad ji neišplistų. Gaivinamasis ir vandeniui nelaidus pėdų purškiklis „Mycosan Protect" 12 val. apgaubia pėdą apsauginę plėvelę, kuri saugo pėdas nuo grėmės suėsgti grybelinę pėdų odos infekciją.

-40%

Specialiai sukurtas moterims!

VITAKUR PLUS, 30 kapsulių

Maisto papildai

VITAKUR Plus nakvių aliejaus ir vitaminų kapsulės sukurtos specialiai moterims. Jų sudėtyje yra daug svarbių komponentų:
- Nakvių aliejaus
- 10 vitaminų
- Kofermento Q10, būtino energijai gamintis organizmo ląstelėse.

VITAKUR Plus nakvių aliejaus ir vitaminų kapsulės pagal savo sudėtį tin gerai tinka kaip maisto papildas šiais atvejais:
- Klimakterinis laikotarpis
- Kai tenka didesnis krūvis darbe, namuose ar sportuojant
- Nėštumo metu ir po gimdymo
- Žindymo laikotarpiu
- Kai gryybiškai svarbų medžiagų reikia daugiau

Rekomenduojamas vartojimas – 1 kapsulė per dieną.

-35%

Nuo knarkimo

SNOREEZE purškalas nuo knarkimo į gerklę 23.5ml
SNOREEZE purškalas nuo knarkimo į nosį 10ml
SNOREEZE tirpios gomurio juostelės nuo knarkimo N14
SNOREEZE čiulpiamos pastilės nuo knarkimo N16

Medicinos priemonės

Priemonių nuo knarkimo linją, padedanti atsikratyti knarkimo iki 8h. Linją sudaro: purškalas į gerklę ir nosį, gomurio juostelė ir čiulpiamos pastilės.

10,58 €

ZOVIDUO 50 mg/10 mg/g kremas

Nereceptinis vaistinis preparatas

Indikacijos. Lūpų ir odos apliūdi. Ūpas pūslelines ankstyvųjų požymių ir simptomų (pvz., dilgčiojimo, niežėjimo ar paraudimo) gydymas suaugusiesiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimas.** Vartoti tik ant odos. Tepti ant pažeistos vietos 5 k./parą 5 dienas, vidutiniškai kas 3-4 val.; naktį daroma pertrauka. Jeigu per 5 dienas nuo gydymo pabaigos simptomai išlieka arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. **Kontraindikacijos.** Alergija sokiovinui, vaistažolėms, benzokainui ar bet kurioms pagalbinėms medžiagoms, kitoms nei pūslelinės odos infekcijoms. **Specialūs įspėjimai.** Neverkšti ginės pat vėlg ar su bet kokiais bandžiais ar pleistrais. Netepti akių, nosies ir burnos ertmės, lytinių organų. Neverkšti, jei imunine sistema nevaikia tinkamai ar susilpnejusi. Pasitarti su gydytoju, jei kartojasi sunki pūslelinė ar pasireiškė bet kokių regėjimo sutrikimų. Sudėtyje yra propilenglikolio, cetostearilo alkoholio ir natrio lauriksulfato. Teksto parengimo data 2023-MM-DD. NP-CT ZOV-23-00001

-30%

-25%

Imunitetui, kaulams ir dantims

DETRICAL 2000IU plėvele dengtos tabletės N60
DETRICAL 4000IU plėvele dengtos tabletės N60

Maisto papildai

DIDELĖ VITAMINO D DOZĖ VIENOJE KAPSULĖJE

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų funkciją ir dantų būklę.

-50%

MEGA C apelsinų skonio tab. N30
MEGA VITAMIN D 2000 IU kapsulės N60
MEGA VITAMIN D 4000 IU Forte kapsulės N30
MEGA VITAMIN D 4000 IU Forte kapsulės N90

Maisto papildai

-35%

Kepenims

HEPATRIN FORTE kapsulės N30

Maisto papildas

iki -35%

NAVI akių lašų linija

Medicinos pagalbos priemonės

NAVI® – INOVATYVŪS SPRENDIMAI TAVO AKIMS.

NAVIVISION – pavargusioms akims: užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą, esant sausų akių pojūčiui. Sudirgusioms akims: skatina natūralų akių gebėjimą kovoti su alergijų simptomais. Paraudusioms akims: padeda palengvinti paraudusių akių būklę. **Tinka naudoti neišimant visų rūšių kontaktinių lęšių.**
NAVI INFLA – antioksidacinai drėkinamieji akių lašai su natūraliais augalinais ekstraktais mažina su konjunktyvitu susijusius simptomus: ašarojimą, paraudimą ir niežėjimą. Apsaugo, nuramina akis ir atkuria normalią paviršiaus būklę.
NAVITAE PLUS PF – lubrikuojantys akių lašai su natrio hialuronatu, vitaminu A ir E, vartojamas sausų akių sindromui ir akių diskomfortui palengvinti. Be konservantų.

-20%

bio-kult

BIO-KULT MIGREA kapsulės N60
BIO-KULT EVERYDAY kapsulės N30
BIO-KULT PREGNEA kapsulės N60
BIO-KULT INFANTIS milteliai N16
BIO-KULT PRO-CYAN kapsulės N45
BIO-KULT CANDEA kapsulės N60

Maisto papildai

MOKSLINIAIS TYRIMAIS PAREMTI GYVŲJŲ BAKTERIJŲ KOMPLEKSAI. NET 14 RŪŠIŲ BAKTERIJŲ!

Unikalūs moksliniais tyrimais paremti gyvųjų bakterijų kompleksai. **Bio-Kult** ir **Bio-Kult Migrea** sudėtyje net 14 bakterijų rūšių.
Bio-Kult Pregnea sudėtyje 6 rūšių bifidobakterijos ir laktobacilos bei aktyvi folio rūgšties forma – (6S)-5-metiltetrahidrofolinė rūgštis.
Bio-Kult sudėtyje tik skrandžio rūgščių poveikiui atsparios bakterijų kultūros. Pagamina Jungtinėje Karalystėje, laikantis aukštų farmacinės kokybės standartų.
Bio-Kult Infantis: Unikalus 7 rūšių pieno rūgšties bakterijų kompleksas su fruktooligosacharidais bei vitaminu C. Tinka vartoti kūdikiams nuo gimimo!
Bio-Kult Pro-Cyan: Unikalus kompleksas su proantocianidinais iš spanguolių ekstrakto, pieno rūgšties bakterijomis ir vitaminu A.
Bio-Kult Candea: 7 rūšių pieno rūgšties bakterijų, greipfrutų bei česnakų ekstraktų derinys žarnynui ir intymiai mikroflorai.

iki -20%

DR. WOLZ, natūralu, įrodyto poveikio

BŪK SVEIKAS IR STIPRUS SU DR .Wolz UNIKALIAIS PRODUKTAIS IMUNITETUI!

Maisto papildai

Dr. Wolz kompanijos produktai – tai daugelio metų tyrimų ir eksperimentų rezultatas. Gamyboje naudojami tik ištiri ir natūralūs ingredientai, kurių efektyvumą patvirtina moksliniai tyrimai.
Prieš daugiau nei 50 metų kompanijos įkūrėjui mokslininkui biochemikui S. Wolz'ui pavyko pagaminti fermentines mielių ląstelės, kurios atlieka tiek svarbų vaidmenį somatinių ląstelių aprūpinimo reikiamomis medžiagomis, o sveikos žmogaus ląstelės – geros organizmo savijautos pagrindas.
Dr. Wolz fermentinės mielių ląstelės veikia žmogaus organizmą būtent ten, kur koncentruojama energija ir funkcinis organizmo pajėgumas – kūno ląstelėse.

iki -45%

Imunitetui

BIOFARMACIJA atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

Išsirinkite reikalingiausią ir pastiprinkite organizmą: vitaminas D3, net 1000 mg vitamino C viename pakelyje ar vitaminas C su cinku, grynas cinko citratas, spanguolės ir meškauogės ekstraktai, bei net 16 veikliųjų medžiagų kompleksas jėgoms atkurti „Back to Life". **NAUJIENA! Imuno C + Echinacea + Ginger = vitaminas C kartu su ežiuogė ir imbieru!**
GALINGAM IMUNITETUI!

iki -30%

MY FLORA kapsulės

Maisto papildai

-35%

Medicinos priemonė nuo sauso ir ūlapio (produktyvaus) kosulio

IVEX sirupas nuo kosulio, 100 ml ir 200 ml

Medicinos priemonės

Ši medicinos priemonė, dėka sudėtyje esančių natūralių ekstraktų, kurių veiksmingumas įrodytas, suformuoja prie gleivinės prilimpančią plėvelę, kuri ramina kosulį, apsaugo nuo dirginimo bei pagerina virškinimo kelyklos tako funkciją. Tai ypač aktualu žemų arba kai reikia gydyti išorinių veiksnių (šaltis, smogas, dulkės ir dūmai) sukeltus sudirginimus.
Naudinga esant sausam ir ūlapiam (produktyviam) kosului, ramina dirginimą, saugo gleivinę ir lengvina gleivių šalinimą. Pakuotėje yra vienas 100 ml butelukas ir 5 ml matavimo indelis.

iki -45%

VOCAL pastilės gerklei su islandine kerpena, vitaminu c ir cinku

Maisto papildai

VOCAL – tai įvairių rūšių ir skonių maisto papildas, kuriame yra islandinės kerpenos, vitamino C ir cinko. Islandinė kerpena padeda palaikyti kvėpavimo taką – gerkles, nyklės gleivinės bei balso stygų – funkcijas. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas atlieka tam tikrą funkcją ląstelių dalijimosi procese.

-45%

TERMOBALSAM sirupas 150 ml

Maisto papildai

Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vaistinė ramunė, mažalapė liepa padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Sudėdamosios dalys: vanduo, fruktozė, spanguolių ir juodųjų serbentų sultys, ekstraktai: tikrojo imbiero šaknų, mažalapių liepų žiedų, paprastųjų erškėčių vaisių; tirštiklis pektinai, ekstraktai: vaistinių ramunių žiedų, paprastosios avietės lapų, pipirinių mėtų lapų, juodvogio šeivamedžio vaisių; rūgštingumą reguliuojantis medžiaga citrinų rūgštis, konservantas kalio sorbatas, saldiklis stevolio glikozidai, cinko gluconatas, kvapioji medžiaga.
Medžiagų, turinčių fiziologinį poveikį, kiekis: 15 ml sirupo: ekstraktų: tikrojo imbiero šaknų (1:10) 702 mg, mažalapių liepų žiedų (1:5) 702 mg, paprastųjų erškėčių vaisių (1:5) 528 mg, vaistinių ramunių žiedų (1:10) 351 mg, paprastosios avietės lapų (1:5) 351 mg, pipirinių mėtų lapų (1:5) 264 mg, juodojo šeivamedžio vaisių (1:10) 140,4 mg; cinko 7,5 mg (75% RMV) Vartojimas. 6-12 m. amžiaus vaikams gerti po pusę arbatinio šaukštelio 3 kartus per dieną; suaugusiesiems gerti po 1 arbatinį šaukštelį 3 kartus per dieną. Vienkartinę dozę gėrikite į 1/2 ar 1 stiklinę karšto vandens ir išgerkite. Prieš vartojimą supurtykite buteliuką!

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-45%

VIRONOX Jėgoms atstatyti+ N14
VIRONOX Stiprus imunitetas+ N7
VIRONOX Smegenų rūkas N14
VIRONOX Veiksminga apsauga (lūpų ir nosies balzamas) N1

Maisto papildai

VIRONOX – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!

„Vironox" epigenetinė linija sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų. **„Stiprus imunitetas+"** – tai gretas 7 dienų kursas organizmo apsaugai bei imunitetui. Vitaminas C, cinkas bei dygliuotųjų šaltalankių vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Natūralus energijos šaltinis – **„Jėgoms atstatyti+"**. Kininių žeńšenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B6, – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei mažinti nuovargį. Naujiena protinei veiklai – **„Smegenų rūkas"**. Rausvųjų rodiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei nervų sistemos veiklą. Vartojimas: 1 pakelis per dieną. Balzamas **„Veiksminga apsauga"** su interferonu padeda suformuoti apsaugų barjerą.

iki -45%

SALVIASEPT produktų linija

Medicinos priemonės

SALVIASEPT – NUO KOSULIO IR GERKLĖS SKAUSMO!

Medicinos priemonių linija „SALVIASEPT", kurių sudėtyje yra nanosidabro ir islandinių kerpenų ekstrakto, padeda sumažinti bakterijų ir virusų sukeltą gerklės uždegimą bei perdžiovę, ramina sudirgusią gleivinę ir padeda gydyti torzilitą, gerklės bei burnos gleivinės uždegimą, skausmą po tonzilių pašalinimo. Nanosidabras apriboja mikroorganizmų plitimą dėl savo antibakterinio ir antiseptinio poveikio.

„Salviasept" spray KIDS purškalas skirtas vaikams nuo 2 m.

„Salviasept" spray purškalas skirtas suaugusiesiems ir vaikams nuo 7 metų.

„Salviasept kids" gerklei: 1 ledinukas sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto, šalavijų ekstrakto, juodaraisių aronijų uogų sulčių, varistinių ožlaročių šaknų ekstrakto, vitamino C. „Salviasept kids" užtikrina gerklės skausmo, perštėjimo ir sausumo mažinimą bei rijimo lengvinimą. Suodžiantis apsaugimo sluoksnis užtikrina gerklės apsaugą nuo keikosmogų (išorinių veiksnių (tokių, kaip sausos patalpos, sausas oras, purvas ir laršis). Ledinukai sudrėkina ir gaivina burnos ertmės bei gerklės gleivinę.

„Salviasept kids" kosului: 1 ledinukas sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto, varistinių ožlaročių šaknų ekstrakto, čiobrelių ekstrakto, džiovintų juodaraisių aronijų uogų ekstrakto, vitamino C. Sudėdamosios dalys padengia gerklės gleivinę, ją drėkina, ramina ir susilpnina kosulį. Čiobrelių ekstraktas didina virpamojo epitelio judėjimą ir taip pagreitina fiziologinį kvėpavimo takų išsivalymą. „Salviasept kids" negalima vartoti vaikams iki 3 metų. **Vartojimas:** ledinukus „Salviasept kids" galima vartoti 1-3 kartus per dieną.

„Salviasept acut", 12 dulpiamųjų gerklės pastilių.

„Salviasept acut", BE CUKRAUS, 12 dulpiamųjų gerklės pastilių.

iki -45%

Swiss'Ovit – tai aukštos kokybės maisto papildai iš Šveicarijos

NAUJIENA! SWISS'OVIT produktų linija

Maisto papildai

SwissOvit OMEGA-3 TG 600 mg žuvų taukai, 30 kapsulių – Žuvų taukuose yra vertingų Omega-3 polinesotinių riebalų rūgščių: eikozapentaeno rūgšties (EPA) ir dokozaheksaeno rūgšties (DHR), kurios padeda palaikyti normalią širdies veiklą, o tegamas poveikis pasireiškia kasdien suvartojant 250 mg. Be gluteno, be laktozės.
SwissOvit Vitaminas D3 4000IU, 30 kapsulių – Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią kaulų, dantų ir raumenų funkciją ir imuninės sistemos veiklą, normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir pasisavinimą. Be laktozės, be gluteno.
SwissOvit Vitaminas C 500mg, 30 kapsulių – Vitaminas C, žinomas kaip askorbo rūgštis, palaiko normalią imuninės sistemos veiklą; vaidina svarbų vaidmenį kolageno susidarymui normaliai kaulų, dantenų ir dantų, odos ir kraujagyslių funkcijai palaikyti; padeda sumažinti nuovargį ir išsekimą; padidina geležies pasisavinimą. Be glitimo, be laktozės, tinka veganams.
SwissOvit vitamino B kompleksas, 30 kapsulių – B grupės vitaminai vaidina lemiamą vaidmenį palaikant energijos lygį ir bendrą nervų sistemos sveikatą. Be laktozės, be gluteno, tinka veganams.

-40%

Imuninei sistemai

SAMBUCUS KIDS, sirupas, 120 ml
SAMBUCUS KIDS, guminukai, 60 vnt.
SAMBUCUS KIDS, 5 ledinukai

Maisto papildai

Juodųjų šeivamedžių, čiobrelių, šalavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

-30%

DIAS COLLAGEN LIQUID, skystasis kolagenas, 20 vartojimui paruoštų paketėlių
DIAS DETOX, 60 kapsulių
DIAS FORTE, tirpus granatų skonio kolagenas, 30 paketėlių
DIAS FORTE, tirpus greipfrutų skonio kolagenas, 30 paketėlių

Maisto papildai

„DIAS" Forte" – didelės koncentracijos 4 kolagenų kompleksas – „Collagen Quattro Complex™" – **sąnariams, kaulams, kremzlėms, dantims, dantenoms** ir **odai.** Maloniaus granatų ar greipfrutų skonio. 1 paketėlyje – daugiau kaip 10 000 mg kolageno!

„DIAS" Collagen liquid" – hidrolizuoto kolageno, hialurono rūgšties, vitaminų ir mineralų derinys su bioaktyviais prekių ženklo „Peptan™" kolageno peptidais **kaulams, kremzlėms, raumenims, jungiamajam audiniui, odai, plaukams, nagams, normaliai energijos apykaitai** ir **imuninės sistemos veikiai.** 1 paketėlyje (paros dozė) – net 3900 mg II tipo kolageno!

„DIAS" Detox" – augalinių ekstraktų ir fermentų, vitaminų bei mineralų kompleksas **kepenims, virškinimui, imunitetui.**
Be glitimo, laktozės ir pridėtinių cukrų!

iki -55%

PROSTENAL CONTROL tabletės N30
PROSTENAL CONTROL tabletės N60

Maisto papildai

-55% -50%

SELENAS 100 mcg tabletės, N30
SELENAS ACTIV tabletės, N30

Maisto papildai

Selenas 100 mcg N30. Grožiui ir imunitetui. Selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir normalią plaukų ir nagų būklę.
Selenium Aktiv N30. Naujos kartos produktas su didesne doze seleno pratertintas Bioperine® iš juodųjų pipirų. Selenas padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę, bei normalią imuninės sistemos veiklą.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

iki -35%

PILEJE produktų linija

Maisto papildai

PILeJe yra probiotinių kultūrų tyrimo pradininkė, atlikusi ir paskelbusi daugybę jų tyrimų, įskaitant jų atsparumą įvairiems fizinėms ir cheminėms sąlygoms (pavyzdžiui, jų tinamumą ir atsparumą įvairioms aplinkoms) ir jų poveikį sveikatai.
Mikrobiotinės padermės, kurias PILeJeLaboratoire atrinko (traukti) į šį maisto papildą, yra užregistruotos Prancūzijos nacionalinėje mikroorganizmų kolekcijoje (CNCM).

JŪSŲ GROŽIUI IR HIGIENAI

MANO vaistinė

-5%

Nosies užgulimui mažinti ir kasdienei priežiūrai

QUIXX BABY nosies lašai 10 ml
QUIXX EXTRA nosies purškalas 30 ml
QUIXX SOFT nosies purškalas 30 ml
QUIXX nosies purškalas 30 ml
QUIXX ACUTE nosies purškalas 100 ml
QUIXX DAILY nosies purškalas 100 ml

Medicinos pagalbos priemonės

KVĖPUOK LENGVAI!

Quixx efektyvi švelnaus veikimo priemonė užlaikomai ar alergijos sukeltai nosies ir sinusų uždegimui. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams: 1-2 purškimai į kiekvieną šnerę 2-3 kartus per dieną. Suaugusiems: 1-3 purškimai kiekvieną šnerę 2-3 kartus per dieną.
Quixx Soft su alavijo ekstraktu – tai natūrali priemonė, drėkinanti jautrias nosies sienelės ir apsaugantiš nuo peršalimo sukeltų simptomų nosyje. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams iki 5 metų: 1 purškimas į kiekvieną šnerę iki 4 kartų per dieną. Kūdikiams ir vaikams nuo 6 mėnesių bei suaugusiesiems esant reikalui, 1-3 purškimai kiekvieną šnerę keli kartus per dieną.
Quixx Extra su eukaliptų aliejumi sumažina nosies ir sinusų uždegimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmių išsivalymą, suteikia stiprų ganėnino pojūtį. Dozavimas. Vaikams nuo 6 metų amžiaus: 1-2 purškimai į kiekvieną šnerę 2-3 kartus per dieną, suaugusiems ir paauglams 1-3 purškimai kiekvieną šnerę 2-3 kartus per dieną.
Quixx Daily kruopščiai praskalauja nosį ir sumažina bakterijų, virusų, alergenų bei žiedadulkių, kenkėjų dalelių, dulkių kiekį. Priemonę gali vartoti vaikai nuo 2 metų amžiaus ir suaugusieji. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina sausa ar sudirgusi nosies ertmė.
Quixx Acute – natūrali nosies valymo priemonė ir pagalba pasirinkus slogai. Gali vartoti vaikai nuo 3 metų amžiaus ir suaugusieji. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina užsikimšusi nosis ar sausi nosies takai.
Quixx baby – mažylių nosies priežiūrai ir higienai nuo pimosios gyvenimo dienos. Dozavimas. 1-3 lašai į kiekvieną nosies šnerę nuo 2 iki 6 kartų per dieną ar dažniau, jei reikia. Naujagimiams ir kūdikiams iki 3 mėnesių rekomenduojama vartoti netiesiogiai, užlašinus ant vatos tamponėlio. Sudėtyje yra tik natūralios medžiagos.
Specialios įspėjimai. Quixx medicinos priemonių negalima vartoti jei yra jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai.
LT_Qui_30_2023_V1_printReklamaparsuota2023 m. gruodžio mėn. UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic" J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163

iki -25%

URGO

URGO produktų linija

Medicinos pagalbos priemonės

SU URGO PRIŽIŪRIMOS ŽAIZDOS GYJA GREIČIAU!

Urgo pleistrų ekspertas jau 60 metų! Urgo orui pralaidūs pleistrai įvairių rūšių: nepastebimi, prie judesių prisitaikantys, neperšlampami ir ypač tvirti.
Urgo Filmopel geliai, tai unikalios inovacinės technologijos skysti pleistrai, kurie patekę ant odos pavirsta į permatomą gyjimą skatinančią plėvelę. Kiekvienas šios linijos produktas syra unikalios sudėties ir skirtas atskirai problemai spręsti: odos žnkimams, pažeistiems nagams, pūslėlėms ir burnos žaizdoms.

iki -40%

Odai, plaukams, nagams

BIOCELL veido kaukės ir maisto papildai

Maisto papildai, kosmetikos priemonės

Tobula esi Tu. BIOCELL tai išsaugo.

BIOCELL veido kaukės – tai pirmosios veido kaukės Lietuvoje, kurios išsiskiria ne tik efektyviais komponentais, greitu ir intensyviu poveikiu, bet ir išliekančiu rezultatu. Pasirinkite ko jūsų odai reikia šiandien – glaus drėkinimo, regeneravimo, stangrinimo, raukšlių lyginimo, valymo ar švytėjimo?
BIOCELL gnežio eliksyrai „shots" – tai gilian odos drėkinimai ir maitinimai sukurtos formulės, kurios pastebimai praturtina odos, plaukų ir nagų grožį. **BIOCELL Beauty Shots** sudėtyje – optimali doze geriamo hidrolizuoto kolageno, hialurono rūgšties, sudėrinta palėsė svarbių vitaminų, mineralų bei augalinių ekstraktų. **BIOCELL Hair Shots** sudėtyje – biologiškai aktyvus geriamas hidrolizuotas keratinas, 500 (superoksido dismutazė), vitaminai ir mineralai.
BIOCELL Platinum – ypač intensyvaus drėkinimo reikalaujančiai odai – ypatingas mažos molekulinės masės hialurono rūgšties, ceramidų aliejaus ir biotino kompleksas.
BIOCELL Hair – ypač efektyvios pagalbos reikalaujantiems plaukams – nepakeičiamų aminorūgščių, vitaminų, mikroelementų kompleksas. Biotinas, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę.

iki -40%

LACALUT produktų linija

Burnos higiena

„LACALUT" – ODONTOLOGAS TAVO NAMUOSE!

Dantų priežiūros priemonės „Lacalut" – tai 99 metų patirtis, sukauptos žinios ir nuolatinai tyrimai, siekiant sukurti išskirtinio efektyvumo ir aukščiausios kokybės dantų priežiūros priemones. Unikali kompleksinė „Lacalut" apsauginė sudėtis užtikrina optimalią dantų ir dantenų apsaugą.

iki -55%

MEDRULL produktų linija

Medicinos pagalbos priemonės

IŠSIRINKITE SAU TINKAMIAUSIĄ PLEISTRĄ IŠ DIDELĖS MEDRULL ŠEIMOS!

Medrull pleistrų asortimentas yra sukurtas specialiai pačiai plačiausiai auditorijai. Rūšių įvairovė leidžia klientui išsirinkti sau tinkamą pleistrą tiek pagal dydį ir rūšį, tiek pagal sudėtį.

iki -40%

Odos ir plaukų priežiūrai AUSTRALIAN BODYCARE

TEA TREE OIL

Kosmetikos priemonės

„TEA TREE OIL" – SUKURTAS GAMTOS!

„Australian Bodycare" produktų pagrindą sudaro gynias Australijos arbatmedžių (Melaleuca alternifolia) aliejus „Tea Tree Oil". Arbatmedžių aliejus išsiskiria plačia atkuriamųjų ypatybių gama, padeda išlaikyti higienę odos švarą ir natūralią pH pusiausvyrą. Arbatmedžių aliejaus valomosios ypatybės padeda odai natūraliai valytis ir atsinaujinti, todėl puikiai tinka veido ir galvos odos priežiūrai, plaukų grožiui puoselėti. „Australian Bodycare" veido prausiklis yra puiki priemonė spurgučiai, netbai odai. Rekomenduojama naudoti kartu su toniku bei veido kremu. „Australian Bodycare" pieštukas tinka spurgoms, vabzdžių įgėlimams ir smulkiems nubrozdinimams. „Australian Bodycare" šampūnas saugo nuo pleiskanų susidarymo, plaukų nebalavimosi. „Australian Bodycare" kūno prausiklis veiksmingai palaima nepageidaujamus nelvarumus nuo odos jos nesausindamas, o losjonas puikiai drėkina bei ramina odą. Arbatmedžių aliejus – puikus pagalbininkas burnyje valant paviršius, naikinant nemalonius kvapus. Arbatmedžių aliejų rekomenduojama gerinti namuose, jei norite atgaivinti patalpų orą. „Australian Bodycare" kūno priežiūros produktus su grynu arbatmedžių aliejumi naudokite kiekvieną dieną, kad išlaikytumėte odą švarią ir nepriekaištingą.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

iki -25%

Pleistrai

LEUKOPLAST®
LEUKOPLAST® SKIN SENSITIVE

Medicinos pagalbos priemonės

ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA PATIKIMOSE RANKOSE

LEUKOPLAST® – aukštos kokybės pirmosios pagalbos pleistrai, skirti nedidelėms žaizdoms, tokioms kaip įpjovimai, įbrėžimai, nubrozdinimai ar įmušimai. Iš įvairių tipų pleistrų: sterilių, atsparių vandeniui ar apsaugančių nuo bakterijų patekimo į žaizdą, iten tvirtai prilimpančių ar švelnių odai – išsirinkite tinkamiausius savo pirmosios pagalbos vaistinėlei.
LEUKOPLAST® SKIN SENSITIVE – švelnai užklijuojami pleistrai skirti jautriai ar pažeistai odai. Tinka ten švelnai kūdikių odelei ir lengvai pažeidžiamai senyvo amžiaus žmonių odai. Apsaugo nuo įpjovimų, užtikrina netraumuojantį nuėmimą.

iki -35%

Brandžiai odai

EUCERIN HYALURON-FILLER + ELASTICITY

Kosmetika

STANGRESNEI, GAIVESNEI IR LABIAU ŠVYTINČIAI ODAI

Veido priežiūros priemonės, skirtos brandžiai odai. Unikali **Eucerin® Hyaluron-Filler + Elasticity** formulė pasižymi keletu privalumų. Kolageno – elastino kompleksas, galingas arginino ir kreatino derinys, skatina kolageno gamybą ir pagerina odos elastingumą. Unikali veikliųjų medžiaga Thiamidol sumažina senatvinių demių matomumą. Inovatyvus dėdės ir mažos molekulinės masės hialurono rūgščių derinys pastebimai užpildo glias raukšles.
Lygesnei, labiau švytinčiai ir pastebimai jaunatviškesnei odai.

-20%

ALOE VERA, dantų pasta ALOE DENT, 100 ml
ALOE VERA, dantų pasta ALOE DENT SENSITIVE, 100 ml
ALOE VERA, dantų pasta ALOE DENT WHITENING, 100 ml
ALOE VERA, burnos skalavimo skystis ALOE DENT, 250 ml
ALOE VERA, vaikiška dantų pasta ALOE DENT CHILDRENS, 50 ml

Burnos higienos priemonės, kosmetika, maisto papildai

„AloeDent"– vienos natūraliausių burnos higienos priemonių, pagamintos ne vandens, o daugybe naudingų savybių pasižyminčio aloinio pagrindu. „AloeDent" – arčiau gamtos!
Natūralios Aloe Pura tikrųjų aloinių sultys – 99,6% grynumas imunitetui, energijai, virškinimo sistemai. Geliu pagamintas iš 100 % grynumo organinio aloinio vidinio gelio, kurio sudėtyje yra didžiausias natūralių veikliųjų medžiagų kiekis.

iki -40%

PLANTUR šampūnų linija

Kosmetikos priemonės moterims nuo plaukų slinkimo

„PLANTUR 39" šampūnuose esantis fitokofeino kompleksas saugo plauko šaknis nuo hormonų sukelto nuovargio. Stiprėja plaukų šaknys, mažėja plaukų slinkimas.

iki -35%

BELLA produktų linija

Higienos priemonės, kosmetika

UŽTIKRINTA APSAUGA!

BELLA higienos produktai – patikima ir švelni apsauga! Higieniniai paketai – plonI, daug sugeria, su kvapo kontrolės sistema, laidūs orui. Išsirink ir tinkamiausius jklotus kasdieniai. Ir nepamirsk valos gaminių „BELLA Cotton" – iš 100% medvilnės!

iki -45%

MATOPAT pleistrai ir elastiniai bintai

Medicinos priemonės

Matopat pleistrai ir elastiniai bintai – pravers susižeidus ar pasitempus!

JŪSŲ GROŽIUI IR HIGIENAI

MANO vaistinė

iki -25%

ABENA

ABENA higienos ir slaugos prekės

AKTYVIOMS DIENOMS IR PATOGIOMS NAKTIMS

Medicinos priemonės, kosmetika

ABENA nelaikantiems šlapimo skirtos priemonės labai gerai prigiunda prie kūno, gerai sugeria ir tolygiai paskirsto didelį šlapimo kiekį, sugeria kvapus, visuose produktuose yra apsauga nuo pratekėjimo.
ABENA odos priežiūros priemonės yra be kvapiklių, be dažiklių, pH atitinka sveikos odos poreikį, todėl nesukelia alerginių reakcijų, galima naudoti ir tiems, kurių oda itin jautri.

iki -45%

OCLEAN produktų linija

Kosmetika, medicinos prietaisai ir pagalbos priemonės

-35%

BIOACTIVE kosmetikos priemonės

Kosmetika

-55%

BIOXCIN kosmetika mažinanti plaukų slinkimą

Kosmetika

iki -30%

NATURA HOUSE aliejus nuo strijų 200ml
NATURA HOUSE dantų pasta vaikams Bubble Gum 50ml
NATURA HOUSE dantų pasta vaikams raudonųjų vaisių skonio Red Fruits su fluoridu (0-6 m.) 50 ml
NATURA HOUSE šampūnas besilaukiančioms ir maitinančioms mamoms stiprinamasis 200 ml

Kosmetika

Mamy Cucciolo ir Baby Cucciolo kosmetikoje tik efektyvios ir saugios, kokybiškos ir veiksmingos natūralios žaliavos, parinktos atsižvelgiant į realius odos poreikius. Ant kiekvieno produkto pakuotės nurodytas realus ir visada aukštas (net iki 99,8%) natūralios kilmės medžiagų lygis procentais („Natural origin" simbolis).
Paviršiniai emulsikliai vien augalinės kilmės.
• Siekiant produktų veiksmingumo, didžiausias dėmesys skiriamas biologiniams komponentų suderinamumui.
• Produktai dermatologiškai patikrinti Pavijos (Italija) universiteto laboratorijoje, patvirtintas jų nealergizuojantis poveikis.
• Produktai skirti naudoti kasdien.

iki -35%

SESDERMA produktų linija

Kosmetika

Daugiau nei prieš 30 metų įkurta dermatologinės kosmetikos kompanija „SESDERMA" išsiskiria pažangomis nanotechnologijomis, kurios padeda pasiekti gilesnius odos sluoksnius. Šis inovatyvus sprendimas padeda užtikrinti maksimalų efektyvumą ir pastebimus rezultatus.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos internete svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

NEW NORDIC

Atraskite itin gerai įsisavinamą MAGNĮ savo organizmui!

New Nordic MAGIC MAGNESIUM™
Jaučiatės pavargę, stinga energijos kasdieniams iššūkiams, norite palaikyti nervų sistemos veiklą ar papildyti organizmą magniu? **New Nordic MAGIC MAGNESIUM™** sukurtas būtent jūsų individualiems poreikiams!

-55%

Magic Magnesium™ Citrat
Nuovargiui mažinti ir energijai palaikyti

Magic Magnesium™ Glycinat
Nervų sistemos veiklai palaikyti

Magic Magnesium™ Malat
Raumenims ir kaulams

MAGIC MAGNESIUM™ – aukštos kokybės maisto papildai su lengvai įsisavinamu magniu, praturtinti B grupės vitaminais, vitaminu D ir augaliniais ekstraktais, padedantys palaikyti įvairias organizmo funkcijas. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, palaikyti normalią raumenų funkciją, nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

MAISTO PAPILDAI | REKLAMA