

TOP BIRŽELIO PASIŪLYMAI



-50%



AMBIO

MAGNIO CITRATAS, milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **10⁹² 5⁹⁶ €**
KALIS 300 mg IR MAGNIS 350 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **12⁹⁶ 6⁴⁹ €**
MAISTO PAPILDAI

IKI -70%



VITADAY

VITAMINAI A IR E, 30 kapsulių **4⁹⁸ 1⁹¹ € -60 %**
VITAMINŲ B KOMPLEKSAS, 60 tablečių **6⁴⁸ 1⁹⁴ € -70 %**
MAISTO PAPILDAI

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!



ACONITUM

MAISTO PAPILDAI

ACONITUM – viena iš maisto papildų lyderių Lietuvoje, kuriančių ir gaminančių augalinius vaistus, biomedicinius preparatus ir maisto papildus nuo 1999 m. Vartotojų įvertinimą ir pasitikėjimą pelnė išlaikydama atsakingą požiūrį į gaminius, produktus; nuolat tobulina preparatų sudėtis ir diegia naujausias technologijas gamyboje. Aukščiausią preparatų kokybę užtikrina Geros gamybos praktikos (GMP) nuostatų laikymasis bei nuolatine ne tik gamybos proceso, bet ir žaliavų kokybės kontrole.

AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUS SUKŪRĖ JUMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -50%



MAGVIT

MAISTO PAPILDAI

– raumenims, nervų sistemai, energijai!

„Magvit Platinum“ – greitas ir ilgalaikis poveikis. Tabletė magnį į organizmą įsiskina per tris skirtingas fazes ir leidžia magniui greitai ir ilgai veikti. Tik 1 tabletė per parą. „Magvit Plus“ – specialus ilgalaikio veikimo „Deep“ formulė leidžia vitaminams ir magniui išsiskirti daugelį valandų. Tik 1 tabletė per parą. „Magvit 8 Complex“ – tiršta burnoje ir turi greitą poveikį. Tinka vartoti fizinio krūvio metu. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 m. gerti po 1 paketėlį per dieną. „Magvit 60“ – skystos formos, greitas ir efektyvus poveikis. Geriau įsisavinamas organinis magnio citratas. Naudojimas: suaugusiems ir paaugliams nuo 14 m. gerti 1 buteliuką per dieną. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją. Magnis, vitaminai B2, B6, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

„MAGVIT“ – JŪSŲ MAGNIO ŠALTINIS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO 2⁹⁹ €

HJERTEMAGNYL

150 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **2⁹⁹ €**

150 mg, 90 plėvele dengtų tablečių **4⁹⁹ €**

75 mg, 100 plėvele dengtų tablečių **3⁹⁹ €**



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI!

Veiklioji medžiaga: 1 tablete yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant širdine ligos, po miokardo infarkto, širdinio smegenų insulto ar praeinančio smegenų šėmijos (kraujotakos sutrikimo) priepuolio. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krevulių, susidariusių iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo rizikai mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75 – 150 mg vieną kartą per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo / virškinamajį traktat; yra polinkis / kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas. Slėpime padidėjo oksalato, jeigu yra trys paskutiniai mėnuo mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchu astma, širdyje, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gyvuliui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfordehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, ilkus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo ir virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07, LJ-HJERT-220001

-40%



VIZIK

VIZIK ALLERGY, 10 ml **16⁹⁷ 10¹⁸ €**

VIZIK lašai puvargusioms ir sausoms akims, 10 ml **12⁹⁷ 7⁷⁸ €**

VIZIK lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml **12⁹⁹ 7⁶⁷ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

Be konservantų

ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!



-50 % PIGIAU

-50%



ARTHROSTOP PROENZI

MAISTO PAPILDAI

„Arthrostop proenzi“ maisto papildai sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu, bosvelijos ekstraktu. Jaukėk laisvai!


NAUJENAI! „Arthrostop proenzi“ collagen shots – unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11 000mg hidrolizuoto kolageno viename buteliuke!

Z305_S8_Proenzi_V01_LIT

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Prostatai ir potencijai

-50%



PROSTENAL® CONTROL

PROSTENAL® CONTROL, 30 tablečių **11⁹⁹ 575 €**
PROSTENAL® CONTROL, 60 tablečių **19⁹⁹ 10⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAI

Gulščiųjų serenojų (Serenoa repens) vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją bei normalų šlapimo nutekėjimą. Didžiųjų dilgėlių (Urtica dioica) šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią šlapimo takų ir inkstų funkciją. Gulščiųjų ragelių (Tribulus terrestris) vaisių ekstraktas padeda skatinti lytinį potraukį ir pajėgumą. Cinkas padeda palaikyti normalią testosterono koncentraciją kraujyje, vaisingumą ir reprodukciją. Vartojimas: 1 tabletė per dieną.

Imunitetui

-50%



ISKIAL

ISKIAL MAX, 120 kapsulių **24⁹⁹ 12⁵⁰ €**

ISKIAL JUNIOR, 30 kramtomųjų kapsulių **22⁹⁹ 11⁵⁰ €**

MAISTO PAPILDAI

„Iskial“ – ryklių kepenų aliejus iš Islandijos, papildytas didele doze vitamino D3, kuris yra svarbus normaliai imuninei sistemai veikti. Ryklių kepenų aliejus – tai vienas gausiausių natūralių, vertingų, biologiškai aktyvių medžiagų – iktilopierolio ir skvaleno – šaltinių. „Iskial Junior“ sudėtyje kartu yra ir žuvų taukų, kuriuose gausu DHR rūgščių, svarbių normaliai smegenų funkcijai ir padedančių išsaugoti normalų regėjimą. Tikis vaikams nuo 3 metų. „Iskial Max“ tiks suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų.

„ISKIAL“ – RŪPINASI VISOS ŠEIMOS IMUNITETUI!



Skausmui malšinti

3⁹⁹
€2⁷⁵ €

Antialerginis vaistas

4⁹⁹ €

4⁹⁹
€

4⁹⁹
€

N

**IBUMETIN**

200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **1⁹⁹ €**
400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių **3⁹⁹ €**

NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

mechizak, mečizak | Istežuje (vse) 200 ali 300 mg buforene (induktorje transpulzacije) na vidikotno strupeno zdravilo, koko kaj poval, ali kaj drugega, mečizak. **Varstvo blaga in zdravca:** saskaudacine in vrenostni test 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240, 252, 264, 276, 288, 300, 312, 324, 336, 348, 360, 372, 384, 396, 408, 420, 432, 444, 456, 468, 480, 492, 504, 516, 528, 540, 552, 564, 576, 588, 600, 612, 624, 636, 648, 660, 672, 684, 696, 708, 720, 732, 744, 756, 768, 780, 792, 804, 816, 828, 840, 852, 864, 876, 888, 900, 912, 924, 936, 948, 960, 972, 984, 996, 1008, 1020, 1032, 1044, 1056, 1068, 1080, 1092, 1104, 1116, 1128, 1140, 1152, 1164, 1176, 1188, 1200, 1212, 1224, 1236, 1248, 1260, 1272, 1284, 1296, 1308, 1320, 1332, 1344, 1356, 1368, 1380, 1392, 1404, 1416, 1428, 1440, 1452, 1464, 1476, 1488, 1500, 1512, 1524, 1536, 1548, 1560, 1572, 1584, 1596, 1608, 1620, 1632, 1644, 1656, 1668, 1680, 1692, 1704, 1716, 1728, 1740, 1752, 1764, 1776, 1788, 1800, 1812, 1824, 1836, 1848, 1860, 1872, 1884, 1896, 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, 2052, 2064, 2076, 2088, 2100, 2112, 2124, 2136, 2148, 2160, 2172, 2184, 2196, 2208, 2220, 2232, 2244, 2256, 2268, 2280, 2292, 2304, 2316, 2328, 2340, 2352, 2364, 2376, 2388, 2400, 2412, 2424, 2436, 2448, 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556, 2568, 2580, 2592, 2604, 2616, 2628, 2640, 2652, 2664, 2676, 2688, 2700, 2712, 2724, 2736, 2748, 2760, 2772, 2784, 2796, 2808, 2820, 2832, 2844, 2856, 2868, 2880, 2892, 2904, 2916, 2928, 2940, 2952, 2964, 2976, 2988, 3000, 3012, 3024, 3036, 3048, 3060, 3072, 3084, 3096, 3108, 3120, 3132, 3144, 3156, 3168, 3180, 3192, 3204, 3216, 3228, 3240, 3252, 3264, 3276, 3288, 3300, 3312, 3324, 3336, 3348, 3360, 3372, 3384, 3396, 3408, 3420, 3432, 3444, 3456, 3468, 3480, 3492, 3504, 3516, 3528, 3540, 3552, 3564, 3576, 3588, 3600, 3612, 3624, 3636, 3648, 3660, 3672, 3684, 3696, 3708, 3720, 3732, 3744, 3756, 3768, 3780, 3792, 3804, 3816, 3828, 3840, 3852, 3864, 3876, 3888, 3900, 3912, 3924, 3936, 3948, 3960, 3972, 3984, 3996, 4008, 4020, 4032, 4044, 4056, 4068, 4080, 4092, 4104, 4116, 4128, 4140, 4152, 4164, 4176, 4188, 4200, 4212, 4224, 4236, 4248, 4260, 4272, 4284, 4296, 4308, 4320, 4332, 4344, 4356, 4368, 4380, 4392, 4404, 4416, 4428, 4440, 4452, 4464, 4476, 4488, 4500, 4512, 4524, 4536, 4548, 4560, 4572, 4584, 4596, 4608, 4620, 4632, 4644, 4656, 4668, 4680, 4692, 4704, 4716, 4728, 4740, 4752, 4764, 4776, 4788, 4800, 4812, 4824, 4836, 4848, 4860, 4872, 4884, 4896, 4908, 4920, 4932, 4944, 4956, 4968, 4980, 4992, 5004, 5016, 5028, 5040, 5052, 5064, 5076, 5088, 5100, 5112, 5124, 5136, 5148, 5160, 5172, 5184, 5196, 5208, 5220, 5232, 5244, 5256, 5268, 5280, 5292, 5304, 5316, 5328, 5340, 5352, 5364, 5376, 5388, 5400, 5412, 5424, 5436, 5448, 5460, 5472, 5484, 5496, 5508, 5520, 5532, 5544, 5556, 5568, 5580, 5592, 5604, 5616, 5628, 5640, 5652, 5664, 5676, 5688, 5700, 5712, 5724, 5736, 5748, 5760, 5772, 5784, 5796, 5808, 5820, 5832, 5844, 5856, 5868, 5880, 5892, 5904, 5916, 5928, 5940, 5952, 5964, 5976, 5988, 6000, 6012, 6024, 6036, 6048, 6060, 6072, 6084, 6096, 6108, 6120, 6132, 6144, 6156, 6168, 6180, 6192, 6204, 6216, 6228, 6240, 6252, 6264, 6276, 6288, 6300, 6312, 6324, 6336, 6348, 6360, 6372, 6384, 6396, 6408, 6420, 6432, 6444, 6456, 6468, 6480, 6492, 6504, 6516, 6528, 6540, 6552, 6564, 6576, 6588, 6600, 6612, 6624, 6636, 6648, 6660, 6672, 6684, 6696, 6708, 6720, 6732, 6744, 6756, 6768, 6780, 6792, 6804, 6816, 6828, 6840, 6852, 6864, 6876, 6888, 6900, 6912, 6924, 6936, 6948, 6960, 6972, 6984, 6996, 7008, 7020, 7032, 7044, 7056, 7068, 7080, 7092, 7104, 7116, 7128, 7140, 7152, 7164, 7176, 7188, 7200, 7212, 7224, 7236, 7248, 7260, 7272, 7284, 7296, 7308, 7320, 7332, 7344, 7356, 7368, 7380, 7392, 7404, 7416, 7428, 7440, 7452, 7464, 7476, 7488, 7500, 7512, 7524, 7536, 7548, 7560, 7572, 7584, 7596, 7608, 7620, 7632, 7644, 7656, 7668, 7680, 7692, 7704, 7716, 7728, 7740, 7752, 7764, 7776, 7788, 7800, 7812, 7824, 7836, 7848, 7860, 7872, 7884, 7896, 7908, 7920, 7932, 7944, 7956, 7968, 7980, 7992, 8004, 8016, 8028, 8040, 8052, 8064, 8076, 8088, 8100, 8112, 8124, 8136, 8148, 8160, 8172, 81

3⁷⁵ €

**TAVEGYL** 1 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

[illegible]3⁹⁹ €**FREST® 1 MG/G GELIS.** 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS.

[illegible]

NUO **6**⁹⁹ €



MAGNE B 470 mg/5 mg, 60 dengtų tablečių 7⁹⁹ €

MAGNE B₆ geriamasis tirpalas, 10 ampulių **6⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

[illegible]

NUO **1**⁹⁹ €



NUROFEN 200 mg, 12 tablečių **1⁹⁹ €**

NUROFEN FORTE 400 mg, 12 tablečių 279 €

NUROFEN FORTE EXPRESS 400 mg, 12 tablečių **2⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

[illegible]

■ NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI

19⁹⁹
€



ONYTEC®, 80 mg/g, vaistinis nagu lakas, 3.3 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vēlreiz medīdaga: 1 vācīstīnū naku lako 80 mg opīdīstīnū. Tēpānīs indīdāgī, "ēdīstīnū" gīdīstīnū lēnīstās vīdīstīnū sūmīnū gībīstīnū sūstāstīnū sūstāstīnū naku gīstīnū, nēpānīstīnū opīdīstīnū mātīstīnū, 1 v. mēnīstīnū (baltīnū naku pūstīnū). Vārtīstīnū baltīnū dīstīnū: rādīstīnū autīstīnū, tēpīstīnū tīk lako opīdīstīnū. Rēkōmēdāgīstīnū 1 kārta pēnā pārtē pāstīstīnū naku, apīstīnū esānīstīnū oltī pārtē. Nēpārtīstīnū māstīstīnū 6 vārtīstīnū. Naku lako "ēdīstīnū" nēstīstīnū pāstīstīnū pīstīstīnū pīstīstīnū pīstīstīnū. Gīdīstīnū tēpī, tīk pōlēmīstīnū opīdīstīnū ātīstīnū sūstīstīnū. Kontrāndīkājīstīnū: ēdīstīnū vārtīstīnū gīpōstīstīnū ārtī bērtīnū pāstīstīnū sū vārtīstīnū pīstīstīnū ātīstīnū nēstīstīnū 18 mēnīstīnū pārtīstīnū. Spēcīstīnū ēdīstīnū: vīrtīstīnū pērtīstīnū pīstīstīnū ātīstīnū ātīstīnū gīstīnū. "ēdīstīnū" naku gīstīnū tīk bīstīstīnū. Gīdīstīnū naku nēpōstīstīnū nēpāstīstīnū kīstīnū naku kōstīstīnū pīstīstīnū. Sī pērtīstīnū vārtīstīnū ēdīstīnū, sāgīstīnū naku kārstīnū ātīstīnū līstīstīnū. Rēklāmīstīnū tēksto pārtīstīnū dātā 2025-01-16.

NEGATĪVS LAIKS NĒĒFĒKTYVĪVU GĒDYMŪ, RĪNKIS VĒSTĀ, -NĒTĒCĒ-

NUO 5⁹⁹ €**NO-SPA**NO-SPA 40 mg, 24 tablečių 5⁹⁹ €NO-SPA 40 mg, 24 plėvele dengtos tablečių 6⁴⁹ €

(Drotaverino hidrochloridas)

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje ir plėvele dengtoje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. **Indikacijos:** lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tušties latakų ligomis (tušties pilies ir (arba) latakų akmenimis, tušties pilies ir (arba) šalia jos esančių audinių, tušties latakų ar didžiojo dvilypakopės žarnos spėseio uždegimais), šalinimui, inkstų ir (arba) šlapimtakio akmenimis, inkstų geldelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukeltų šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmų šalinimui, mėšlungio nuro šlapimo splopinimui. **Kaip pagalbiniis gydymas** skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvilypakopės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, skrandžio ir priedavio spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti po 1-2 tabletes 1-3 kartus per parą, įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3-6 tabletes. **Kontraindikacijos:** alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaikams ir paaugliams iki 18 metų vartoti NO-SPA nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistas reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydymoje jums yra sakes, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levedopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprija drebulys ir raumenų stingulys. **Teksto parengimo data:** 2022 m. sausio mėn. 2201. SG. NO-SPA. V02. IT.

PILVO SKAUSMAS? NUMALŠINK JĮ GREITAI.**SKAUSMUI MALŠINTI**NUO 2⁹⁹ €**MIALDEX 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. „Mialdex“ yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). „Mialdex“ veiklioji medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). „Mialdex“ vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmui, skausmingų mėnesinių, dantų skausmui malšinti. **Vartojimas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tablečių (12,5 mg) kas 4-6 valandas arba 1 tablete (25 mg) kas 8 valandas, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamolui arba bet kuriai pagalbinei „Mialdex“ medžiagai. **Įspėjimai:** jeigu sergate arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sisteminė raudonoja vilkligė ar mišriomis jungiamojo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. **Galimas šalutinis poveikis:** šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiskia ne visiems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data: 2022.11.17

SKATINA ALKOHOLIO PASIŠALINIMĄNUO 7⁹⁹ €**METADOXIL, 500 mg, 10 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje tableteje yra 500 mg metadoksino. **Terapinės indikacijos:** pagidomas vaistas lėtinio apsinuodijimo etilo alkoholiu sukeltiems simptomams lengvinti ir alkoholio sukeliai kepenų ligai gydyti. **Vaistas METADOXIL mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti su šlapimu. Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Rekomenduojama paros dozė yra dvi 500 mg tabletes. Jeigu po 7 METADOXIL vartojimo dienų būklė nepajęsio, gydymą galima, jei reikia, tęsti 2-3 mėnesius. Pasitarus su gydytoju, jį galima tęsti iki 6 mėnesių. **Specialūs įspėjimai:** vartokite atsargiai ir pasakykite savo gydytoju, jeigu sergate Parkinsono liga ir jį gydoma levedopa, kadangi metadoksinas gali silpninti šio vaisto poveikį. **Kontraindikacijos:** alergija metadoksiniui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei maitinate krūtimi. Reklamos teksto parengimo data: 2024-11-11.

NEPRARASK DIENOS!**KOJŲ VENOMS**NUO 15⁹⁹ €**PATOLOGI DOZĖ. TIK VIENA TABLETĖ PER PARĄ****VELIOS 1000 mg plėvele dengtos tabletes, 30 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Velijos medžiaga, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tableteje yra 1000 mg mikronizuoto diosmio. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymas, esant: apatinę galūnių venų varikozai, venų opoms, telangiektazijoms ir retikuliniams varikozams ar venoms, sunkiamui nuovargiui, diskomfortui ar neramumų kojų pojūčiui, kojų skausmui ar degimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, trūkšiam kojų mėšlungiui, apatinę galūnių patinimui, mėšlungiui, paraudėjimui (odos dilguliui), bėdumui ar niežėjimui, odos eritemai ar cianozai. Suaugusiųjų padidėjusio hemorojus simptomų gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venų nepakankamumo simptomams gydymas: 1 tablete per parą valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Ūminio hemorojus simptomams gydymas: pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 kitas dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** padidėjęs hemorojus simptomams, reikia įsiminti, kad „Velios“ veiklia lik simptoms ir net būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepasieja, reikia užkelti lėtesnės žarnos tyrimą ir įsiminti trūkumą gydymą. „Velios“ nėra veiksmingas gydant su staziniu širdies nepakankamumu susijusią edemą. „Velios“ plėvele dengtų tablečių turi nevertinti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrikusi kojų veninė kraujotaka, „Velios“ gydymai poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kėdės sėdimo padėjimas, specialūs kojinių nešėjimas. Kai apatinės kojų dalys patinamos dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepadeda. Jeigu gydymoje jums yra sakes, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Velios“ sudėtyje yra salicilato geltonosios druskos (E170), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-11-18.

PAUJSK KOJŲ LENGVUJAMĄ.**KAULAMS STIPRINTI**NUO 3⁹⁹ €**CALCIGRAN**CALCIGRAN, 500 mg/200 TV, 30 kramtomųjų tablečių 3⁹⁹ €CALCIGRAN, 500 mg/200 TV, 100 kramtomųjų tablečių 9⁹⁹ €CALCIGRAN FORTE, 500 mg/400 TV, 60 kramtomųjų tablečių 9⁹⁹ €CALCIGRAN FORTE LEMON, 500 mg/800 TV, 60 kramtomųjų tablečių 11⁹⁹ €**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Sudėtis: 1 tableteje yra 500 mg kalcio (kalcio karbonato pavidalu) ir 200, 400 arba 800 TV vitamino D3 (cholekaliferolio). **Indikacijos:** vitamino D ir kalcio stokos profilaktika ir osteoporozės gydymas pacientams, kuriems yra vitamino D ir kalcio stokos pasireišimas. Pagalbinis specifinis preparatas nuo osteoporozės gydymo pacientams, kuriems yra vitamino D ir kalcio stokos pasireišimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Calcigran“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 1-3 kartus per parą, vaikams – po 1 tablete 1-2 kartus per parą. „Calcigran Forte“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 2 kartus per parą, vaikams ir paaugliams netinka. „Calcigran Forte Lemon“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 1 kartą per parą, vaikams ir paaugliams netinka. Tabletes sukrantyti arba sutulpi. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Ligos ar būklės, sukeliančios hiperkalcemiją, hiperkalciuriją, inkstų akmenis, vitamino D hiperintoksikaciją. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gydant ligai, reikia sekti kalcio kiekį kraujo serumo ir stebėti inkstų funkciją; būtina atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra hiperkalcemija arba inkstų funkcijos sutrikimo požymiai; sarkoidozę sergantiems ligoniams skirti atsargiai, jų kraujyje ir šlapime būtina sekti kalcio kiekį; osteoporozę sergantiems imobilizuotiems ligoniams reikia skirti apsaugą, negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktūzės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-CALC-2200001

NIEŽULIUI MALŠINTINUO 3⁹⁹ €**GRIVIX 1 mg/g gels, 30 g****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Sudėtis: kiekviename gramme gėlo yra 1 mg dimetindeno maleato. **Pagalbinės medžiagos:** benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. **Terapinės indikacijos:** dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo sauleje arba paviršutinio odos nudegimo (pirmo laipsnio) sukelti niežėjimo trumpalaikis malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** vaikams, suaugusiems ir senyviems pacientams: ant pažeistos ir niežtinčios odos GRIVIX reikia tepti plonu sluoksniu 2-4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelių odos plotų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei GRIVIX gydymas didelių odos plotų, reikia vengti ilgalaikio šio paviršius saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) didelio odos plotų, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, gelio tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakcijų, ir propilenglikolį, kuris gali sudirginti odą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2018-04.

NURAMINK SUDIRGINĄ IR NIEŽTINCĮ ODA!

NUO **6⁹⁹** €



TROXEVASIN

2 %, 40 g gelis **6⁹⁹ €**
2 %, 100 g gelis **9⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

[illegible]

KAD KOJOS BŪTŲ LENGVOS! MĖGAUKITĖS TYRINĖDAMI PASAULĮ BE LĖTINIO VENŲ NEPAKANKAMUMO SUKELTŲ SIMPTOMŲ!

8⁹⁹ €

LARYXIN MENTHOL, 2 mg/0,5 mg/ml, burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 30 ml

[illegible]

METANTIESIEMS RŪKYTI

19⁹⁹ €**NIQUITIN**

NIQUITIN, 14 mg/24 val., 7 transderminiai pleistrai
NIQUITIN, 21 mg/24 val., 7 transderminiai pleistrai

NIQUITIN, 21 mg/24 val., 7 transderminiai pleistrai
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

[illegible]

MESK RŪKYTI SU „NIQUITIN“!

NUO **5**⁴⁹ €



SOLPADEINE

SOLPADEINE, 12 tirpinamųjų tablečių **7⁴⁹ €**

SOLPADEINE, 12 tablečių **5⁴⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARAT

[illegible]

■ NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

NUO **2** €



ELFIMEST

ELFIMEST, 20 mg, 7 skrandyje neirios tabletės **2⁹⁹ €**

ELFIMEST, 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių **4⁹⁹ €**

Esomeprazole

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Elmet 200 g skrandyje neturėtų būti. Kiekvienoje skrandyje neturėtų būti tablečių 200 g skrandyje (atitinkame 250 mg) eozinopazo magžio druskos tablečių. **Įspėjimas** išduodamas. Elmetist atstus suaugusių žmonių gydymui eozinopazo refliksinio spazmo (nuo rimetis 3 skrandžio rėgimais reguliavimas) trumpalaikis gydymas. **Dėvėjimas.** Rekomenduojama dozę - 200 mg eozinopazo (vieną tabletę) kartą per parą. Kai simptomai palaipsniui, tabletes gali pakeisti vartojimą, tabletes gali pakeisti vartojimą po lygus kas 2 savaites. Simptomams išsivystyti, gydymą reikia nutraukti. Reikėtų nuryti visą tabletę, užgerti pus stikline vandens. Tiesiogiai neįkandami, nei traukiant, likusieji pasirimsimai - tabletes gali darginti po visą skrandį neturėtų būti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas eozinopazui, pakaisiems barbituridams arba papilvinė medžiaga. Eozinopazas negalima vartoti su širdies narkotikais. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pacientai reikia informuoti, kad kreipėsi į gydytoją, jeigu iš pradžių kito savo miegą matydami, galbūt dėl eozinopazo, disidėjus, vėmimo, kėdės, metimų arba įsivaizdavimų ar drogingumo simptomais. Šie simptomai, jei atsiranda, gali būti susiję su eozinopazais, kurie gydymą eozinopazu gali pakeisti po simptomų išsivystymo. **Įspėjimas.** Eozinopazas gali būti vartojamas su alkoholiu, tačiau alkoholio vartojimas gali padidinti eozinopazų šalutinių poveikių tikimybę. Tačiau, nepatvirtinama simptomų neįvykimo arba rimetis gydymu, jeigu serga arba sąveika keičiasi, jeigu yra su vėmimi kas 2 savaites, turi būti nuryti arba neseniai patvirtinti simptomai. Priešingai priešingai priešingai su labai neturėtų būti. **PSPH vartojimas.** Dėl padidėjusios chromosomų A (g) koncentracijos gali būti susijusi atitinkamų narkotikų tikimybė. **Reikšmingi teigiami daviniai** 2005 m. gsm. ELI-01-00009

GREITA IR INOVATYVI PAGALBA NUO RĖMENS!



NUO RĖMENS

2⁹⁹ €**PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neiurių tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Pantoprazolas. Vienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Indikacijos.** „Panzilan“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgštį gaminantį „siurbt“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan“ vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliksus yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kuriuo gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtinėje kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgšties atpylimas (rūgšties atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Gerti po 1 tabletę per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2-3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukite „Panzilan“ vartojimą, kai visai pranykė ligos simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan“ ilgiau kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui, joų lėtimui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“ medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra azanavono; amžius iki 18 metų; nėštumas arba kūdikio žindymas. **Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydote ilgiau kaip 4 savaites; esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo; atsirado naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikėlė; anksčiau sirgote skrandžio opalige arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsargumo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerėjimo nedelsiant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei Jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. „Panzilan“ sudėtyje yra sujų lėtimai. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar soja, vaisto vartoti negalima. **Teksto peržiūros data.** 2024-11-21. **Reklamos parengimo data.** 2025-05-15.

UŽGESINK GAISRA SKRANDYJE!

KAI VARGINA HEMOROJAUS SIMPTOMAI

-30% 7^{48€} 10^{80€}**HEMAGEL® PROCTO**

5 rektalines žvakutes

MEDICININIS PASKIRTIES PREKĖ

PASKIRTIS: skatinanti ūmių ir lėtinių tiesiosios žarnos gleivinės žaizdų gijimą pacientams, kenčiantiems nuo trokšimų ir hemorojaus, taip pat pacientams po Barono operacijos. Mažina kraujavimą, atsiradusį dėl hemorojaus, padeda pašalinti diskomforto pojūtį, ypač deginimą ir peršėjimą tiesiosios žarnos srityje. **SUDĖTIS:** miltelių pavidalo kopulimėlis HEMA-HAS ir kietųjų riebiųjų apvalkalas. **NAUDOJIMAS:** Kartą per parą, geriausia prieš einant miegoti, žvakutę įdėti į tiesiąją žarną suapvalintu galu. **GAMINTOJAS:** VH Pharma a.s., Čekijos Respublika.

4⁹⁹ €**MILGAMMA N, 20 minkštųjų kapsulių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg benfotiamino (riebaluose tirpus vitamino B1 darinio), 90 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6) ir 250 µg cianokobalamino (vitamino B12). **Terapinės indikacijos:** B1, B6, B12 vitaminų trūkumo šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems: po 1 kapsulę 3-4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padeda, per parą užtenka 1-2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtyta, užsigeriant vandeniu. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytą vaistinio preparato pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas sojos arba sojų pupelių produktams, pvz., lecitinui. **Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės:** vartojama ilgiau negu 6 mėn. „Milgamma N“ gali sukelti neuropatiją. Reikia atsargiai (į adityvų kartu vartojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra sorbitolio (ar fruktozės), ir su maistu vartojamo sorbitolio (ar fruktozės) poveikį. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Vaistinio preparato sudėtyje yra lecitino (šlapimo šioje aliejaus). Jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojos, šio vaistinio preparato vartoti negalima. Reklamos tekstas parengtas 2024-09-11.

„MILGAMMA“ – JUDEK LAISVAI!

NUO 9⁹⁹ €**PANANGIN**PANANGIN 158 mg/140 mg, 60 plėvelė dengtų tablečių 9⁹⁹ €PANANGIN 316 mg/280 mg, 30 plėvelė dengtų tablečių 11⁹⁹ €

Kalto aspartatas ir magnio aspartatas

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 mg magnio aspartato arba 316 mg kalio aspartato ir 280 mg magnio aspartato. **Terapinės indikacijos:** „Panangin“ tabletes vartojamos magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šių jonų pasisavinama per mažai arba pernešy daug netenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Panangin 158 mg/140 mg“: paprastai skiriama po 2-3 tabletes 3 kartus per parą. „Panangin 316 mg/280 mg“: paprastai skiriama po 1 tabletę 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas. Adisono liga, hiperkalemija, kalio sulaikančių diuretikų vartojimas, atšventinuklinė II laipsnio blokada, kardiotoninis šokas. **Specialios įspėjimai:** pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padidėja kalio kiekis, vaistinio preparato būtina vartoti atstargiai ir reguliariai kontroliuoti kalio kiekį kraujyje. **Rinkodaros teisės turėtojas:** „Geleoon Lietuva“. **Atstovas Lietuvoje:** „Geleoon Richter“ atstovybė, Maironio g. 23-3, LT-01025 Vilnius, tel. +370 5 268 5382. **Teksto peržiūros data** 2023-05-05 („Panangin 158 mg/140 mg“); 2022-07-07 („Panangin 316 mg/280 mg“). **Reklaminio teksto paruošimo data** 2025-05-12.

NUO REFLIUKSO

-30%

**NEOBIANACID**NEOBIANACID PEDIATRIC, granulės, 36 paketėliai 24⁹⁹ 17⁴⁸ €NEOBIANACID, 14 tablečių 12⁹⁹ 9⁹⁹ €NEOBIANACID, 45 tabletes 26⁹⁹ 18⁷¹ €**MEDICINOS PRIEMONĖS**

- Mašina rėmeni, skausmą, gastroezofaginį refliksą
- Mašina funkcinis dispepsijos sindromas
- Saugo skrandžio ir stemplės gleivinę
- Gali būti vartojamas profilaktiškai, kai sudirginama skrandžio gleivinė
- 100 % natūralus
- Tinka vartoti nėštumo, žindymo metu

NUO ALERGIJOS

5⁹⁹ €**FENKAROL 25 mg, 20 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma.** „Fenkarol“ 25 mg tabletės. **Kūrybinė ir biokibinė sudėtis.** Kiekvienoje tabletėje yra 25 mg kvifendinolio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Simptomatinis alerginis slogos (su konjunktyvitu ar be jo), dermatito (opozono, dilgėlinės) ir niežulio gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vartoti per burną. „Fenkarol“ tabletes yra geriamos iš karto po valgio. Suaugusiems žmonėms. Dozė yra 25-50 mg (1-2 tabletės) 2-4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė yra 200 mg. Gydoma 10 – 20 parų. Prieškus gydymo kursą galima pakartoti. Jeigu per 3 dienas šios sąvijaute nepagerėjo arba net pablogėjo, kreiptis į gydytoją. Vaikams ir paaugliams. Vyresniems negu 12 metų vaikams dozė yra 25 mg (1 tabletė) 2 – 3 kartus per dieną. Gydoma 10 – 15 parų. Prieškus gydymo kursą galima pakartoti. „Fenkarol“ netinka vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas kvifendinolio hidrochloridui ar preparato esančioms pagalbinėms medžiagoms. Pirmasis nėštumo trimestras. **Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vaistinio preparato reikia vartoti ligoniams, sergantiems sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo trakto, kepenų ir (arba) inkstų ligomis. Nevartoti jeigu, nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. Pirmąjį nėštumo trimestrą kvifendinolio vartoti draudžiama. Antrąjį ir trečiąjį nėštumo trimestrą kvifendinolio vartoti nerekomenduojama. Priešmė plėmai perskaityti pakuočių lapelį ir vartoti vartoti, kaip nurodyta. Netikrinami vartojamas vaistas gali pakenkti šios sveikatai. Jei simptomai nepageria ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu žinote, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir, paštu Nepagėdajama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Reklamos teksto parengimo data: 2020 sausio mėn. 06 d.

NUO SLOGOS

NUO 3⁹⁹ €

XYMELIN

XYMELIN, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3⁹⁹ €
XYMELIN MENTHOL, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 5⁴⁹ €
XYMELIN, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido. **Indikacijos:** susisijusį peršalimo ligomis, paburkus nosies gleivinei arba pasireiškus nosies ančių uždegimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 10 metų paaugliams (XYMELIN MENTHOL atveju – vyresniems kaip 12 metų paaugliams) įpurškimas arba 1–2 lašai į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, ūdaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, atrofinis rinitas (XYMELIN MENTHOL atveju), jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną; XYMELIN MENTHOL: jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kuriu metu susiaureja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaisto gali atsirasti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinamasis ir atstoti nosies uždegimas. Gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. XYMELIN nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 10 metų vaikams. XYMELIN MENTHOL: Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per paskutines dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data: 28.03.2024 LT-XYME-2200004

-30%



AKINIAI NUO SAULĖS

Pasirūpinkite visąpusiškai savo akių apsaugą. Naujausia akiniių nuo saulės kolekcija padės suderinti grožį ir sveikatą. Visi VIEW OPTICS akiniai turi filtrą UV400.

JŲSŲ KŪNAS PASILGO PAVASARIO SAULĖS.

NUO 5⁹⁹ €

SMECTA 3 G, milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių 5⁹⁹ €
SMECTA 3 G, milteliai geriamajai suspensijai, 30 paketėlių 12⁴⁹ €

Diosmektitas

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Smecta“ 3 g milteliai geriamajai suspensijai. Sudėtis. Vienaime paketėlyje yra 3 g diosmektitas. **Terapinės indikacijos.** Vaikai nuo 2 metų ir suaugusieji ūminio vidurinio kartu su geriamaisiais rehidratuojančiais tirpalais bei suaugusiųjų lėtinio vidurinio gydymui. **Symptomai** suaugusiųjų skausmo, susijusio su funkciniais žarnyno sutrikimais, gydymui. **Dozavimas.** ūminio vidurinio gydymas, vaikai nuo 2 metų (3 paketėlių) per parą. ūminio vidurinio gydymas (geriamasis 3 dienas) 3 dienas gali būti du kartus dienos. Suaugusiems: 3 gramai (3 paketėliai) per parą. ūminio vidurinio gydymas: 3 dienas gali būti du kartus dienos. ūminio vidurinio gydymas: paprastai trunka ne ilgiau kaip 7 dienas. Kitų ligų gydymui. Suaugusiems: vidutiniškai 9 g (3 paketėliai) per parą. Vartojimo metodas. Vartoti per burną. Paketėlio turinį reikia išpilti prieš pat vartojimą. Vakams: paketėlio turinį reikia išpilti 50 ml vandens arba sumaišyti su pusiau skystu maistu (pienas, daržovių koše, sriuba, kompotas). Suaugusiems: paketėlio turinį reikia išpilti pusę stiklinės vandens. **Specialūs įspėjimai.** „Smecta“ nekeliamas vartoti vaikams ir vaikams iki 2 metų amžiaus. Gydant ūminį vidurinio ligos pakeičiantis ir vaikams nuo 2 metų amžiaus, vokiečių (dengti dehidrataciją). Kartais būna skausmas atsisvejojant į vidurinio intensyvumą, pakentimo arčiau ir klinikinė situacija. Reikia apsaugoti dėl tolesnio „Smecta“ vartojimo: jei po 3 ūminio vidurinio dienos sutrikimas nesirodo, jei yra skausmas kartu su karščiavimu ir vėmimu. Reikia atšaukti širdies diosmektitas pacientams, kuriems praėjusie vaistai sukelia vidurių užkietėjimą. Reikia vengti ilgalaikio „Smecta“ vartojimo. „Smecta“ sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės. Būtinai atsižvelgti cukrinio diabeto sergančių pacientams. Ikių greifitais: Jums yra saiki, kad nebetoleruotumėte kokių nors angliavandenių, ineksktis (ji) prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg pusės dozėje). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas (alergija) diosmektitui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Prieškieiti** apie šalutinį poveikį registruotąjo veltim atstovu Mayday Baltics UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayday.com. **Teksto peržiūros data:** 2024-01-01. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 m. liepos mėn. SME-17-2024-0000

SLENKA PLAUKAI? PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJA GALIA!

NUO 9⁹⁹ €

BEOTEBAL

BEOTEBAL 10 mg, 30 tablečių 9⁹⁹ €
BEOTEBAL 10 mg, 60 tablečių 19⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

BEOTEBAL 10 mg tabletės. Kiekviena į kiekvieną sudėtis. Kiekviena tabletė yra 10 mg biotino. **Terapinės indikacijos.** „BEOTEBAL“ priklauso 8 vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnį, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parestezijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, peršėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems, skaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, t.y. 1 tabletę „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatų gali būti klaidingai didesni arba klaidingai mažesni. Reklamos teksto parengimo data 2022-04.

*Slenkanti, silpnai, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebal“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

NUO SKAUSMO

3⁹⁹ €

METAFENEX 200 mg/500 mg,
10 pėlele dengty tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Kiekviena į kiekvieną sudėtis. Kiekviena pėlele dengty tabletė yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmams, siejamiems su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatinio bei raumens skausmu, nestiprio arthito skausmu, peršalimo ir gripo simptomams, gėklės (ryklės) skausmu bei karščiavimu, malšinimui. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgetikos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems: gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgę metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tabletę, simptomai neišsijauja, daugiau galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. **Kontraindikacijos.** Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistinėmis preparatais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, skaitant COX-2 inhibitorius ir didesnis kaip 15 mg acetilsalicilo rūgšties paros dozes, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumo reakcija, susijusi su acetilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistinėmis preparatais nuo uždegimo; jeigu anksčiau buvo aktyvi arba buvusi paskutinė pėlele opa, buvo ar yra virškinimo trakto išopėjimas ir (arba) ar jo priekūrimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujavimas, sutrikimas, kuriems yra sutrikęs kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti pakaitinio neštinio trimečio metu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Būtinai vartojimas: atšaukimas: jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senyvo amžiaus; serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga ūminiu raudonąja vilkigele; yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinio uždegiminio žarnyno ligos; pacientas neturintis pirmuosius 6 neštinio mėnesius ar ba žindė. Reklamos teksto parengimo data 2022-05.

SKAUSMĄ KEISKI | „METAFENEX“!

IKI -40%



VITABIOTICS WELL linija

MAISTO PAPILAI

WELLWOMAN – naivisų, agurkių, vitaminų ir mineralų kompleksas moterims. WELLMAN – sibirinių ženšenio, amino rūgščių, vitaminų ir mineralų kompleksas vyrams. WELLTEN – subalansuota paaugliams, o WELLKID – patiens mažausiems.

GERA SAVIJAUTA VISAI ŠEIMAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

PASIRUOŠĘ NUOTYKIAMS!

Suburkite
savo
PATIKIMĄ
palaikymo
komandą

**Mažiau skausmo,
mažiau streso!**

**Niekas negali sutrukdyti
užkariauti pasaulio.**



Voltaren Emulgel 23,2 mg/g gelis (diklofenako dietilaminas). **Indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 k. per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarščiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. PM-LT-FENI-25-00002

Fenistil 1 mg/g gelis (dimetindeno maleatas). **Indikacijos.** Niežulio, susijusio su odos išbėrimu, dilgėline, vabzdžių įkandimu arba saulės ar kitokių priežasčių sukeltu paviršiniu odos nudegimu, trumpalaikis malšinimas. **Vartojimas.** Pažeistą odą tepti 2 – 4 k./dieną. **Kontraindikacijos.** Alergija dimetindeno maleatui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Jei niežulys labai sunkus arba oda labai pažeista, jei simptomai per 7 d. nepalengveja, būtina kreiptis į gydytoją. Jei geliu tepamas didelis odos plotas, ilgai būti saulėje draudžiama. Kūdikiams ir vaikams iki 2 m. didelio odos ploto, ypač apimto uždegimo arba pažeisto, geliu tepti draudžiama. Nevartoti ant gleivinės. Sudėtyje yra propilenglikolio ir benzalkonio chlorido.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje <https://vkt.lrv.lt/lt/>. Teksto parengimo data 2025/02. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.



-40 % PREKIŲ ŽENKLAMS

Plaukams

HAIR VOLUME

HAIR VOLUME, 30 tablečių ~~29⁹⁹~~ 17⁹⁹ €

HAIR VOLUME GUMMIES, 60 guminukų ~~27⁹⁹~~ 16⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Nėterkinia plaukų būklę? Jie atrodo ploni ir nušimę? Maisto papildai plaukams „Hair Volume“ gali būti tai, ko reikia, norint turėti storus, žvilgančius ir puikiai atrodančius plaukus! „Hair Volume“ tabletės ir guminukai sėkmingai mitybinio medžiagų gavimo odai ir plaukų folikulams, kur ir formuojasi plaukai. Sudėtyje yra biotino, cinko, padedančių palaikyti normalią plaukų būklę. Taip pat „Annurca“ obuolių ekstrakto, kuriame randama biologiškai aktyvios medžiagos procianidino B-2. Tik 1 tabletė ar 2 gardūs obuolių skonio guminukai per dieną padės puoselėti jūsų plaukus.

PUIKIAI ATRODANTYS, STORI IR ŽVILGANTYS PLAUKAI!



-40%

LISTERINE

BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Burnos skalavimo skysčiai LISTERINE padeda saugoti dantis nuo apnašų, palaiko gaivų burnos kvapą. Pasiekia vietas, kurių dantų šepetėlis negali pasiekti.

SU ŠEPETĖLIU TIK PUSĖ DARBO - NAUDOK IR „LISTERINE“

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis



-40%

HYDROLESS SLIM, 60 kapsulių ~~13⁹⁹~~ 8³⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Padeda palaikyti normalų kūno svorį.

Padeda palaikyti normalų skysčių pasisalinimą per inkstus. Padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.

Juodieji pipirai padeda palaikyti normalią virškinamojo trakto bei kepenų funkciją. Juodieji pipirai ir kardėžiai citrinmedis padeda palaikyti normalų kūno svorį.

Didžiųjų dilgėlių ekstraktas padeda palaikyti normalų skysčių pasisalinimą per inkstus, padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją. Cinkas ir chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą. Cinkas padeda palaikyti normalią riebalų rūgščių apykaitą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo ir padeda palaikyti normalią baltymų sintezę. Vartojimo būdas: 2 kapsulės per dieną. Ryte ir vakare. Vartoti po valgio, užgerti stikline vandens.

HYDROLESS, 30 kapsulių ~~12⁹⁹~~ 7⁷³ €

MAISTO PAPILDAS

Padeda palaikyti normalų skysčių pasisalinimą per inkstus, padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.

Medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį


Džiūvintų stambiauogių spanguolių milteliai, 80 mg

Didžiųjų dilgėlių ekstraktas, 50 mg

Obuolių acto milteliai, 50 mg

Cinkas, 12 mg (120 %)*

Vartojimo būdas: po 1 kapsulę per dieną. Vartoti po valgio, užgerti stikline vandens.



-40%

VISIONACE, 30 tablečių ~~25⁹⁹~~ 15¹¹ €

VISIONACE PLUS, 28 tabletės / 28 kapsulės ~~32⁹⁹~~ 19⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAI

VISIONACE – subalansuotas luteino, mėlynių ekstrakto, antioksidantų kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos padeda išsaugoti normalią regėjimą (cinkas, vitaminai A, B), o antioksidantai – manganas, selenas palaiko ląstelių apsaugą nuo oksidacinės pažeidimo. VISIONACE trinka daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų, dirbantiems akimis reiklų darbą, dažnai jaučiantiems akių nuovargį, vyresnio amžiaus žmonėms, dešimties kontaktinius lęšius. VISIONACE PLUS sudėtyje praturtinta omega-3 rūgštimis ir 12 mg luteino.

VISIONACE – REGĖJIMO JĖGA!



-40%



JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.

-40%

„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS



Pagaminta Kanadoje

IKI -40%



VITADAY
 CHOLESTEROLIUI MAŽINTI SU ČESNAKU, 30 kapsulių 9⁹⁹ 5⁹⁹ € -40 %
 GINKMEDŽIO EKSTRAKTAS, 60 kapsulių 8⁹⁹ 5⁹⁴ € -35 %
 KORVALOLIS, 25 ml 4⁹⁹ 3⁴⁹ € -30 %
 MAISTO PAPILDAI

-40%



AMBIO
 VALERIJONAS PLIUS, 50 tablečių 5⁹⁹ 3⁹⁹ €
 VITAMINŲ B KOMPLEKSAS FORTE, 90 tablečių 13⁹⁹ 8³⁹ €
 MAISTO PAPILDAI

IKI -40%



MICROLIFE
 MICROLIFE BP A7 TOUCH, automatinis kraujospūdžio matuoklis 119⁹⁹ 77⁹⁹ € -35 %
 MICROLIFE BP B6 CONNECT, automatinis kraujospūdžio matuoklis 99⁹⁹ 64⁹⁹ € -35 %
 MICROLIFE BP B3 COMFORT PC, automatinis kraujospūdžio matuoklis 89⁹⁹ 53⁹⁹ € -40 %
 MICROLIFE NEB400, inhaliatorius, mėšiuoklas 79⁹⁹ 51⁹⁹ € -35 %
 MICROLIFE NEB 200, inhaliatorius 69⁹⁹ 48⁹⁹ € -30 %
 MICROLIFE NC 200, skaitmeninis bekontakts termometras 47⁹⁹ 33⁹⁹ € -30 %
 MICROLIFE OXY 300, pulsoksimetras 49⁹⁹ 32⁴⁹ € -35 %
 „MICROLIFE“ INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS

KAULAMS IR SĄNARIAMS

-50% 9^{00€}

GLUKOZAMINAS PLIUS KOLAGENAS, CHONDROITINAS, MSM, 60 tablečių
 MAISTO PAPILDAS
 daugiau informacijos apie produktus www.vitaminai.lt

LENGVAM NERIMUI MALŠINTI IR MIEGUI PALENGVINTI

NUO 6⁹⁹ €

LILANDOR
 LILANDOR 80 mg, 14 minkštųjų kapsulių 6⁹⁹ €
 LILANDOR 80 mg, 28 minkštųjų kapsulių 12⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
 „Lilander“ 80 mg minkštosios kapsulės, Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus. „Lilander“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ligalaidų vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausia šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kleikvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skysto kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ligalaidų vartojimu. UAB „Berlin Chemie Menarini Balti“ J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163 Paruošta 2023 m. gruodžio mėn. LT_LI_21_2023_VI_print

ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ

SAUSŲ AKIŲ LIGOMS GYDYTI

-25%



THEALOZ DUO
 THEALOZ DUO, akių lašai, 10 ml 19⁹⁹ 14⁹⁸ €
 THEALOZ DUO GEL, akių lašai, 30 vnt. 20⁹⁹ 15⁷³ €
 MEDICINOS PRIEMONĖS

„Thealoz Duo“ – akių lašai bei konservantų vidutinio sunkumo ir sunkiam sausų akių sindromui gydyti. „Thealoz Duo“ yra sterilius, be konservantų, hipotoninis ir neutralus pH vandeninis tirpalas akims. Pagrindinės jo sudedamosios dalys yra **trehalozė ir natris hialuronatas**. Trehalozė saugo ir drėkina, yra antioksidantas, saugo ir stabilizuoja ląstelių membranas, stabdo baltymų kitimą ir nebuli skilimą. Natrio hialuronatas yra natūralus polisacharidas, skystas akies paviršiaus drėkintojis ir lubrikantas, suteikia ligai trūkstantį palengvėjimą ir trumpina raginio epitelio (skaidraus akies paviršiaus) gijimo laiką. „Thealoz Duo“ tiekiamas daugiaodžiūsiu ABAK® buteliukuose. Tirpalas sudėtyje nėra konservantų, todėl jis nesukelia jokių negalimų reakcijų vartotojams, kurie yra jautrūs konservantams. Buteliuke yra apie 300 lašų, galioja 6 mėn. po atidarymo, galima naudoti su kontaktiniais lęšiais. „Thealoz Duo Gel“ yra drėklas, skystas gels be konservantų. Sudėtyje esantis specialus **trehalozės, natrio hialuronato ir karbomeno** derinys turi ligalaidų drėkinamąjį, tepamąjį ir apsauginį poveikį akies paviršiui, suteikia didelį komfortą, 30 vienkartinį dozių be konservantų. Gels yra hipotoninis, jo pH yra neutralus. Labai gerai toleruojamas, nėra nebus atipus. Be konservantų.



TYLUS RŪPESTIS

Pastebėkite tuos, kurie rūpinasi
ir slaugo savo artimuosius.
Padėkite jiems kasdienybėje,
kad jie nesijaustų vieni.



Skenuokite QR kodą
ir sužinokite daugiau
apie iniciatyvą.

www.gintarine.lt/tylus-rupestis



Gintarinė
vaistinė

rūpinkimės tais, kurie rūpinasi kitais



2 UŽ 1 KAINĄ

Vitamins D3 šaltinis



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

OLIDETRIM®

OLIDETRIM® 2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **10⁹⁹ €**
OLIDETRIM® 4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **14⁹⁹ €**
OLIDETRIM® 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių **11⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.

Sirdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.

Kaulams ir raumenims – vitaminai D ir K2.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebiųjų rūgščių DHR (dokozahexaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujotaką. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildymo naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.

Grožiu ir imunitetui



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

WALMARK®

MEGA VITAMIN D 4000IU FORTE, 90 kapsulių **19⁹⁹ €** SELENAS, 30 tablečių **8⁹⁹ €**

SUPER VITAMINAS C, 600 mg, 30 tablečių **10⁹⁹ €** COENZYME Q10, 100 mg, 30 kapsulių **19⁹⁹ €**

KALCIS-MAGNIS-CINKAS FORTE, 100 tablečių **16⁹⁹ €** CINKAS, 15 mg, 30 tablečių **8¹³ €**

MAISTO PAPILDAI

„Walmart“ – aukštos kokybės vitaminai ir mineralai.

WALMARK – ŠVYTĖK SVEIKATA!



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!!

SENI LADY urologiniai įklotai moterims

HIGIENOS PRIEMONĖS

- Ploni
- Praliginiai
- Diskretūs
- Su kraujo kontrolės sistema

PROFESIONALŲ UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!!

WALMARK BIORYTHM

MAISTO PAPILDAI

Inovatyvios formos maisto papildų linija „Walmart Biorythm“, kurią sudaro 6 produktai: cinkas, selenas, geležis, vitaminas B12, magnis, ašvaganda (migdamosos vitanijos).

Lėto atpalaidavimo mikrogulės, esančios „Walmart Biorythm“ linijos produktuose, išskiria medžiagas iki 8 valandų per dieną, todėl organizmas pasima įsą tada, kai jam reikia.

„WALMARK BIORYTHM“ VEIKIA TAVO KŪNO RITMŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

Prakaito kontrolei



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

PERSPIREX antiperspirantų linija

KOSMETINIOS PRIEMONĖS

Itin veiksmingi antiperspirantai „Perspirex“ skirti tiems, kam reikia specialių priemonių prakaitavimui mažinti. „Perspirex“ užtikrina geriausią rezultatą, siekiant apsaugoti nuo padidėjusio prakaitavimo ir prakaito kvapo. Klinikiniai tyrimai patvirtina, kad antiperspirantai „Perspirex“ užtikrina ypatingą ilgalaikę apsaugą nuo prakaitavimo ir gali padėti išspręsti prakaitavimo bei prakaito kvapo keliamas problemas.

GYVENIMĄ KEIČIANČI APSAUGA.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

DINADAX

kramtomosios lazdelės

MAISTO PAPILDAI

„DinadaxActive“ – maisto papildas su laktobakterijomis, fruktoigosacharidais, bičių pieneliu, vitaminais B1 ir B6.

„DinadaxEnergy“ – maisto papildas su bičių pieneliu, želatina ir 8 grupės vitaminais.

„DinadaxSapiens“ – maisto papildas su cholino bitartratu, omega-3, linolo ir oleino rūgštimis, vitaminais, folio rūgštimi, biotinu ir cinku.

KRIMSK PASIGARDŽIUODAMAS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

AMEDIPUS pleistras nuo lūpų pūselinės, 15 vnt. **16⁹⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

Inkstams ir šlapimo takams



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių **11³⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:

– padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinis asišiklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė);

– padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių asišiklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).

Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip 1/2 stiklinės).

2 UŽ 1 KAINĄ



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

FJØRD STRONG OMEGA-3

GENIUS DROPS žuvų taukų lašai, 50ml 14⁹⁹ €
SMART GUMMIES, 45 guminukai 19⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

FJØRD STRONG OMEGA-3 GENIUS DROPS – genialūs lašai genialiems protams.

- ✓ Tokios stiprios koncentracijos omega-3, kad užtenka vos keletu lašų per dieną (su pipete).
- ✓ Sertifikuota aukščiausio kokybės 6 natūralių žuvų taukų.
- ✓ Ypač tyrus šaltinis iš laukinių, mažų, riebiųjų žuvų, be žuvies skonio.

FJØRD STRONG OMEGA-3 SMART GUMMIES – revoliucinė kramtoma omega-3 forma.

- ✓ Norvegijos mokslininkų sukurta technologija, leidžianti organizmui geriau pasisavinti omega-3.
- ✓ Natūralaus pasiflorų skonio, visai nesijaučia žuvies. Be cukraus. Be glitimo.

„FJØRD STRONG OMEGA-3“ – GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.

Miegui ir nervų sistamai



1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra tokia
pati arba pigesnė –
NEMOKAMAI!

NEUROMED

MAISTO PAPILDAI

Islandijoje „Neuromed Sleep Forte“ – trejopo efekto dulpiamąsias tabletes, kurios padės greičiau užmigti, kokybiškai išsimiegoti ir iš ryto jaustis žvaliai. „Neuromed Sleep“ – greita pagalba, kad paviktų lengviau užmigti ir ramiai miegoti. Vartoti epizodiškai, neužmiegant, prabundant naktį. „Neuromed Relax“ – streso kontrolė ir nervų sistema. Vartoti jaučiant laukia nervinę lampa ir stresą. „Neuromed Good Mood“ su safranu ir kurkuminiu – gerai nuotaikai, psichologinei funkcijai, nuovargui mažinti. Vartoti patiriant ilgiau užsėmusį stresą, jaučiant nuovargą, apleidžiant pozityvioms mintims.

KARTU Į RĄMYS SU „NEUROMED“!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

LADY ANION, ploni kasdieniniai įklotai su ekologiška medvilne ir anijonų juostele, 24vnt 3⁵⁹ €

HIGIENOS PRIEMONĖ

LADY ANION higieniniai įklotai su ekologiška medvilne ir anijonine juostele. Medvilnė sukuria komforto pojūtį, anijoninė juostelė kvapo kontrolė, laisvą orą. Švelnus paviršius stieks sausas. Rekomenduojami ginekologų.

„LADY ANION“ – TAVO KASDIENIS PASIRINKIMAS



1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra tokia
pati arba pigesnė –
NEMOKAMAI!

HERBITASSIN®

HERBITASSIN® ICELAND MOSS HYDRO, 12 pastilių 5²⁹ €

HERBITASSIN® SALVIA + VIT C, 12 pastilių 4¹⁹ €

HERBITASSIN® ICELAND MOSS + HONEY, 12 pastilių 4⁵⁹ €

HERBITASSIN® ICELAND MOSS + BLACKCURRANT, 12 pastilių 4⁵⁹ €

HERBITASSIN® INTENSE, 12 pastilių 4⁵⁹ €

HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt. 4⁹⁹ €

HERBITASSIN® ledinukai HERBAL EXTRACTS + VIT C, braškių ir miško uogų skonio, 4 vnt. 4⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖ, MAISTO PAPILDAI, MAISTO PRODUKTAI

„Herbitassin“ įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklės ir imunitetui. Islandinės kepenys padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, mentolis – normalų kvėpavimą, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. „Herbitassin Iceland moss HYDRO“ pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmą, mažina sauso kosulio ir užkimo simptomus. Naujiena: „Herbitassin Intense“ – mentolio ir eukalipto skonio pastilės gerklės ir kvėpavimui.

Žarnyno mikroflorai



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

ACIDOLAC® JUNIOR, 20 mešiuoko formos tablečių 10¹⁹ €

ACIDOLAC® JUNIOR braškių skonio, 20 mešiuoko formos tablečių 10¹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

ACIDOLAC® JUNIOR mešiuoko formos tablečių sudėtyje yra genčių žarnyno bakterijų *Lactobacillus acidophilus* La-1417 ir *Bifidobacterium lactis* BI-04TH, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojamas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 mešiuoko formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir glitimo.



1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra tokia
pati arba pigesnė –
NEMOKAMAI!

REBRAIN, 60 kapsulių 59⁹⁹ €

LABANAKT, 14 pakelių 6⁹⁹ €

AQUAMAG+B6, 10 pakelių 8¹⁹ €

URITA, 20 pakelių 14¹⁹ €

VALERMAX + MG 500 MG, 28 pakeliai 7⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

„REBRAIN“ – maisto papildas, kurio sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų poveikis smegenų veiklai, atminties ir gerai nuotaikai patvirtintas klinikiniais tyrimais. Fosfolipidai padeda išlaikyti kognityvinę funkciją ir ryškiai atmintį. Vidutinės grandinės trigliceridai (MCT aliejus) turi sąsąją su žmogaus bendra psichologine funkcija, atmintimi, sprendimų priėmimu, minčių destymu. „Labanakt“ – melatonino, valerijonų ir magnio kompleksas geresniam miegui. Melatoninas padeda mažinti laiko, norint užmigti, trukmę. „Urita“ – produkto sudėtyje esančios stambiauogės spanguolės (lot. *Vaccinium macrocarpon*), miltinės melskavogės (lot. *Eriocaulon arctostaphylos* uve-ursi šienė). Melskavogės padeda palaikyti normalią šlapimo pūslės ir takų veiklą. „AquaMag + B6“ „Valermax + Mg“ – išsivyskinti magnio B grupės vitaminų arba valerijonai.

JOSŲ KASDIENĖ PARAMA PROTUI, KŪNUI IR POILSIUI.

20 MILLIARDS PROBIOTIC+PREBIOTIC, 7 pakeliai 8²⁹ €

BIOSILYMARIN 105 MG, 28 pakeliai 9⁹⁹ €

HYDRO FORTE, 6 pakeliai 5⁹⁹ €

INULIN, 28 pakeliai 9⁹⁹ €

LAXMAG 3000 MG, 7 pakeliai 8⁹⁹ €

MAGNULIN, 28 pakeliai 15⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Išsivyskinti reikalingiausias „20 Milliards“ – net 20 mlrd. kolonijas sudarančių vienetų gyvybingųjų bakterijų + tirpios skaidulos su cinko mineralu. „Biosilymarin“ – ekologiški granuliuoti tikrieji margainiai (silimarinas), padedantys palaikyti normalią kepenų ląstelių regeneraciją (atsinaujinimą), kepenų funkciją, virškinimą, organizmo valymo funkciją, padeda palaikyti normalų cukraus kiekį kraujyje. „Hydro Forte“ – elektrolitų tirpalas, skirtas papildyti mitybai mineralinėmis medžiagomis ir gyvybingomis bakterijomis, kai organizmas praranda skysčių. „Inulin“ – inulinas, 6000 mg + paprastųjų trikažolių ekstraktas, 25 mg. „Magnulin“ – magnio, inulino ir paprastųjų trikažolių kompleksas normaliam virškinimui, kepenų veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. „Laxmag“ – skaidulų šaltinis. Vėniapių lapų ekstraktas ir rabarbarų ekstraktas padeda normaliai žarnyno motorikai ir veiklai. Sudėtyje taip pat yra magnio (net 474 mg) bei inulino (net 3000 mg).

JAUSKIS LENGVAI – PASIRŪPINK VIRŠKINIMUI!



1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra tokia
pati arba pigesnė –
NEMOKAMAI!

NORMALIZUOJĄ ŽARNYNO VEIKLĄ

NUO 8⁹⁹ €

LINEX

LINEX, 16 kietųjų kapsulių 8⁹⁹ €
LINEX, 32 kietosios kapsulės 13⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra ne mažiau kaip 1,2 x 10⁷ KSV liofilizuotų gyvybingų bakterijų (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*). **Terapinės indikacijos:** viduriavimai, pilvo pūtimas ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti kaip pagalbinė priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** mažiausiam kaip 2 m. vaikams gerti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, 2–12 m. vaikams – po 1–2 kapsules 3 kartus per dieną, o vyresniems nei 12 m. – po 2 kapsules 3 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** specialiu atsargumu priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Ulpės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B5240316080. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

NUO 3⁴⁹ €

MEZYM

MEZYM 10000V, 10 skrandyje neišsijusiančių tablečių 3⁴⁹ €
MEZYM 20000V, 20 skrandyje neišsijusiančių tablečių 7⁴⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje skrandyje neišsijusiančių „Mezym 10000V“ tablečių yra 80–110 mg kiaušinių kases miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip: 10 000 lipazės vienetų, 7 500 amilazės vienetų, 575 proteazės vienetų pagal Europos farmakopiją. Vienoje skrandyje neišsijusiančių „Mezym 20000V“ tablečių yra 160–222 mg kases miltelių (tė kiaušinių kases pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 15 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopiją. „Mezym“ vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo sultis. „Mezym“ vartoti negalima, jeigu yra degtinės kases miltelių, kiaušinių baltymų arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Šio vaisto negalima vartoti, jeigu jis sergantis omis kases uždegimu (pankreatitu) arba jama padidėjęs lėtinis kases uždegimas, kai lėpa padidėja yra stipriai šviesiai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Mezym“. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuoti žarnyno nepažeidimą. Esant simptomams, paraišij žarnyno nepažeidimo požymius, reikia apsilankyti žarnyno susaizginimo galimybe. Jeigu papūtose nepastebima diskomforta skrandyje ar žarnyne arba pasikeitė nuolatiniame pūtimui, būtinai kreiptis į gydytoją, kuris jus apžiūrės, kad atitiktų žarnų pūtimui galimybę. „Mezym“ sukurtyje yra laktozė. Jeigu gyvūtas yra salęs, kad netoleruotų kokio nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Mezym“ būtinai reikia nuryti nekreimčius. „Mezym 10000V“ sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. Dozavimas: „Mezym“ visada vartokite likusiai laip, kaip nurodė gydytojas. „Mezym“ dozes pritaikio nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali doze nustatoma individualiai. Jeigu kitap nenurodyta, valgomis ligoniams 2–4 plevė degtinės „Mezym 10000V“ tabletes arba 1–2 plevė degtinės „Mezym 20000V“ tabletes. Dienos dozė – 15 000–20 000 lipazės vienetų kiekiam kilo svorio – neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi paskirti gydytojas. Atsargiai t! mautis ar virškinimo sutrikimo sunkumą, rekomenduojama dozi gali būti padidinta. Plevė degtinės tabletės nuryjamos nekreimant ir užgeriant dideliu kiekiu skysto. Igaliaiko gydymo atveju vartojimo trukmė nustato gydytojas. Vartojimo trukmė vaikams taip pat nustato gydytojas. Reklamimo teksto paruošimo data 2023-12. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltica“, 1. Jaisiroko g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 1642. (Eilabene-chemia.com LT). Msc. 05. 1023. 10. pluma.

„MEZYM“ PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSI VIRŠKINIMĄ!

*Kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų.

IKI -45 %



LINEX®

MAISTO PAPILDAI

Vienoje „Linex® Complex“ kapsulėje yra 10 mlr. mikroskai ištirty gyvy. *Lactobacillus rhamnosus* GG bakterijų, taip pat vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje „Linex® Forte“ kapsulėje yra 2 mlr. gerai žinomų ir mikroskai ištirty gyvy. *Lactobacillus acidophilus*, DSM 15241, ir *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954, bakterijų. Vienoje „Linex® Kids“ pakeltyje arba 6-uoje „Linex® Baby“ laisusose yra 1 mlr. *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954, bakterijų. **Vartojimas:** „Linex® Complex“ suaugusiems ir vyresniems nei 6 m. vaikams gerti po 1–2 kapsules per dieną. „Linex® Forte“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. – po 1 kapsulę 1–3 kartus per dieną; 3–12 m. vaikams – po 1 kapsulę 1–2 kartus per dieną. „Linex® Kids“ kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 1 pakeltyje 1 kartą per dieną. „Linex® Baby“ naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 6 lašus 1 kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Ulpės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B5240316085. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

KOKYBĖ, KURIA GALIMA PASITIKĖTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20 %



LACTO SEVEN

MAISTO PAPILDAI

„Lacto Seven“ sudėtyje yra net 7 rūšių gerųjų lakto-bifido bakterijų, vitamino D ir inulino. Vartojimas: suaugusiems 1–2 tabletes, vaikams nuo 3m. – 1 tabletė per parą, nebent gydytojas nurodys vartoti kitap. Pagaminta Suomijoje.

*Akcija taikoma kaimų skrituku pažymėtomis prekėms

KEPENIMS

NUO 9⁹⁹ €

ESSENTIALE® FORTE N

ESSENTIALE® FORTE N, 300 mg, 30 kietųjų kapsulių 9⁹⁹ €
ESSENTIALE® FORTE N, 600 mg, 30 kietųjų kapsulių 14⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. **Terapinės indikacijos:** simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje poalkaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, matlinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams vienkartinė dozė – dvi 300 mg kietosios kapsulės arba viena 600 mg kietoji kapsulė. Paros dozė – po dvi 300 mg kietasias kapsules arba po vieną 600 mg kietąją kapsulę 3 kartus per parą (1800 mg sojų fosfolipidų). „Essentiale forte N“ saugams ir veiksmingumas vaikams ir paugliams iki 12 m. neiširti. Bet šios priežasties, „Essentiale forte N“ neturėtų būti vartojamas vaikams ir paugliams iki 12 m. Kapsulės geriamos valgio metu, nekreimtytos, užgeriant dideliu kiekiu skysto (pvz., stikline vandens). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams, sojos arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. **Specialūs įspėjimai:** „Essentiale forte N“ neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukkelto kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „Essentiale forte N“ gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti šių vaistų dozes. „Essentiale forte N“ sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejaus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas natrio ir etanolio kiekis. Reklamimo teksto paruošimo data 2023-09. 2201_58_Essentiale_V01_LT

MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!

PILVO SKAUSMUI, PŪTIMUI, DUJŲ KAUPIMUISI ŽARNYNE PALENGVINTI

5⁷⁵ €

METEOSPASMIL®

60 mg/300 mg, 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Terapinės indikacijos: žarnyno funkcijos sutrikimų, hidrų meteorizmo ir dujų kaupimosi žarnyne (esant dirgliosios žarnos sindromui) simptomais gydymas. **Dozavimas:** suaugusiems nuo 18 metų amžiaus: paprastai vartojama po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną pradėdant valgyti. Vaistinis preparatas vartojamas 3–4 savaites. „Meteospasmyl“ nėra skirtas vaikams ir paugliams iki 18 metų. **Vartojimo metodas.** Vartoti per burną. Kapsulės geriamos prieš pradėdant valgyti, jos yra nuryjamos nekreimtytos užsigeriant pakankamu skysčiu kiekiu. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas alverino citrui, simetikonui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; žarnų nepažeidimas; vartojimas vaikams ir paugliams iki 18 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vaista reikia vartoti lais atvejais, kai yra galimo žarnyno nepažeidimo simptomai (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, dujų ir arba) išmatų susilpnėjimas). Kepenų funkcija. Pacientams, gydomiems alverinu/simetikonu, pastebėta padidėjusi, daugiau nei 2 kartus viršutinę normos ribą (VNR) viršijanti alverino aminotransferazės (ALT) ir aspartato aminotransferazės (AST) koncentracija. Šis padidėjimas gali būti ydmas ir padidėjusio bendro bilirubino kiekio serumo. Jei kepenų aminotransferazų kiekis padidėja tiek, kad VNR viršijama daugiau nei 3 kartus, o ypač pasireiškus gelta, patartina nutraukti alverino ir simetikono vartojimą. Teksto paruošimo data 2024 m. vasario 13 d.

NUO PILVO PŪTIMO

-20 %



SIMETIGAST FORTE

240 mg kapsulės, 10 kapsulių 2⁹⁹ 2³⁷ €

SIMETIGAST FORTE

240 mg kapsulės, 60 kapsulių 9⁹⁹ 7⁵² €

SIMETIGAST FORTE BABY

geriamieji lašai, 30 ml 5⁴⁴ 4³⁵ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, ragėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusiems ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną.

„SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.

GREITAI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

-20 %



SAMARIN

SAMARIN, milteliai geriamajam tirpalui, 6 pakeliai 3⁹⁹ 2⁹⁵ €
SAMARIN, milteliai geriamajam tirpalui, 18 pakelių 4⁹⁹ 3⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Skandinavijsje nuo 1923 m. gaminamas miltelių formos Samarin mineralų derinys, kurį ištirpinus vandenyje paruošiamas gaivus, lengvai putojantis gerimas. Maisto papildas vartojamas esant nereguliariam valgymo ritmui ar persivalgius, todėl „Samarin“ yra nuolatinis vakarelių ir švenčių palydovas.

-40%



AMBIO
PATIRANTIEMS ĮTAMPĄ, 20 kapsulių **7⁹⁹ 4⁹⁹ €**
PATIRANTIEMS ĮTAMPĄ, 100 ml **7⁹⁹ 4⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAI

IKI -40%



AMBIO
NERVŲ SISTEMAI, 15 kramtomųjų tablečių **5⁹⁹ 3⁹⁹ € -40 %**
PASIFLORA, 60 tablečių **9⁹⁹ 6⁹⁹ € -35 %**
MAISTO PAPILDAI

-40%



AMBIO
ATMINČIAI, 30 tablečių **16⁹⁹ 10⁹⁹ €**
ATMINČIAI PLUS, 30 tablečių + 30 kapsulių **24⁹⁹ 13⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAI

— ATMINČIAI IR DĖMESIO KONCENTRACIJAI PAGERINTI —

NUO 11⁹⁹ €


GINGIUM 120 MG, 30 plėvele dengtų tablečių **11⁹⁹ €**
GINGIUM 120 MG, 60 plėvele dengtų tablečių **19⁹⁹ €**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 120 mg dviklaucio ginkmedžių lapų ekstrakto. **Terapinės indikacijos:** vyresnio amžiaus žmonių lengvo ir vidutinio sunkumo smegenų kraujotakos nepakankamumo, protarpinio šuabavimo, galvos svaigimo simptomams mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 1 tabletė 1–2 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** neskirtas vartoti jaunesniems nei 18 metų žmonėms. „Sandoz Pharmaceutical d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52403136089. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-13.

-40%



AMBIO
OMEGA 3, 60 kapsulių **10⁹⁹ 6⁹⁹ €**
OMEGA-3 FORTE, 60 kapsulių **12⁹⁹ 7⁹⁹ €**
LINŲ SĖMENŲ ALIEJUS, 100 kapsulių **13⁹⁹ 8⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAI

-40%



AMBIO
MAGNIS, 20 tirpiųjų tablečių **4⁹⁹ 2⁹⁹ €**
MAGNIS SU B6 FORTE, 30 tablečių **10⁹⁹ 6⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAI

-40% 22¹⁹ €


EPITOME Cardiovascular formula, 90 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Augalines sudėties produktas.
- Didelės (skirtinių aktyviųjų medžiagų dozės 1 kapsulėje):
 - Fermentuotų sojų ekstrakto, kuriame yra 2000 FU (tibrino vienetai) natokinazės
 - Fermentuotų ryžių ekstrakto, kuriame yra 2,9 mg monokolino K
 - Bergaminių citrinmedžių vaisių sulčių ekstrakto, kuriame yra 50 mg polifenolių
 - Dažnių iberžolių šaknų ekstrakto kuriame yra 20 mg kurkumino ir 20 mg polikosanolio
- Sudėtyje esantis dažnių iberžolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje bei normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją.

— KOJŲ VENOMS —

NUO 11⁹⁹ €


VENORUTON FORTE 500 mg, 30 tablečių 11⁹⁹ €
VENORUTON 1000 mg, 15 šnypščiančių tablečių 15⁹⁹ €
O-(β-hidroksietil)-rutozidai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje „Venoruton forte“ tablete yra 500 mg O-(β-hidroksietil)-rutozido; kiekvienoje Venoruton šnypščioje tablete yra 1000 mg O-(β-hidroksietil)-rutozido (HR). **Indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomams (edemos, kojų nuovargio, sunkumo, skausmo, mėšlungio, parestezijos) lengvinti, hemorojaus simptomams mažinti. Papildomai diabetinės retinopatijos (diabeto komplikacijos tinklainės kraujagyslių pažeidimo) ir limfos sąstovio gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Venoruton forte“ – 1 tablete 2 kartus per parą; Venoruton šnypščiosios tabletės: 1 tablete – 1 kartą per parą. Venoruton neskirtas vartoti vaikams. Dozavimas, esant visoms indikacijoms, pateikiamas pakaitės lapelyje arba www.vkl.lt. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** negalima vartoti, jeigu yra kojų edema dėl širdies, inkstų arba kepenų ligų. Venoruton 1000 mg šnypščiojų tablečių sudėtyje yra kalio ir natrio. Reklamos teksto parengimo data 2023 balandžio mėn. 2024_SB_Venoruton_V01_LT

NUO 11⁹⁹ €**DICLAC**DICLAC 5% gels, 100g 11⁹⁹ €DICLAC 5% gels, 150g 15⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklosios medžiagos, stipinimas: 1 g Diclac 5% gelsio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokaliams skausmams malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. **Varžymo būdas ir dozavimas:** plona, „Diclac“ 5% gelsio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 pakuliniai nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceutical d.d.“ Filialas, Ulpės g. 21-I, LT-08028 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240335891. Teksto patvirtinimo data 2024-03-15.

STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!**NUO SKAUSMO**NUO 7⁹⁹ €

OLFEN® 140 mg vaistinis pleistras, diklofenako natrio druska

2 pleistrai 7⁹⁹ €5 pleistrai 12⁹⁹ €10 pleistrai 19⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklioji medžiaga, stipinimas: Vaistiniame pleistru yra 140 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokalus skausmas, sukeltas (pvz., sporto traumos) dėl ūmaus sausgyslių, raščių, sąnarių ar raumens patempimo, smūlio ar sąnarių patinimo, mialgijos. **Dozavimas ir varžymo metodas:** sausgysiesiems 1 vaistinį pleistrą reikia priklijuoti ant skaudamos vietos 2 kartus per dieną – ryte ir vakare. Pleistrai dienai duotį yra 2 vaistiniai pleistrai, net jeigu padėtas daugiau nei viena vieta. Vieną metodą tik viena padėta vieta. Naujais ant odos. Pleistrai neduoda tiklumo. Jeigu reikia, pleistrai prie skausmo vietos gali būti prilydinami elastiniu tvarslu. Gydoma ne ilgiau kaip 7 dienas. „Olfen“ pleistrai jaunesniems kaip 15 m. pacientams naudoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei kitoms skausmą ir uždegimą slopinantiems nesteroidiniams vaistams preparatams (NVNU) arba acetalicilo rūgšties, acido, dilgėlių ar ūminis rinitas, kurio pasekmė pavojingas acetalicilo rūgšties arba kitų NVNU, esama skrandžio ar žarnų opa, ūminis žaizdos, sudėgimų, odos infekcijos ar eglems, paskutiniai trys nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai:** jeigu simptoma didėja ilgiau kaip 3 d. arba pablogėja, reikia kreiptis į gydytoją. Pacientams, kurie serga ar anksčiau sergę bronchine astma arba alergijos, gali būti bronchų spazmas. Jeigu pavargusių vaistinio pleistro atsidaro išbrėmų, gydymą reikia nedelsiant nutraukti. Gydymą vieta reikia saugoti nuo tiesioginių saulės ir ultravioletinių spindulių (1 dieną), kad nepasireikėtų padidėjusio jautrumo šviesai reakcija. Vaistinį pleistrą atsigalvoti turi naudoti pacientai, kurių riešui, kėpeni ar širdies funkcija yra sutrikusi arba jeigu praėjusio bėgo pėsinio opa. Žarnyno uždegimas ar virškinimo kraujavimai. Preparatą atsigalvoti reikia naudoti servyms pacientams, nes yra didesnis nepageidaujamo poveikio pavojus. Sudėtyje esantis propilenglikolis ir butilpropilenglikolis gali sukelti lokalių vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivines. **Reikiamas teksto parengimo data 2025-01-22, LT-01-0048.**

TEISINGAS ĖJIMAS KOJAVIANT SU SKAUSMU!**SKAUSMO IR / ARBA KARŠČIAVIMO MALŠINIMUI**6⁹⁹ €

UPSARIN C 330 mg/200 mg, 20 šnypščiučių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stipinimas: 330 mg acetilicilo rūgšties, 200 mg askorbo rūgšties. **Indikacijos:** ūpina ar vidutinio stiprumo skausmo malšinimas ir (arba) karščiavimo malšinimas. **Varžymo būdas ir dozavimas:** sausgysiesiems ir 16 m. bei vyresniems paaugliams po 1-2 šnypščiučių tabletes, ne dažniau kaip kas 4 val., ne daugiau kaip 9 tabletes per parą. Servyms pacientams po 1-2 šnypščiučių tabletes, ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Vartoti per burną. Prieš vartojimą išvartoti tabletes išdėlioti vandens ir nedelsiant išgerti. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija acetilicilo rūgščiai, askorbo rūgščiai, kitiems salicidams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu acetilicilo rūgšties, kiti salicidai arba nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo anksčiau buvo sukėlė astmos (duslos) priepuoli, jeigu sergate ar anksčiau sergote skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa, sunkia kepenų, inkstų ar širdies liga, paskutiniai 4 nėštumo mėnesiai, negalima vartoti daugiau kaip 100 mg per parą, jeigu inkstuose yra akmenų (negalima vartoti 1 g vė. / parą). Negalima vartoti kartu su metildopa, jeigu metildopa doze virš 20 mg per savaitę, arba jeigu acetilicilo rūgšties doze yra priešdėgėginė (3-5 g vienkartinė ir (arba) 2-9 g paros) arba analgetinė / antipiretinė (>500 mg vienkartinė ir / 5 g paros), kartu su geriamaisiais antikoaguliantais, jeigu acetilicilo rūgšties doze yra priešdėgėginė arba analgetinė / antipiretinė, nerekomenduojama vartoti karščiavimo malšinti ir virusinės infekcijos gydymui vakarais iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai:** vartoti atsargiai jeigu ilgai ir dideliems doziams vartojant analgetikų skauda galvą (užmet gėvos skausmo negalima malšinti dar didesniems su doze), anksčiau sergote skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio uždegimo arba buvo kraujavimas iš viršutinio traktato, sutrikusi širdies veikla, kepenų arba širdies veikla, mėnesinė yra gausios, kraujavimai iš gimdos ne mėnesinių metu arba jeigu į gimdą didelis spaudimas, esant G6PD trūkumui, sergate podagra arba anksčiau sergote šlapimo takų akmenimis, esate senyvo amžiaus arba jums yra dehidratacija, jeigu Jūsų kūno svoris yra mažas. Nerekomenduojama vartoti sergant astma ar jei yra bėrimas (dilgėlinė), susijęs su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo arba acetilicilo rūgštimi. Vartojimą reikia nutraukti vos pastebėjus odos išbrėmų, gleivinės žaizdų. Daugiau informacijos apie specialius įspėjimus ir vaistinio preparato charakteristikų santraipą ar pakuočių lapelį. **Reikiamas teksto parengimo data 2025.05.14, PM-17-2025-5-3372.**

12⁹⁷ €**VOLTAREN AKTIGO**

140 mg vaistinis pleistras, 5 vnt.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: diklofenako natrio druska. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis (ne ilgiau kaip 7 d.) vietinis simptomų (dėmių patempimų, audinių išbrėmų, smūgių, atsitiktinių dėl ūminio ir lėto traumų (pvz., sporto traumų), gydymas. **Varžymo būdas ir dozavimas:** sausgysiesiems ir paaugliams nuo 16 m. priklijuoti 1 vaistinį pleistrą ant skaudamos vietos 2 kartus per parą, ryte ir vakare. Negalima vartoti daugiau kaip 2 pleistrai per parą. **Kontraindikacijos:** alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, aktyvi skrandžio ar žarnyno opa, paskutiniai nėštumo trimestrai, vaikai ir paaugliai, jaunesni nei 16 m., buvęs astmos priepuolis, dilgėlinė arba nosies gleivinės uždegimas ir rinovirus, pavojingas acetilicilo rūgšties ar kitų vaistų nuo skausmo ir uždegimo. Negalima pleistrą klijuoti ant patalios odos. **Specialūs įspėjimai:** pastebėjus odos išbrėmų, reikia nedelsiant nutraukti pleistro. Sūlyti poveikį palmsi smūchi, vartojant mažiausią veiksmingą dozę trumpesniu laiku. Pleistro neturi būti klijuojamas ar kitas kontaktuoti su akimis ar gleivėmis, atsigalvoti naudoti servyms pacientams dėl didesnio sausumo poveikio tikimybės. Nenaudoti šio pleistro ir kitų vaistų su diklofenaku tuo pačiu metu. Pastatę su gydytoju, jeigu sergate ar sergę bronchine astma arba alergija, turite inkstų, širdies ar kepenų sutrikimų, anksčiau turėjote skrandžio ar žarnyno opą, žarnyno uždegimą arba turite padidėjusį jautrumą kraujavimui. Naudojant pleistrą, vėsiu būdu reikia kontroliuoti saulės ir ultravioletinių spindulių poveikį. **Reikiamas teksto parengimo data 2025-03-05.** Prekių ženklai priklausia „Jaleel“ arba „Jaleel“ turi licenciją. ©2025 JALEEL arba licencijos turėtojas.

DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI

-25%

**STARAZOLIN SAUSOMS IR SUDIRGUSIOMS AKIMS** Natrio hialuronatas / deks-pantenolis, 10 ml (be konservantų) 14⁹⁴ 11¹² €**STARAZOLIN HYDROFORTE** Natrio hialuronatas, 10 ml (be konservantų) 14⁹⁴ 11¹² €**STARAZOLIN HYDROBALANCE PPH** Natrio hialuronatas, 2 x 5 ml 12⁹⁴ 9³⁵ €**MEDICINOS PRIEMONĖS**

Drėkinamoji, raminaojioji ir apsauginio poveikio lašai, palengvinantys akies paviršiaus regeneraciją. „Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims“ akių lašai skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. **Lašai drėkina akį, stabilizuoja akies gleivinę ir regeneruoja akies paviršių.** „Starazolin Hydroforte“ – intensyviai drėkinantys akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui, o „Starazolin Hydrobalance PPH“ suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą keikviena dieną. Lašai rekomenduojami esant akių aprašius dirgliams, sumažėjus mikrocirkuliacijai, kai yra nepakankamas ašarų gamyba arba jų sudėties pokytis. „Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims“ ir „Starazolin Hydrobalance PPH“ gali naudoti žmonės, neįsijaušę visų rūšių kontaktinius lęšius. Prieš vartojant „Starazolin Hydroforte“ reikia išimti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1-2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginę maišelį.

IKI -35%

**NAVIVISION, NAVITAE, NAVI INFLA**NAVIVISION PLUS, pavargusioms akims su natrio hialuronatu (0,3 %) ir alavijais, 15 ml 12⁹⁴ 9¹¹ € -25 %NAVIVISION PLUS, paraudusioms akims su natrio hialuronatu (0,3 %) ir natūraliais augaliniais ekstraktais, 15 ml 12⁹⁴ 9¹¹ € -25 %NAVIVISION PLUS, sudirgusioms akims su natrio hialuronatu (0,3 %), medetkų, hamamelio ekstraktais, 15 ml 12⁹⁴ 9¹¹ € -25 %NAVITAE PLUS PF, antisekciniai, lubrikuojantys akių lašai su vitaminais A + E, be konservantų, 10 ml 18⁹⁴ 12²³ € -35 %NAVI INFLA, akių lašai konjunktivito simptomams lengvinti, 15 ml 12⁹⁴ 9¹¹ € -25 %**MEDICINOS PRIEMONĖS**

Navivision akių lašai – stipriai drėkinantys natūralūs akių lašai su natrio hialuronatu 0,3 % pagrindiniais akių problemoms spresti. **Pavargusioms akims** – užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą esant sausų ir pavargusių akių pojūčiui. **Sudirgusioms akims** – akių alergijos simptomams palengvinti bei pagrindiniams akių problemoms spresti. **Paraudusioms akims** – palengvina paraudusių ir pavargusių akių būklę, susijusią su konjunktivitu (niežėjimas, ašarojimas, deginimas ir t.t.). **Navitae Plus PF** – antisekciniai poveikio ir tepamosios savybėmis pasižymintys akių lašai su vitaminais A + E. Palengvina sausų akių sindromą ir akių diskomfortą, kurį sukelia keratitas, šaltinis poveikis po ragenos operacijos, trauminės opos, ragenos uždegimas. **Be konservantų, Naviflora** – antisekciniai drėkinamieji akių lašai su natūraliais augaliniais ekstraktais skirti naudoti esant ūminiam, lėtiniam ar alerginiam konjunktivitui. Lengvina su konjunktivitu susijusius simptomus: ašarojimą, paraudimą ir niežėjimą.

IKI -50%

**OCUTEIN****MAISTO PAPILAI, MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Ocutein Kristal“ – kristolo tyrimo regėjimui!

„Ocutein Retin“ – patobulinta formulė daug dirbančių akių mikrocirkuliacijai.

„Ocutein Brilliant“ – briliantiškas apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims.

„Ocutein Forte“ – trejetas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims.

Vartojimas: 1 kapsulė per parą.

„Ocutein Sensitiv Plus“ – drėkinamieji akių lašai su hialuronu ir melnyčių ekstraktu jautrioms, daug dirbančioms akims.

„OCUTEIN“ – DAUG DIRBANČIŲ AKIŲ APSAUGA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

BE KONSERVANTŲ

-20%

**OCUTEARS ALO+ oftalm.tirp.** 10ml 45⁹⁷ 12⁷⁸ €**OCUTEARS HYDRO+ 0,2% lašai**, 10ml 44⁹⁷ 11⁹⁸ €**AKIŲ LAŠAI**

„Ocutears Alo+“ sudėtyje esantis alavijai turi akių paraudimą ir paraudimą malšinti, antimikrobinį, priešdėgėginį, žaizdų gijimą skatinantį, antioksidacinį poveikį. Alavijai stiprina hialuron drėkinamąjį ir regeneracinį poveikį, užtikrinant dar ilgiau trunkantį komfortą ir akies paviršiaus apsaugą. „OCUTEARS ALO+“ IR „OCUTEARS HYDRO+“ – EFEKTYVI IR ILGALAIKĖ APSAUGA SAUSOMS AKIMS BE KONSERVANTŲ.

iki 50%



PIRK LIVOL®
SINCE 1959

IR LAIMĖK!



x9
SPALVOTIEJI LAGAMINAI
Mandarina Duck
TROLLEY CABIN,
po 3 kas mėnesį



x30
Sveikatinimo rinkinių,
po 10 kas mėnesį

Žaidimas galioja 2025 06 01 – 2025 08 31, fizinėse vaistinėse arba www.gintarine.lt perkant bent vieną bet kurį LIVOL maisto papildą. Registracijos anketa bei žaidimo sąlygos ir taisyklės rasite www.gintarine.lt. Nuolaidos pasiūlymas galioja 2025 06 01 – 2025 06 30, administracijos patvirtintam prekių sąrašui, perkant fizinėse vaistinėse su vaistinių įrašų kortelėmis ir www.gintarine.lt įrašų kortelėmis. „Draugystė“ dalyviams. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Prekių kiekis ribotas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

 Gintarinė vaistinė

 **VAISTINĖ**

IKI -35%

„MÖLLER'S“ ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS**MAISTO PAPILDAS**

„Möller's“ – tai šimtmečiui puoselėjami žuvų taukai visi šeimai. „Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's“ žuvų taukai puikiai tinka kasdien visą gyvenimą, įvairaus skonio krantomsios žuvelės „Möller's Junior“ yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikui organizmui naudingų medžiagų.

OMEGA-3 EKSPERTAI JAU 170 METŲ!


*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

**NUO ŽARNYNO KIRMĖLIŲ**4⁴⁹ €**PIRANTELIS POLPHARMA**

250 mg/5 ml, geriamoji suspensija (pirantelis), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 5 ml geriamosios suspensijos (1 matavimo taurelėje) yra 250 mg pirantelio. Indikacijos: skirtas 2 m. ir vyresniems vaikams bei suaugusiems spalinių sukeliai kirmėlinė ligai gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė suaugusiems ir vaikams nuo 2 m., sveriantiems ne mažiau kaip 11 kg, yra 10 mg/kg kūno svorio. Po gydymo praėjus 14 dienų, būtinas kontrolinis parazitologinis tyrimas. Jei randama spalinių, tuomet vaistinio preparato dozė reikia kartoti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; nėštumas ir žindymas; generalizuota mialenija; vartojamas kartu su piperazinu. Specialūs spėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Pirantelis Polpharma“, jeigu jūsų kepenų veikla sutrikusi. Kad liga nepasikartotų, priimama laikytis griežtų higienos priemonių: kasdien plauti išangės sritį, keis kartus per dieną valyti nagus. Vaikams nagus būtina nukirpti trumpai. Būtina reguliariai keisti apatinius drabužius ir pilnam. Pacientams turi nesikątyti. Reikia gydyti visus šeimos narius, nes ši liga dažnai būna besimptomė. „Pirantelis Polpharma“ nėra skirtas jaunesniems nei 2 m. arba sveriantiems mažiau nei 11 kg vaikams, nes negalima pateikti dozavimo rekomendacijų. Reklamos teksto parengimo data 2025-02 mėn.

**NUO ALERGIJOS**4⁴⁹ €**CETIRIZIN ACTAVIS**

10 mg, 10 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plevėle dengtoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems žmonėms ir 6 m. amžiaus bei vyresniems vaikams cetirizinas vartojamas sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** 6-12 m. vaikams: 5 mg (pusė tabletės) 2 kartus per parą; suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams: 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, dozė reikia mažinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientams, sergantiems sunkia lėtine inkstų liga, kai reikalingos dializės. **Specialūs spėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Cetirizin Actavis“, jeigu sergate inkstų nepakankamumu (jei būtina, Jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Reikalinga dozė nustatys gydytojas); jeigu turite šlapimo sistemos problemų (tokių kaip nugaros smegenų problemų, arba prostatos ar šlapimo pūslės problemų); jei sergate epilepsija ar Jums gali būti traukulių. Kartu su „Cetirizin Actavis“ vartoti alkoholio nerekomenduojama, kaip ir su kitais antihistaminiais vaistais. Dėl sudėtyje esančios laktazės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01. OTC-LT-00089



-40% 14^{99€}



EPITOME Coenzyme Q10, 200 mg, 30 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Ilin didelė kofermento Q10 dozė – net 200 mg.
- 260 mg linų sėmenų aliejaus, kuriame yra nepakeičiamosios omega-3 riebiųjų rūgšties – alfa linolenolio rūgšties.
- Minkštas maisto papildas kapsules lengviau praryti.

-35% 12^{99€}



EPITOME Resveratrol, 200 mg, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Resveratrolis – tai natūralus polifenolis, turintis antioksidacinių savybių.
- 1 kapsulėje yra itin didelis kiekis resveratrolio, o sudėtyje esantis piperinas padeda geriau įsisavinti transresveratrolį ir sustiprinti jo poveikį.
- Net 200 mg transresveratrolio iš japoninių pelevėnėlių sausiojo ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių būklę.
- Sudėtyje yra 20 mg piperino iš juodųjų pipirų vaisių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos funkciją, nervų sistemos veiklą, odos būklę, kepenų funkciją, imuninės sistemos veiklą.

-40%



AMBIO

SELENAS, 90 tablečių **9^{99€} 5^{99€}**

CINKAS, 45 tablečių **7^{99€} 4^{37€}**

MAISTO PAPILDAS

-35%



AMBIO

URO COMPLEX, 30 kapsulių **10^{99€} 6^{58€}**

VITADAY

SPANGUOLIŲ EKSTRAKTAS SU VITAMINU C, 60 tablečių **6^{99€} 4^{34€}**

MAISTO PAPILDAS

-40%



AMBIO

REGĖJIMUI FORTE, 30 kapsulių **14^{99€} 8^{99€}**

REGĖJIMUI SU GINKMEDŽIO EKSTRAKTU, 30 kapsulių **14^{99€} 8^{99€}**

MAISTO PAPILDAS

IKI -40%



AMBIO

NAKVIŠŲ ALIEJUS, 100 kapsulių **19^{99€} 13^{44€} -30%**

MENOPAUSE COMPLEX, 30 tablečių **16^{99€} 10^{19€} -40%**

MAISTO PAPILDAS

-25% 5^{02€}



AMEDIPLUS

Šildantis arklų balzamas, 250 ml
Šaldantis arklų balzamas, 250 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-20%



SVEIKAŽOLIŲ ARBATOS

„Sveikazolių arbatos“ asortimente garuoja kruopščiai atrinkti vaistažolių mišiniai bei pavienių žolelių arbatos, sveiginančios gardžių skonių ir šildančių iš vidaus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -45 %



GREENIFY

Kokybiški, geriau įsisavinami maisto papildai sveikatai ir grožiui.

Pagrindiniai ingredientai: ekstraktai, vitaminai ir mineralai nauda:

- **odos, plaukų ir nagų grožiu** rinkitės „Collagen Beauty Shots“;
- **imunitetui ir organizmo apsaugai** nuo sezoninių šaltųjų – „Immunity Boost Shots“;
- **kad pavyktų greičiau užmigti ir kokybiškai miegoti** (bandykite „Deep Sleep Shots“);
- **sąnariams** – „Collagen Joints Shots“.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-25 %



SMARTHIT IV® FERRUM

EFEKTYVAUS PASISAVINIMO MAISTO PAPILDAS

Naudojant patentuotą technologiją „Miosol“ pagaminamos mikrokapsulės, į kurias įterpiamos geležies molekulės. Mikrokapsulių tikslas – apsaugoti veiknią medžiagą nuo skrandžio rūgščių ir užtikrinti, kad ji pasiektų plonąją žarną. Šis technologinis sprendimas leidžia kelių kartus pagerinti veikliosios medžiagos pasisavinimą ir sumažinti įprastai geležiai būdingus šalutinius poveikius. Geležis svarbi, nes padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą bei padeda palaikyti normalų deguonies pernešimą organizme.

„SMARTHIT IV® FERRUM“ galima rinktis kapsulės arba skystį.

„SMARTHIT IV® FERRUM“ – 1 kapsulėje yra 28 mg mikrokapsuliuotos geležies. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų.

Naujiene „SMARTHIT IV® FERRUM Strong“ – tai išmanus ir kompleksinis sprendimas, padedantis efektyviai palaikyti geležies atsargos organizme. 2 kapsulės – 40 mg mikrokapsuliuotos geležies versija su bioktyvia folio rūgtimi bei aminorūgštimi L-histidinu.

„SMARTHIT IV® FERRUM Liquid“ – 5 ml skysčio yra 14 mg mikrokapsuliuotos geležies. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

„SMARTHIT IV® Lactoferrin“, 100 ml – laktoferinas yra natūraliai organizme aptinkamas geležį surišantis glikoproteinas.

„SMARTHIT IV® FERRUM“ – GELEŽIS, KURI PASIEKIA TIKSLĄ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-10 % 2^{96€}

GINTARO RŪGŠTIS, 20 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgant.

Rekomenduojame suvartoti per parą kiekįje (3 tabletės) yra 0,3 g gintaro rūgšties.

Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g. 28, Vilnius

Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 28, Vilnius

ŠLAPIMO TAKŲ SISTEMAI

-30 %



URINAL

MAISTO PAPILDAS

„Urinal“ – šlapimo takų sistelai. Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys.

„Urinal Akut“ – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „ExoCyan“, paprastųjų rykštenių ekstrakto ir vitamino D derinys.

„Urinal Sirupas“ – tinka vaikams nuo 1 metų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-20 % 4^{79€}

GLICINAS, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: glicinas (65 % grynojo kiekio), dekstrozės monohidratas, kukurūzų krakmolas, lipnūna reguliuojanti medžiaga riebiųjų rūgščių magnio druska. Grynasis kiekis: 7,6 g. Vartojimo būdas: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Tablete laikyti po liežuviu, kol šlūs. Rekomenduojame suvartoti per parą kiekįje (3 tabletės) yra 300 mg glicino. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturi vartojamas kaip maisto pakaitalas. Laikymo sąlygos. Laikyti sausoje, tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g. 28, Vilnius. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Žarijų g. 28, Vilnius

NORMALIAI GLIUKOZĖS KONCENTRACIJAI KRAUJYJE PALAIKYTI

-30 % 19^{24€}

MULBERRY™, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Mulberry“ skirtas normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje palaikyti. Jis gaminamas iš standartizuoto baltųjų šilkmedžių lapų ekstrakto ir chromo. Šilkmedžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje.

TIKRAS CUKRAUS PRIEŠAS!

IKI -50 %

ATLANT, 28 pakeliai 55⁹⁹ 33⁵⁹ € -40 %ATLANT MAXIMUS, 28 pakeliai 86⁹⁹ 56⁵⁴ € -35 %ATLANT SIRDIS, 28 pakeliai 26⁹⁹ 17⁵⁴ € -35 %BIOCA+K+MG+ZN SU VIT. D3, 28 pakeliai 14⁹⁹ 8⁶⁹ € -40 %BIOCALCIUM 600 MG FORTE, 30 pakeliai 11⁹⁹ 7⁷⁹ € -35 %BIOKALIS 400 MG, 30 pakeliai 9⁹⁹ 5⁰⁰ € -50 %BIOKALIS FORTE, 30 pakeliai 11⁹⁹ 6⁰⁰ € -50 %

MAISTO PAPILDAS

Rinkis gerą saviąautą kasdien: „Atlant“ ir „Atlant MAXIMUS“ – kompleksai sąnariams su moksliškairodyto poveikio kolagenu (net 12 000 arba 15 000 mg). „Atlant Sirdis“ – kompleksas jūsų širdžiai su didžiausiu polifenolių (resveratrolis, 260 mg, ir likopeno, 15 mg) kiekiu, kofeinentu Q10, mineralais K, Mg, Fe, vitaminu B1, gudobelių, ožerbolio, valstinių valerijonų ir česnakų ekstraktas. „BioCa+K+Mg+Zn su vit. D3“ – mineralų kompleksas nuovargiai mažinti; „BioCalcium 600 mg forte“ papildys jūsų organizmą kalciumu (net 600 mg kalcio citrato su vit. D3) ir padės kaulams, dantims; „BioKalis 400“ ir „BioKalis forte“ papildys jūsų organizmą grynu kalciu. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos! Mineralai išgaunami iš Negryvosios jūros.

* Nustatyta pagal UAB „Softident“ 2024 m. duomenis.

ATRAK TAI, KO REIKIA TAVO SĄNARIAMS, ŠIRDŽIAI IR KAULAMS!



SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SU
LOJALUMO
KORTELE

28⁹⁹ €

SKIEPO KAINA
BE KORTELĖS

31⁹⁹ €

Galima išankstinė registracija:

- internetu www.nvaistine.lt/skiepai
- telefonu **+370 800 10 008**



Nuolaidos taikomos
su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“
nuolaidos netaikomos.

-25%**VIRIDIAN****MAISTO PAPILDAI**

„Viridian“ – tai natūralūs, aukštos kokybės vitaminai ir maisto papildai, sukurti remiantis mokslu, etiška gamyba ir gryna sudėtimi.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-15% **35,69€****LIDONIUM® 700 mg, 42 tabletės****SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS SU UGNIAŽOLE**

Tik mitybai reguliuoti esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, vėžio profilaktikos metu, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę ir esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų spazmams, uždegimams.

IKI -30%**ABENA****HIGIENOS PRIEMONĖS**

Darujos gamintojo ABENA produktai, skirti šlapimo nelaikymui, yra aukščiausios kokybės, atitinkantys skandinaviskus standartus. Produktai itin gerai sugeria ir sugeria skysčius bei „užtrūkina“ nemalonus kvapus su „Odour system“ sistema.

Diskretūs, švelnūs ir orui pralaidūs, todėl tinka net ir jautriausiai odai bei užtikrina komfortą. Pagaminti nenaudojant jokio balinimo ir latekso, pažymėti NORDIC ECO LABEL ženklu, garantuojančiu tvarumą ir ekologiją.

AKTYVIOMIS DIENOMIS IR PATOGIOMS NAKTIMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

AUSŲ SIERAI SUMINKŠTINTI IR IŠVALYTI**-15%** **10,19€****VAXOL** ausų purškalas 10 ml**MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Vaxol“ – tai saugus ir veiksmingas būdas suminkštinti ir natūraliai išvalyti ausų sierą: sušvelnina, drėkina ir natūraliai dalina ausų sierą. Tinka vaikams nuo 1 metų, greitai ir lengvai naudojamas. Sumažina ausies praplovimo būklę. Ypač patinama naudoti užsimanantiems vandens sportu, dažnai naudojančioms ausinukus, klausos aparatus, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms.

AUSŲ PURSKALAS SU ALYVUOGIŲ ALIEJUMI

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.

VAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



-30%

Perkant bent
DVI bet kurias
pakuotes


ODONTE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ODONTE – tai patikimumas ir dėmesys detalėms, užtikrinantis nepriekaištingą burnos priežiūrą kiekvieną dieną.

-35%



VELYM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Velym pH neutro“ – klinikiniais tyrimais patikrintas balinamasis dantų kremas. Kasdienė apsauga. Sudėtyje – natūralios kilmės medžiagos ir 1450 ppm fluoro. Skirtas suaugusiems.

„Velym Mineral 03“ sudėtyje – ozono prisotintas alyvuogių aliejus. Daugiau dėmesio dantenoms. Aukštas apnažų valymo koeficientas (angl. Pellicle Cleaning Ratio, PCR).

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

TOBULAI BURNOS HIGIENAI

-20%



CURAPROX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Curaprox“ – tai aukščiausios kokybės šveicariškos burnos higienos priemonės: platus spektras dantų šepetėlių, tarpdančių šepetėlių, dantų pastų. Taip pat kūdikiams ir vaikams skirtos priemonės. „Curaprox“ dantų šepetėlių šereliai gaminami ne iš nailono, o iš patentuotos „Curon“ medžiagos, todėl šie šepetėliai efektyviai pašalina apnažas, netraumuodami dantenu. Tarpdančių šepetėliai gaminami iš labai plonos, tačiau tvirtos „Cural“ patentuotos medicininės vielutės, todėl tarpdančių išvalysite kruopščiai ir be skausmo. Dantų pastos profilaktikai įvairaus amžiaus grupėms ir antibakterinė „Perio Plus“ linija.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

PRIEMONĖS SLAUGAI

IKI -20%



SENI

SENI sauskelnės ir sauskelnės kelnaitės – orui laidžios, su kvapo kontrolės sistema.

SENI apsauginiai paklotai – tai papildoma apsauga, kuri išsaugo švarią patalynę.

SENI kosmetika odos priežiūrai – nuvalo, neutralizuoja kvapus, maitina ir apsaugo odą nuo dirgiklių.

SENI urologiniai įklotai ypač greitai sugeria, komfortiški ir diskretiški.

*Sauskelnėms negalioja nuolaida su komposuojamų vaistų pasu.

PROFESIONALŲ UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-25%



JORDAN

BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai – nuo pirmo dantuko! Rinkites dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.

„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%



ROYAL DENTA

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Royal Denta“ burnos priežiūros priemonės sukurtos remiantis mokslu ir odontologijos srities atradimais. Aukštas ir sidabru patvirtintų dantų pastų sąvaybės ir jų poveikis patvirtintas nepriklausomoje sertifikuotoje laboratorijoje. Taip pat įrodyta, kad dantų šepetėliuose esantis auksas ir sidabras sunaikina iki 99,9% ant šerelių besikaupiančių bakterijų, todėl šepetėlį galima naudoti ilgiau. Be to, dviejų ilgų šerelių pasiekia sunkiai prieinamas tarpdančių vietas, todėl dantys yra išvalomi geriau. Karta išbandę, klientai ir vėl pasirenka „Royal Denta“. Rekomenduojame odontologai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

DANTŲ PRIEŽIŪRAI, BURNOS HIGIENAI

IKI -30%



TEPE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„TePe“ dantų ir tarpdančių šepetėliai yra kasdienės dantų higienos pagrindas. „TePe“ siūlo didelį dantų ir tarpdančių šepetėlių pasirinkimą kasdieninei dantų priežiūrai ir turintiems specialiuoju poreikiu. „TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, puotojančios arba mažai putojančios. Skirtos kūdikiams nuo pirmo dantuko, vaikų pieniniams dantims, suaugusiems kasdienai ar turintiems sausą burnos gleivinę.

*Akcija taikoma kainų skirtuku pažymėtomis prekėms.

— ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI —

5⁹⁹ €**ACIC 5 % kremas, 2 g****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** odos ir lūpų pūslelinė, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pašalinti odos vėles tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas acikloviro, valacikloviro, propilenglicoliui arba bet kuriam pagalbine medžiagai. **Netolerantumai:** alerginės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vartoti draudžiama nurijus. „Sandoz Pharmaceutical d.d.“ filialas, Upės g. 214, LT-08028 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240536084. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-15.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!

— ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI —

15⁹⁹ €**ACIC, 200 mg, 25 tabletės****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymas suaugusiems žmonėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 tabletę 5 kartus per parą kas 4 val. Gydymo trukmė – 5 paros. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas acikloviro, valacikloviro arba bet kuriai pagalbine medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** piliatus viruso pašalinti vėlia, reikia tuoj pat nusipirkti raišius. „Sandoz Pharmaceutical d.d.“ filialas, Upės g. 214, LT-08028 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037, el. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240536084. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-15.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ IŠ VIDIAUS!

— NUO ODOS SUDIRGINIMO —

6⁹⁹ €**HYDROCORTISON TAKEDA 10 mg/g, gelis, 10 g.****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Sudėtis: 1 g gely yra 10 mg hidrokortizono. **Indikacijos:** trumpalaikis lengvos odos niežulio ir sudirginimo malšinimas, esant nedidelėms odos pažeidimams (pvz., po vabzdžių įgėlimo ar įkandimo). **Dozavimas ir vartojimo būdas:** suaugusiems 1–3 kartus per parą, vyresniems kaip 2 m. vaikams 1–2 kartus per parą ant odos tepi plonu sluoksniu. Vartoti ne ilgiau kaip 7 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai, rožinė, perioralinė dermatitis, paprastieji spuogai, bakterinė, grybelinė arba parazitinė odos infekcija, kai netikamos reikiamas gydymas, įtariamas asilės būgnelio praradimas, vartojimas ant veido, išangės ar lytinių organų sritys arba atvirų žaizdų, jaunesniems nei 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Vartoti tik išorškai, saugoti, kad nepatektų į akis. Gali atsirasti odos atrofija, pažeidimai virusinė, bakterinė ar grybelinė infekcija, sulėtėti žaizdų gijimas, pasireikšti reikiama sutrikimai, ilgalaikis vartojimas ant veido gali sukelti kataraktą ar glaukomą. Jei atsiranda padidėjusio jautrumo simptomų, gydymą reikia nutraukti. Vengti vartojimo po uždarais drabužiais (įskaitant uždaras sauskelnes) ar vietose, kur oda liečiasi su oda. Teksto parengimo data: 2022-04-14 (LT-HYCO-2200001).

NUMALŠINK IR ODOS SUDIRGINIMĄ, IR NIEŽĖJIMĄ!

— BAKTERIJŲ AUGIMĄ STABDANTIS PAVIRŠINIŲ ŽAIZDŲ ANTISEPTIKAS —

NUO 7⁹⁷ €**OCTEZY****OCTEZY, 1 mg/20 mg/g odos purškalas (tirpalas), 50 ml 7⁹⁷ €****OCTEZY, 1 mg/20 mg/g odos purškalas (tirpalas), 100 ml 10⁹⁷ €****NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklosios medžiagos stiprumas: kiekviename tirpalo gramе yra 1 mg okteridino dihidrochlorido ir 20 mg fenoksietanolio. **Terapinės indikacijos:** visų amžiaus grupių pacientų kartotinis trumpalaikis pagalbiniis mažų, paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems žmonėms ir vaikams „Octezy“ vartojamas ant gydomos sritys, kol ji bus visiškai sausai. Pavartojus šį vaistinį preparatą ir prieš imantis kitų priemonių, pvz., uždedant ant žaizdos tvarstį, reikia palaukti mažiausiai 1–2 minutes. „Octezy“ turi būti vartojamas ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 6 m. vaikams vartojimą reikia riboti iki kelių dienų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Octezy“ negalima nurijus, vartoti didesniais kiekiais nei būtina. Siekiant išvengti audinių pažeidimo, reikia būti atsargiems plaunant žaizdą ir užtikrinti, kad vaistinis preparatas nebūtų naudojamas su šlepiu ar sušildžiamais įrankiais. Esant žaizdai su eritemomis, reikia užtikrinti, kad bet kurio metu būtų užtikrintas jo išdžiūvimas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veiklosioms arba bet kuriai pagalbine medžiagai. „Octezy“ draudžiama vartoti pilvo ertmei (t.y. intragastrinei), šlapimo pūslės ar ausies būgneliui plauti. Čia pateiktas sutrumpintas vaistinio preparato aprašas. Išsamia informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt>. Reklamų teksto parengimo data 2025-05.

IKI -30 %

**URGO**

„URGO“ pleistrai – inovatyvūs produktai padės prižiūrėti paviršines žaizdas. Tai patalios, alergijos nesukeliantys bei orui pralaidūs pleistrai, kurių neišori pleistro pagavėlė impregnuota antiseptiniu tirpalu, žaizdeles saugančiu nuo bakterijų.

„URGO Filmogel“ geliai – naujos kartos technologija pažeistiems nagams, pūslelinei, burnos žaizdoms, gelis odos įtrūkims ir purkiamas pleistras mažoms odos įtrūkims.

„URGO“ – PLEISTRŲ EKSPERTAI JAU 60 METŲ. PRIŽIŪROMS ŽAIZDOS GYJA GREIČIAU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40 % 12⁸⁹ €

bioderm

**OLIPROX nagų lakas grybeliui**

(gelis vandens pagrindu), 12 ml

„Oliprox“ nagų lakas (gelis vandens pagrindu) – veiksminga priemonė, padedanti užkirsti kelią grybelinei infekcijai bei pagalbiniu priemonė gystant onichomikozę (nagų grybelį).

7⁹⁷ €**TERBINAFIN-RATIOPHARM 10 mg/g kremas, 15 g.****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 10 mg terbinafino hidroklorido. **Terapinės indikacijos:** odos infekcija, sukelia dermatofitų, tokių kaip *Trichophyton*, *Microsporum canis* ir *Epidermophyton floccosum*; mieliųgrybių, daugiausia *Candida* genties; įvairiaspalvė dedervinė, sukelia *Phytophthora orbiculae* (*Malassezia furfur*). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir paaugliai (>12 m.); pėdos grybelis, blauzdos grybelis ir liemens grybelis: 1 kartą per parą, savaitę; odos kandidozė: 1 kartą per parą, 1–2 savaites; įvairiaspalvė dedervinė: 1–2 kartus per parą, 2 savaites, tepi ant sausos ir švarios odos. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremas turi būti tepamas ant pažeistos ir aplinkinės odos plonu sluoksniu ir tada švelniai įtrinamas. Jei infekcija yra rankelėse (po kirimo, tarpusidėse, sėdmenų rankelėse arba kirknyje), po kremo užtepimo oda galima uždengti steriliu marlės pabaleliu, ypač naktį. Simptomai palengvėja dažniausiai per kelias paras. Nereguliaraus vaisto vartojimas arba ankštyvas nutraukimas padidina simptomų pasikartojimo riziką. Jei per 2 sav. nesiėmimo pagerėjimo, diagnozė turi būti svarstoma iš naujo. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes duomenų apie saugumą nepakanka. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremas yra skirtas tik naudoti išorškai. Vengti patekimo į akis. Gali atsirasti akių dirginimo požymių. Atsiktinai patekus į akis, gerai plaukite jas tekančiu vandeniu. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremą reikia laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje esantis cetozetamolis alkoholis ir cetilo alkoholis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų ir nesukuri vietinį sudirginimą. **Reikiamos teksto parengimo data 2025-01. OTC-LT-00090**



PAVIRŠINIŲ ODOS ŽAIZDŲ GIJIMO GERINIMUI

NUO **5⁹⁹** €



BEPANTHEN

BEPANTHEN 50 mg/g kremas, 30 g **5⁹⁹ €**
BEPANTHEN 50 mg/g tepalas, 30 g **5⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 1 g preparato yra 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbini gydymas, dirginant oda ir skrandžio epidermio dirginimas, padidinti epitelizaciją su atlikamų pūslėgiminių ir niežėjimų mažinimu poveikiu, paryžiuoti, medžiagų pabėgimų (medžiagų nuodingų arba radioaktyvių), odos sudirginimų, šaltimo nuo saulės, skausmingų ir įtrūskimų spėsenų gydymas. **Naudojimo būdas ir dozavimas:** pakasta oda tepi plonu sluoksniu preparato vieną ar du kartus kartą per dieną, kai reikia. Skausmingus ir įtrūskimus spėsenas tepi po kiekvieno maistinio, prieš įdodant ruošiant, tepi kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai oda reikia kuo kruopščiau nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos pobūdžio ir eigos. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data: 2024-10, CH-2024030-71

BEPANTHEN PLUS 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g **6⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalūs įvairių paviršinių žaizdų, pvz., nubrėžimų, įgyvenų, įbrėžimų, odos įtrūskimų, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Naudojimo būdas ir dozavimas:** šiek tiek masu 1 met., vaikams, apsaugantis ir suaugusiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odą vieta reikia tepi plonu kremo sluoksniu vieną arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepi didelius odos plotus. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; glios arba apšviti užkrečtos žaizdos; jei trūksta ausies būgnelio, negalima tepi ausies ertmę. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** sausgyslės, kad kremas nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepi ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsiant nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data: 2024-10, CH-2024030-71

LAIMEI, YRA „BEPANTHEN“ GYDO IR APSAUGO ODA

ŽAIZDŲ GIJIMUI SKATINTI

-20%



HELP4SKIN

HELP4SKIN WOUND HEALING, gelis, 20 g **6⁹⁹ 5⁹⁹ €**
HELP4SKIN WOUND HEALING, gelis, 50 g **12⁹⁹ 10⁹⁸ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Help4Skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai saugoti ir šlapų žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Pagreitina odinių ir lėtinų žaizdų gijimą, pvz.: žaizdų (įskaitant chirurgines), įgyvenų, įbrėžimų, odos nubrėžimų ir įtrūskimų, paviršinių nudegimų (I ir IIa laipsnio). Greitai padeda mažinti skausmą, mažina randų susidarymo riziką, greičiau gijimą, padeda išvengti infekcijos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

PAPRASTA IR EFEKTYVU.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



CLINSKIN® FIBROMA, 1 vnt. **22⁶⁹ €**

MEDICINOS PRIETAISAS

„ClinSkin Fibroma“ – tai savarankiško gydymo priemonė, skirta lengvai, saugiai ir neskausmingai pašalinti fibromas. Ant odos uždėta „ClinSkin Fibroma“ priemonė sustabdo kraujo pritekėjimą į fibromą, ją tarsi „perrišdama“. Taip fibroma palaipsniui bėdižsta saugiai, neskausmingai ir su neįmiamu randų atsiradimo rizika. „ClinSkin Fibroma“ pakuotėje yra aplikatorius ir 3 fibromas šalinimo priemonės, kiekviena jų skirta vienai fibromai pašalinti.

-40%



PROPOLIO-MEDETŲ KREMAS, 40 g **6⁹⁹ 4¹⁹ €**
PROPOLIO ALIEJUS, 15 ml **5⁹⁹ 3⁵⁹ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-40% **17⁹⁹** €



EPITOME Skin Formula, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Komplexas įsų grožiui.
- Didelės aktyviųjų medžiagų dozės 1 kapsulėje:
 - net 250 mg hialurono rūgšties;
 - 5 000 μg biotino;
 - 50 μg seleno;
 - 10 mg cinko;

- 6 mg vitamino E;
- 400 μg vitamino A.
- Sudėtyje esantys:
 - BIOTINAS, CINKAS ir SELENAS padeda palaikyti normalią plaukų būklę;
 - BIOTINAS, CINKAS ir VITAMINAS A padeda palaikyti normalią odos būklę;
 - CINKAS ir SELENAS padeda palaikyti normalią nagų būklę.

-35% **6¹⁷** €



AMBIO ALAUS MIELĖS, 500 mg, 150 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Alaus mielės padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę.

-20%



AMEDIPLUS

vaikiški pleistrai, 6 x 2 cm, 10 vnt. **2⁹⁹ 1⁸³ €**
vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. **1⁹⁹ 1¹⁶ €**
vandeniui atsparūs, permatomi pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. **1⁹⁹ 1³⁵ €**
vandeniui atsparūs, apvalūs pleistrai, 10 vnt. **1⁹⁹ 0⁹⁵ €**
vandeniui atsparūs, karpomas pleistrai, 6 x 100 cm **2⁹⁹ 1⁶⁷ €**
juodas aksominis 7x2 cm, 10 vnt. **1⁹⁹ 1⁴³ €**
su alavijų ekstraktu 7x2 cm, 10 vnt. **1⁹⁹ 1⁴³ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

-20% **2³⁹** €



AMEDIPLUS

pleistrai nuospaudoms, 7 x 2,2 cm, 10 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ



Jai



-40%

EPITOME Woman's Formula, 60 minkštųjų kapsulių 27⁹⁹ 16⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Specialiai moterims sukurtas kompleksas.

• Sudėtyje yra net 21 aktyvioji medžiaga – vitaminai, mineralai, omega-3 riebalų rūgštys ir antioksidantai: 500 mg žuvų taukų, 60 mg palmityleino rūgšties iš šaltalankių aliejaus, 3,5 mg silicio iš dirvinų asiūklų ekstrakto, citrusinių vaisių bioflavonoidų, 10 mg EGCG polifenolų iš žaliosios arbatos ekstrakto, B grupės vitaminai, vitaminai C, D3, E ir tokie mineralai kaip cinkas, geležis, varis ir selenas.

• Sudėtyje naudojamos aktyvios ir aukštą bioprieinamumą turinčios mineralinės druskos: cinko bisglicinatai, geležies fumaratas, L-selenometioninas, vario gliukonatas.

• Aukštos koncentracijos žuvų taukai, kurių 500 mg yra net 300 mg EPR + DHR.

• Natūralus silicio iš asiūklų ekstraktas.

• Patogu vartoti – tik 1 minkštoji kapsulė per dieną.



-40%

MENOPACE, 30 tablečių 28⁹⁹ 12⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS MOTERIMS MENOPAUZĖS PERIODU

„Menopace“ – biologiniai aktyviųjų medžiagų kompleksas su sojų izoflavonais, kurie pagal savo struktūrą ir poveikį panašūs į moters lytinį hormoną estrogeną. Menopauzės laikotarpiui subalansuotas derinys pasižymi kompleksiniu poveikiu: hormonų balansui (vitaminas B1), psichologinei būsenai (foliatas, biotinas, magnis), kaulų funkcijai (cinkas, magnis), nuovargio mažinimui (geležis, pantoteno rūgštis).

„MENOPACE“ – NELEISK MENOPAUZEI TAVĘS SUSTABDYTI!

Intymiai higienai

IKI -30%



VAGISAN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS. Priemonės „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgštis aplinka – būtina sąlyga, kad laktobacilos galėtų pascios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos prausiklis „Vagisan“ tinka kasdieniai intymiajai higienai. Drekinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH pertęti palaikyti ir atkurti.

TAVO INTYMIĄI SVEIKATAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.



NUO 4⁹⁹ €

CANESTEN[®], 10 mg/g kremas, 20 g 4⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 1 g kremo yra 10 mg klotrimazolo. **Terapinės indikacijos:** odos ir šlapiųjų gleivinių infekcija, sukelta kloteriazozinio žiedinio mikroorganizmo, grybelinės. Grindis sukelto vulvulio gydymas. **Varfėjimo būdas ir dozavimas:** vartojamas 2-5 kartus per parą. Užtepti plonu sluoksniu ir švelniai įtrinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas klotrimazolui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gali sumažinti laktosio gamylinį veikimą ir saugumą, jeigu tepama lytinių organų srityje. Poveikis pasireiškia tik gydymo metu, todėl jo metu naudoti alternatyvius apsaugos priemonės. Venkite sąlyčio su akimis. Nėskite kremo į burną ir nemurkite. Prieš vartojimą, gydomą imunosupresantais, chemoterapija, sergantys diabetu, infekciją ŽIV, jaunesnės kaip 16 m. paaugės, nežinios per pirmuosius tris nėštumo mėnesius, prieš vartojimą turi pasikonsultuoti su gydytoju. Vaikams (jaunesniems negu 12 metų) ir senyvesiems pacientams vartoti tik prižiūrint gydytoją. Vengti ilgalaikio gydymo didesniuose odos plotuose. Galima vartoti žindymo metu. Jeigu vartojamas spenelių srityje, prieš maitinant reikia nusiplauti krūtis. Sudėtyje yra cetrilazolo alkoholio ir benzilo alkoholio, kurie gali sukelti vidinių odos bei alerginių reakcijų. **Reikiamas laiko parengimo data 2024-11-11 (14-2024/025-10).**

„CANESTEN“ KREMAS - GRYBELINIS INFЕКЦИJOS GYDYMU!

*1. Pasakyti pagal pardavimus neregistruotą ginekologinių priešgrybelinių preparatų kategorijoje. Remiantis 2023 m. pasauline Nicholas Hall's OFC duomenų baze DB6

CANESTEN[®] 500 mg makšties minkštoji kapsulė 11⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kapsulėje yra 500 mg klotrimazolo. **Terapinės indikacijos:** makšties ir moters šlapiųjų gleivinių infekcija, sukelta kloteriazozinio žiedinio mikroorganizmo, taikų kaip grybelis, gydymas. **Dozavimas ir varfėjimo būdas:** suaugusios moters ir pauglės nuo 16 m. 1 kapsulė įdedama kiek įmanoma giliai į makštį, naudojant pakeltoje esantį aplikatorių, giliausia galimi, vakare prieš miegą. Nėštumo metu kapsulė turi būti įdedama prieš, de apskritais, šiekėlėse greičiau konsultacija su simptomais nepasirodžius per 7 dienas. Jaunesnės kaip 16 m. pauglės galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Saugumas ir veikimumas jaunesnės kaip 12 m. mergaitėms neįrodyti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas klotrimazolui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** reikia kreipis į gydytoją, jeigu makšties infekcija pasireiškia pirmą kartą, pirmo nėštumo trimestro metu; per pastaruosius šešis mėnesius infekcija pasikartojo daugiau nei du kartus; yra karščiavimas (≥ 38 °C); skauda apatinę pilvo dalį, nuėmę atrodant nemalonus kvapas išaugų 6 makšties; pilkai kraujo iš makšties ir (arba) tuo pat metu jurtamas pečių skausmas. Nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Vartojant vaistą negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų, nerekomenduojama vengti lytinių santykių. Labai retos kontraindikacijos priemonių veikimui ir patikimumui gali sumažinti. **Reikiamas laiko parengimo data 2024-11-11 (14-2024/025-10).**

„CANESTEN“ MAKŠTIES MINKŠTOJI KAPSULĖ - 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINIS INFЕКЦИJOS GYDYMAS!



-30%

INTIMOHELP

MEDICINOS PRIEMONĖS

Makšties tabletės „IntimoHELP“ atkuria ir palaiko fiziologinį makšties pH, slopina bakterijų plitimą. Priemonės sudėtyje esantis inulinas skatina natūralios bakterinės floros augimą, sugeria paugausius išskyras, naikina blogą kvapą. Sudėtyje yra inulino, hialurono rūgšties ir vitamino E. Naudojimo instrukcija: naudokite po 1 makšties tabletę vieną kartą per parą.

Intymios higienos emulsija „IntimoHELP“ su nolių vandeniu ir hialuronu rūgštimi padeda atkurti natūralią makšties pH. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų. Rūgštį vanduo veikia antiseptikai ir ramina. Nedidelį kiekį emulsijos užtepti ant rankos, nuplauti intymias vietas, pasukti ruskalutai šiltu vandeniu.

Dregnos intymios higienos servetėlės „IntimoHELP“ su alavijų lapų ekstraktu ir D-pantenoliu švelniai valo ir nedirgina odos, užtikrina optimalią higieną bei kokioms aplinkybėms.

„INTIMOHELP“ – MOTERS INTYMIOS SVEIKATOS RECEPTAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Intymiai higienai

IKI -50%



LACTACYD

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Lactacyd“ – intymios higienos prausikliai, skirti kasdieniai intymijų zonų priežiūrai. Paprasta naudoti vonioje ar duše. Nuo pirmųjų mėnesinių iki menopauzės „Lactacyd“ siūlo visą asortimentą intymios higienos prausiklių, kad kiekviena diena būtų mėtų žvali ir įausmėtės patogiai.

„Lactacyd“ gaminiai turi tinkamą pH ir palaiko natūralų makšties rūgštingumą. Jie yra švelnūs, be muilo ir tinkami naudoti kasdien. Produktai yra su natūralia pieno rūgštimi. Natūrali pieno rūgštis skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi įsų intymiose vietose ir padeda išsaugoti natūralų makšties floros rūgštingumą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

Makšties mikrofloros atstatymui

1+1



Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

ECOCILLIN, 6 makšties kapsulės 14⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

EcoCillin makšties kapsulės skirtos vaginotės, vaginito ir jų pasikartojantiems simptomams (deginimas, niežulys, nemalonus kvapo išsiskyrimas iš makšties) mašinai. Sudėtyje yra Lactobacillus plantarum P17630 gerųjų bakterijų. Greitai atstatoma makšties mikrofloros balansas po antibiotikų, kontraceptikų vartojimo bei efektyviai apsaugo nuo makšties infekcijų. Įdėti 1 kapsulę į makštį prieš miegą. Naudoti 6 dienas iš eilės arba kaip pataria gydytojas. Komforto jausmas jau pirmą dieną!

ECOCILLIN ORAL, 15 geriamųjų kapsulių 15⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

5 milijardai gyvų laktobakterijų (Lactobacillus plantarum P17630, Lactobacillus paracasei 11688, Lactobacillus salivarius 1794). Vartoti po 1 kapsulę per dieną. Kapsulė nurijū užsigeriant vandeniu.

Skubios pagalbos kontraceptikas



13⁹⁷ €

AVODELE 1,5 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Avodele yra skubios pagalbos kontraceptikas, kurį galima pavartoti per 72 valandas (1. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudojta kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele sudėtyje yra sintetinio hormono, vadinamo levonorgestrelu. Suvartojus per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto, jis 75 % atvejų apsaugo nuo nėštumo. Vartojimas šiais atvejais: – lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė.

– jei kontraceptinė priemonė naudota netinkamai.

Kaip vartoti Avodele? Iš pradžių vartokite 1 vaistą iškart po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudojta kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele vartokite 12 val. (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgerimo. Jei žinoate arba manote, jog nesate nėščia, Avodele galite vartoti bet kurio ciklo dieną. Tablete turite nekramtyti, užgerti vandeniu. Į kas tuo veiksmingumą, kas greičiau ją išgeriate. Avodele vartoti negalima, jeigu yra alergija levonorgestrelui arba bet kuriai pagalbinei jo vaisto medžiagai (jei išsivystė informacinio lapelio 4 skyriaus). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartojimą, pasitarkite su gydytoju, nes Avodele, kaip skubios kontracepcijos priemonė, jums gali netikti. Gydytojas gali jums skirti kitokią skubios kontracepcijos priemonę, kaip dažnai galima vartoti Avodele. Avodele vartinti tik nedidelio laiko atveju ir nėra reguliarios kontracepcijos metodas. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visoms žmonėms. Labai dažnas. Šiekštulys (gykimas). Gali būti nereguliaraus pakraujavimo, iki pradedant mėnesinėmis. Gali skaudėti pilvo apačią. Nuovargis. Galvos skausmas. Dažni vėmimas. Gali pakeisti mėnesinių ciklą. Riešius šio vaisto, gali atsirasti kitų jautrumas, viduriavimas, svajaliojimas. Labai retai. Berimės, dirglumas, niežulys, vėdopatinis, dilgėlis, odos raudonis, skausmas, skausmingos mėnesinės. Prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju, jeigu turite kitokių vaistų, kurie gali sukelti šalutinį poveikį. Ši informacija pasakojini karta peržiūrėta 2023-09-01.



-40%

URIAGE EAU THERMALE RICH, drėkinamasis kremas, 40 ml **24⁹⁹ 13⁹⁹ €**
KOSMETIKOS PRIEMONĖ
 Sausai ir labai sausai, drėgnės stokojančiai odai. Intensyviai drėkina, maitina veido odą, suteikia jai švytėjimo. Puikus makiažo pagrindas.



IKI -40%

URIAGE ROSELIANE priemonių linija
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
 Rausančiai odai „Uriage Roseliane“ linijos priemonės specialiai sukurtos rausančiai odai prižiūrėti: ramina, drėkina itin jautrią odą, padeda maitinti odos tempimo, kaitimo pojūčius. „Roseliane“ kremas su SPF specialiai sukurti siekiant apsaugoti jautrią, rausiančią odą nuo saulės.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-35%

EPITOME Beauty Marine Collagen, 30 pakelių **49⁹⁹ 32⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

- Didelės aktyviųjų medžiagų dozės 1 pakeityje:
- 12 200 mg I tipo kolageno, išgaunamo iš žuvų;
- 50 mg hialurono rūgšties;
- 5 000 µg biotino;
- 136 mg natūralaus vitamino C iš kraštuotųjų malpigiųjų vaisių sulčių;
- Sudėtyje esantis biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę.
- Braškių ir rabarbarų skonio tirpus miltelių malonų ir patogų vartoti.
- Be cukraus, su natūralių stevijų saldikliu.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė - NEMOKAMAI!



BIOCELL

MAISTO PAPILDAS

Naujiena! BIOCELL funkciniai guminukai

„BIOCELL Strong Hair“ – stipriems plaukams: vitaminų ir mineralų kompleksas, kuris puoselėja Tavo plaukus.

„BIOCELL Hyaluron Complex“ – odos grožis: hialurono rūgšties kompleksas Tavo švytinčiai odai.

„BIOCELL Young Skin“ – odos jaunatviškumui: galingas antioksidantų rinkinys, saugantis odą nuo žalingo aplinkos poveikio

„BIOCELL“ puoselėja gamtos sukurtą grožį ir sąmoningą gyvenimo būdą, vertina natūralumo estetiką ir skatina moterį pamilti save tokią, kokia ji yra – tobula. Neturintis analogų geriamieji „BioCell“ grožio eliksyras „shots“ ir grožio kapsulės efektyviai maitina odą ir puoselėja plaukų bei nagų grožį iš vidaus.

„BIOCELL“ – TOBULA ESI TU.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

GROŽVITA

-30%

GROŽVITA

MAISTO PAPILDAS ODAI, NAGAMS, PLAUKAMS

GROŽVITA, 80 kapsulių **7⁹⁹ 5⁹⁹ €**

GROŽVITA COLLAGEN, 42 tabletės **13⁹⁹ 9⁹⁹ €**

GROŽVITA PLUS, 42 tabletės **11⁹⁹ 8¹¹ €**

GROŽVITA PRO

Kosmetika nuo plaukų slinkimo

GROŽVITA PRO šampūnas, 200 ml **12⁹⁹ 9⁹⁹ €**

GROŽVITA PRO serumas, 125 ml **14⁹⁹ 10¹⁴ €**

GROŽVITA PRO plaukų kaukė nuo plaukų slinkimo, 200 ml **19⁹⁹ 13⁹⁹ €**

GROŽVITA – tai vienas kitą papildantis produktai, bet galima naudoti ir atskirai pagal poreikį. Geriausią efektą pasieksite šampūną naudodami kartu su serumu nuo plaukų slinkimo, papilddami plaukus tos pačios linijos plaukų kauke ir sustiprinsite priežiūros poveikį gerdami maisto papildus Grožvita.

BŪK GRAŽI SU „GROŽVITA“!



IKI -30%

CUMLAUDE LAB

GINEKOLOGINĖS KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Ispanijos ginekologų sukurti intymios higienos produktai, iš kurių kiekviena moteris išsirink sau tinkanti – nuo kasdieni higienai skirtų prausiklių iki priemonių lytinių organų nemaloniems simptomams ir uždegimams maitinti bei ju išvengti.

Atsakingi intymios higienos ritualai su „Cumlaude Lab“!

„CUMLAUDE LAB“ – NAUJAS POŽIŪRIS Į MOTERS LYTINĘ SVEIKATĄ

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Makšties NIEŽĖJIMAS? DEGINIMO JAUSMAS makštyje?
 BALTOS BEKVAPĖS makšties IŠSKYROS?
 Tai – makšties kandidozės (pienligės) simptomai
TINKAMAS VAISTAS MAKŠTIES KANDIDOZEI GYDYTI
LOMEXIN®
 Fentikonazolo nitratas
 LOMEXIN 200 mg makšties minkštosios kapsulės N3
 LOMEXIN 600 mg makšties minkštosios kapsulės N1
 Nereceptiniai vaistai

LOMEXIN kapsulėje yra 200 mg arba 600 mg fentikonazolo nitrato. Skirtas šoninių lyties organų ir makšties kandidozės lokaliui gydymui. LOMEXIN vartoti (makšties, tris paras iš eilės po vieną 200 mg makšties kapsulę arba vieną kartą vartojama viena 600 mg makšties kapsulė (prieš miegą). LOMEXIN nevartojamas vaikams ir paaugimui iki 16 metų gydyti. Vartoti draudžiama jei yra padidėjęs jautrumas veikliai, pagalbinė medžiagai arba alergija žemės riešutams ar sojų. Kreipkitės į gydytoją ar vaistininką, jeigu esate nėščia ar maitinate krūtimi, simptomai nepagerėja per vieną savaitę ar pasikartoja daugiau nei du kartus per pastaruosius 6 mėnesius, Jūs ar Jūsų partneris kada nors sirgote lytiniu plintančiomis ligomis. Jums daugiau nei 60 metų, yra nustatytas jautrumas imidazolams ar kitiems priešgrybeliniams vaistams, pasireiškia nenormalus ar nereguliarius kraujavimus iš makšties, kraujingos makšties išskyros, vulvos ar makšties žaizdos, opos arba pūslelės, apatinės pilvo dalies skausmas arba sutrikęs šlapinimasis, nepageidaujamas poveikis, toks kaip paraudimas, niežėjimas ar išbėrimas, svėjis su gydimu. Vartoti nerekomenduojama, jeigu naudojate „barjerinį“ kontracepcijos metodą, pagamintą iš latekso, spermicidus, makšties ploviklius ar kitus makšties produktus. Reklamos teksto parengimo data – 2025-02

RECORDATI



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

BELLA HERBS

HIGIENINIŲ PAKETŲ, BLOKŲ

Moterų higienos priemonės, praturtintos liepų žiedų ir alavijų ekstraktu. Paviršius – su medvilnės pluoštu. Neutralizuoja intymią kvapą ir užtikrina komfortą naudojant.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



MAŽYLIUI IR MAMAI



-40%

AMBIO KIDS

MULTIVITAMINAI VAIKAMS, 50 guminukų **13⁴⁰ 8⁰⁰ €**
MAISTO PAPILDAS



-35%

AMBIO KIDS

VITAMINAS D3 400 TV, 30 kratomųjų tablečių **7³⁵ 5¹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS



-40%

AMBIO KIDS

VITAMINAS C, geriamieji lašai, 30 ml **3⁴⁰ 1⁹⁷ €**
MAISTO PAPILDAS



-35%

AMBIO KIDS

LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS, geriamieji lašai, 10 ml **12³⁵ 8⁴⁴ €**
MAISTO PAPILDAS



Karščiavimui mažinti ir skausmui malšinti

IBUSTAR

IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **4⁵⁰ €**
IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **7⁷⁵ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienam geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40 mg ibuprofeno. „Ibustar“ yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), turintis karščiavimą mažinančių savybių „Ibustar“ vartojamas kaip trumpalaikis simptominių gydymo priemonė: silpna ar vidutinio stiprumo skausmai, karščiavimai malšinti. „Ibustar 20 mg/ml“ geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems 5–25 kg (amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). „Ibustar 40 mg/ml“ geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems 10 kg ir daugiau (7 metų ir vyresniems), poaugaliams ir suaugusiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu 50 vartimo preparato vaikams ir poaugaliams reikia vartoti ilgiau kaip 5 dienas arba jeigu ilgai poymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą būtinai skaitykite „Ibustar“ vartoti negalime: jeigu yra alergija ibuprofenu arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praėjusio buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės patinimas, angiodedema ar odos reakcija po acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių uždegimų malšinamųjų vaistų vartojimo; jeigu yra netiesių kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, suviesus su ankstesniu VNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praėjusio skrandžio arba dvylikapetės žarnos opa arba kraujavimas; smegenų arba kitos kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netiesių daug skystų; jeigu yra padidėjęs nežinomo kilmės traukuliai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: padidėję su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Ibustar“. Šalutinis poveikis gali sumažinti vartojant mažesnių veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką, būtiną simptomų kontrolei. „Ibustar“ reikia vengti vartoti kartu su kitais VNU, skaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu kokių nors atsparių skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, odos reakcija, „Ibustar“ vartojimą. Nėdėdama informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pasitarkite bet kurį alerginės reakcijos (į vaisto poymį ar sunkių odos reakcijų simptomų, nedelsdami nutraukite „Ibustar“ vartojimą ir imklojęs (gydytojas arba greitosios medicinos pagalbos tarnyba „Ibustar“ gali sukelti tokius infekcijos simptomus, kaip karščiavimas ir skausmas. Tokių „Ibustar“ gali vėlėti trūkumą infekcijos gydymą, todėl gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą ilgą laiką infekcinę ligą ir simptomai išleko arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėliarūpas reikia vengti vartoti „Ibustar“. LT_01_2024_VI_pirnt UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 7947, LT@berlin-chemie.com Reklaminių tekstų paruošimo data 2024-08.

GREIT IR VĖL KARALIS!



Kūdiklių odos apsauga

-20%

RELIZEMA™

RELIZEMA™ BABY CARE, kremas, 100 ml **16³⁵ 13⁵⁹ €**
RELIZEMA™ SPRAY & GO – ZINC + PANTHENOL purškalas, 100 ml **18³⁵ 15¹⁹ €**

KOSMETINIS PRIEMONĖS

„Relizema“ baby care“ ir „Relizema“ spray & go – zinc + panthenol“ yra produktai, skirti jautriai ir švelniai kūdikių ir vyresnio amžiaus žmonių odai. Cinkas ir panthenolis – vienos formulėje! Puikiai tinka odai raminti ir saugoti nuo paraudimo ir deginimo pojūčių, ypač sauskelnių srityje, ant odos sudaro apsauginę plėvelę, saugančią nuo išorinių dirgiklių. Klinikiniais tyrimaisrodytas veiksmingumas. Patikrinta dermatologų. Rekomenduojama tėvų. „Relizema“ spray & go – zinc + panthenol“ purškalas – be dulkių, skirtas konkrečioms, sunkiau pasiekiamoms odos sritims, galima purkšti tiesiai ant pažeistos vietos, nereikia įtrinti – daugiau higienos ir patogumo. „Relizema“ priemonės rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes arba tada, kai reikia. Reklamų teksto paruošimo data 2024-10. LT_Riz_22_2024_VI_pharma UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. VEIKSMINGA, TYRIMAIS PAGRĮSTA APSAUGA SAUSKELNIŲ SRITIES ODA!

Pasiūlymai galioja **2025 06 01 – 2025 06 30**.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojiui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvtu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvtu.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. +370 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 29 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminių tekstų parengimo data – 2025 05 14.



AMBIO[®]

Vaistininų atrinkti
maisto papildai
geresnei tavo versijai



Maisto papildai



LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais
8-9 val. ir 14-15 val.*

Sekmadieniais
14-15 val.*



-30%

Perkant 3**
ir daugiau
prekių

-25%

Perkant
2* prekes

-20%

Perkant
1 prekę

**nereceptiniams vaistams -25%
receptiniams vaistams -20%

* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemonė ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniais vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. 8 800 10008.

N VAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS