MANO vaistinė

GEGUŽĖ 2025

Kokybė | Patirtis | Specialiai Jums gaminami vaistai | Sutaupytas laikas | Profesionalumas

Šį mėnesį žurnale rasite

1850 SPECIALIAI JUMS

paruoštus naudingus pasiūlymus

MANO vaistinė

TOP PASIŪLYMAI

05-01 – 05-31

3,07 €

NEOCITRAMONAS 240 mg/200 mg/30 mg tabletės N20

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas trumpalaikio lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstrua-cinio skausmo malšinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia vartoti nekramtant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml vandens kiekiu. Priklausomai nuo ligos sunkumo vartoti po 1 tabletę 1–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė - 4 tabletės. Negalima vaisto vartoti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinamojo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, Endymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki aukšto kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurgine operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, pakinta šlapimo kiekis, pasireiškia patrinkimų ar skausmas juosmens srityje, pagėlsta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda benzros silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti širdutę, dažną širdies plakimą, viduriuvimą, susijaudi-nimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. Reklamos teksto parengimo data: 2023-04-27

4,78 €

Niežėjimui ir skausmui malšinti PSILO-BALSAM

PSILO-BALSAM, 1 % gelis, 20 g

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 10 mg difenhidramino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalaus povekio vaistas nuo alergijos. Niežėjimo ir skausmo malšinimui, esant pirmojo laipsnio terminiam nudegimui ir nudegimui saulės spindulais; vabzdžių įgėlimams ar įkandimams, dilgėlinei ar kitokiems nedidesniems odos pažeidimams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams PSILO-BALSAM reikia tepti plonu sluoksniu pažeistas odos vietas ir švelniai įtrinti nuo 3 iki 6 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija difenhidraminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti ant atvirų žaizdų ar gleivinių. Vengti patekimo į akis. Jei patepus gelio ėmė perštėti odą arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-15. Reklamos teksto parengimo data 2022 gegužės mėn. 2205_SB_Psilo-balsam_V01_LT

1,54 €

Širdžiai ir kraujagyslems

ŠIRDIES DARBĄ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

Į ŠIRDĮ IMKITE TIK GERUS DALYKUS.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, gudobelių vaisių tinktūra, sukatžolių tinktūra. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. Iš pradžių 3 arba 4 dienas reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jauniesiems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ligoje kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda dunantis skausmas arba labai sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 5,4 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-27.

nuo 4,53 € iki 18,67 €

Nuo skausmo ir uždegimo VOLTAREN EMULGEL

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gelis
VOLTAREN EMULGEL 23,2 mg/g gelis

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Diklofenako dietilaminas. **Indikacijos.** Suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (savaigystės, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pvz., patempimas, sumušimas); minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiesiems (18 m. ir vyresniems): sąnarų (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. 11,6 mg/g gelis: tepti 3-4 k./parą. 23,2 mg gelis: tepti 2 k./parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepti ant pažeistos odos, atvirosžaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų; burnos, saugoti, kad nepatektų akis, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepralaidžiančiais tranšėjais. 11,6 mg/g gelio sudėtyje yra propilenglikolio ir benzilbenzoato, 23,2 mg/g gelio sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį pranešk ite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujamas@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt. **Tekste parengimo data 2025/03.** Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jems licenciją. ©2023 HALEON arba licencijos turėtojas.

SVEIKATAI

MANO vaistinė

8[26] €



Acetilsalicilo rūgštis SANITAS 500 mg tabletės N100

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 500 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** Acetilsalicilo rūgštis SANITAS trumpai vartojama lengvam ir vidutinio stiprumo skausmui (pvz., galvos, dantų, gerklės, raumenų, sąnarių, mėnesinių, nugaros) ir uždegimui malšinti bei karščiavimui mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ne dažniau kaip 3–4 kartus per parą po 1–2 tabletes. Didžiausia leistina paros dozė yra 8 tabletės. Tabletes rekomenduojama gerti valgant arba po valgio, užgeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** alergija acetilsalicilo rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; buvusi astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo; pacientas jaunesnis negu 12 metų; paskutiniai trys nėštumo mėnesiai; žindymo laikotarpis; yra ar buvo skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa; kraujavimas, hemofilija ar kitoks kraujo krešėjimo sutrikimas; vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė; sunki kepenų, inkstų ar širdies liga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, sąnarių ir jungiamojo audinio sutrikimais, kraujodaros sistemos ligomis, sutrikusi skydliaukės veikla, yra virškinimo trakto sutrikimų, sutrikus inkstų, kepenų ar širdies veiklai, padidėjęs jautrumas kitiems vaistams nuo uždegimo. Prieš operaciją (įskaitant dantų) chirurgui bei anesteziologui būtina pasakyti apie acetilsalicilo rūgšties vartojimą. Acetilsalicilo rūgštis karščiuojantiems vaikams ir paaugliams, ypač jaunesniems negu 16 metų ir sergantiems virusinėmis ligomis, gali sukelti kepenų bei smegenų pažeidimą (Reye sindromą). Jei karščiuojančiam vaikui prasideda nuolatinis vėmimas (tai gali būti Reye sindromo požymis), būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024.11.11

nuo 4[55] € iki 7[03] €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti

GRIPEX 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių
GRIPEX 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės
GRIPEX 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių
GRIPEX 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

„GRIPEX". VEIKIU.

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Vienoje „Gripex" tabletėje yra: 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 10 mg dekstrometorfano hidrobromido. Vienoje „Gripex 500/30/15 mg" tabletėje yra: 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. **Indikacijos:** peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Gripex" tabletės: suaugusiems pacientams ir vyresniems negu 12 m. vaikams įprastinė dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. „Gripex 500/30/15 mg" tabletės: suaugusiesiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tablečių. **Kontraindikacijos:** šių vaistų negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroninis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaitės baigus juos vartoti. „Gripex" tablečių negalima vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. „Gripex 500/30/15 mg" tablečių negalima vartoti vaikams. **Specialūs įspėjimai:** esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data 2024.04.02.

3[81] €

EMOX 100 mg/g gelis, 55 g

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 100 mg naprokseno. **Terapinės indikacijos:** lokaliam minkštųjų audinių traumos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** dozė priklauso nuo pažeistos srities ploto, dažniausiai pakanka 4 cm gelio juostelės. Švarią ir sausą odą virš skaudamos vietos 2-6 kartus per dieną reikia tolygiai patepti geliu ir švelniai įtrinti. Pavartojus preparato reikia kruopščiai nusiplauti rankas. Vaikams šio vaisto vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas naproksenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo, salicilatams; jei yra žinoma, kad acetilsalicilo rūgštis arba kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo buvo sukėlę astmos priepuolį, dilgėlinę arba ūminį nosies gleivinės uždegimą; prasidėję paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gelis turi būti vartojamas tik ant nepažeistos odos. Jei vaistinio preparato patenka į akis ar ant gleivinių, reikia gausiai plauti vandeniu, kad gelis būtų pašalintas. EMOX negalima nuryti. Jei pasireiškė alerginė reakcija, reikia nutraukti gydymą ir kreiptis į gydytoją. Kai EMOX ilgą laiką tepamas didelis odos plotas, gali pasireikšti sisteminis nepageidaujamas poveikis. EMOX gelio negalima vartoti po sandarinamuoju tvarsčiu. Gydymo metu ir 2 savaites po gydymo reikia vengti tiesioginių saulės spindulių, įskaitant soliariumą. Šis vaistas turėtų būti vartojamas atsargiai pacientams, sergantiems kepenų ir inkstų nepakankamumu, virškinamojo trakto išopėjimu ar linkusiems kraujuoti.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-11-12

nuo 4[10] € iki 8[53] €

ALIFLUSIN 500mg/200mg/4mg šnypščiosios granulės N10
ALIFLUSIN 500mg/200mg/4mg šnypščiosios granulės N20
ALIFLUSIN 500mg/200mg/4mg šnypščiosios tabletės N10
ALIFLUSIN 500mg/200mg/4mg šnypščiosios tabletės N20

Paracetamolis / askorbo rūgštis / chlorfenamino maleatas

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Aliflusin sudėtyje yra 3 veikliosios medžiagos: paracetamolis, pasižymintis skausmą malšinančiu ir karščiavimą mažinančiu poveikiu, chlorfenamino maleatas, kuris mažina išskyrų iš nosies, slopina čiaudėjimo refleksą ir akių ašarojimą, bei askorbo rūgštis, papildanti vitamino C trūkumą organizme. Vaistas skirtas trumpalaikiam gripo, peršalimo ir į gripą panašios būklės simptomų, tokių kaip galvos skausmas, karščiavimas, ryklės (gerklės) skausmas, ypač lydimas slogos gydymui. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais peršalimui ir gripui gydyti. **Vartojimas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 15 metų paaugliams:** Rekomenduojama vienkartinė dozė yra vienas paketėlis šnypščiųjų granulių, arba šnypščiųjų tablečių (500 mg paracetamolio, 200 mg askorbo rūgšties ir 4 mg chlorfenamino maleato) iki 3 kartų per parą pagal poreikį, tarp dozių išlaikant bent 4 valandų tarpą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 3 šnypščiųjų granulių paketėlių, arba šnypščiųjų tablečių (1 500 mg paracetamolio, 600 mg askorbo rūgšties ir 12 mg chlorfenamino maleato) per 24 valandas. Vartoti per burną. Šnypščiąsias granules, arba šnypščiąsias tabletes reikia ištirpinti stiklinėje šilto vandens. Išgerti iškart po paruošimo. Reklamos teksto parengimo datos 2022.10.12

4[02] €

Vaistinis preparatas nosies gleivinės paburkimui mažinti

RHINO-STAS, nosies purškalas 10 ml

1mg/ml. Ksilometazolino hidrochloridas.

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** Rhino-stas yra simpatikomimetikas. Purškalas siaurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 metų vaikams bei paaugliams, reikia purkšti po 1 įšpurškimą Rhino-stas tirpalo į kiekvieną nosies landą 1-3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jei yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems per nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Rhino-stas galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartojo ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždaro kampo glaukoma, sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija), sergant feochromocitoma (antinksčių naviku), sergant porfirija, sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertireoze, cukriniu diabetu).

4[60] €

Skausmui malšinti

DICUNO 25 mg, 10 tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 25 mg diklofenako kalio druskos. **Indikacijos:** „Dicuno" vartojamas ūminio lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo, įskaitant ūminius migreninius galvos skausmus, simptomams gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų asmenims reikia gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas. Vartoti ne daugiau kaip 6 tablečių (150 mg) per parą. Tabletę reikia nuryti užgeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** „Dicuno 25 mg" nevartoti, jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors buvo ar yra skrandžio arba žarnyno opa; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakiurimas dėl skausmą mažinančių vaistų vartojimo (NVNU); jeigu yra labai sutrikusi kepenų funkcija; jeigu sergate porfirija (medžiagų apykaitos liga); jeigu sergate sunkia inkstų liga; jeigu Jums nustatyta širdies liga ir (arba) galvos smegenų kraujagyslių liga, pavyzdžiui, jeigu Jūs patyrėte širdies smūgį, insultą, „mikroinsultą" (praeinantį smegenų išemijos priepuolį) arba Jums buvo užsikimšusios širdies ar galvos smegenų kraujagyslės, arba Jums buvo atlikta operacija siekiant išvalyti arba šuntuoti užsikimšusias kraujagysles; jeigu Jums yra arba anksčiau buvo sutrikusi kraujotaka (periferinių arterijų liga); jei pacientas yra jaunesnis kaip 18 metų vaikas ar paauglys; per paskutinius tris nėštumo mėnesius; jeigu vaistai nuo skausmo, kurių sudėtyje yra acetilsalicilo rūgšties, arba kiti NVNU grupės (nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo) vaistai nuo skausmo / uždegimo anksčiau buvo sukėlę alerginę reakciją, tokią kaip astmos priepuolis, čiaudulys ar bėrimas. Nėščiosioms draudžiama vartoti Dicuno per paskutinius tris nėštumo mėnesius. Kitu nėštumo laikotarpiu Dicuno galima vartoti tik tuo atveju, jei paskyrė gydytojas. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės:** prieš pradėdami gydymą pasitarkite su gydytoju, jei sergate ar sirgote bet kuria iš toliau išvardintų ligų: uždegimine žarnų liga (opiniu kolitu, Krono (Crohn) liga); astma, širdies liga, kepenų ar inkstų liga, lėtine obstrukcine plaučių liga arba lėtinis kvėpavimo takų uždegimas, nosies gleivinės uždegimas, sisteminė raudonoji vilkligė, dilgėlinė arba angioneurozinė edema; ligos, sukeliančios padidėjusį polinkį kraujuoti; kepenų porfirija. Atidžiai perskaitykite informacinį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama jums svarbi informacija. Teksto parengimo data 2023.09.20.

5[15] €

SEPTANAZAL suaugusiems 1 mg/50 mg/ml nosies purškalas, 10 ml
SEPTANAZAL vaikams 0,5 mg+50 mg/ml nosies purškalas, 10 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

ATKEMŠA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSĖJUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ

Septanazal nuo 6 metų amžiaus vartojamas:

- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. Septanazal suaugusiesiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. Reklamos teksto parengimo data 2024.02.06.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

nuo 7,22 € iki 10,38 €

STREPSILS HONEY & LEMON 1,2 mg/0,6 mg kietosios pastilės
STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS 1,2 mg/0,6 mg/8 mg kietosios pastilės
STREPSILS VITAMIN C 1,2 mg/0,6 mg/100 mg kietosios pastilės

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties (Strepsils Vitamin C) ir 8 mg levomentolio (Strepsils Menthol&Eucalyptus). **Terapinės indikacijos.** Lokalus simptominis ryklės uždegimo gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Strepsils Honey & Lemon, Strepsils Vitamin C: suaugusiesiems ir vyresniems nei 6 metų amžiaus vaikams bei paaugliams: 1 kietoji pastilė kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. Strepsils Menthol&Eucalyptus: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus vaikams bei paaugliams: 1 kietoji pastilė kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. Vartoti į burną ir ryklę. Kietąją pastilę leisti lėtai ištirpti burnoje. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai. Jaunesniems nei 12 metų vaikams (Strepsils Menthol&Eucalyptus). Jaunesniems nei 6 metų vaikams (Strepsils Honey & Lemon ir Strepsils Vitamin C). **Specialūs įspėjimai.** Dėl užspringimo pavojaus šių vaistinių preparatų nerekomenduojama vartoti mažiems vaikams. Vaistų kiekvienoje kietojoje pastilėje yra gliukozės. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistų kiekvienoje kietojoje pastilėje yra sacharozės. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Strepsils Vitamin C sudėtyje yra azodažiklių – Ponso 4R (E124) ir saulėlydžio geltonojo (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Jeigu pacientas yra alergiškas (alergiška) kviečiams (ši liga skiriasi nuo celiakijos), tuomet šių vaistų vartoti negalima. Strepsils Vitamin C ir Strepsils Honey & Lemon kvapiosios medžiagos sudėtyje yra citralio, citronelolio (Strepsils Vitamin C sudėtyje), d-limoneno, geraniolio ir linalolio. Citralis, citronelolis, d-limonenas, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų. Strepsils Menthol & Eucalyptus kvapiosios medžiagos sudėtyje yra d-limoneno. D-limonenas gali sukelti alerginių reakcijų. Šių vaistų sudėtyje yra sieros dioksido (E220). Retais atvejais gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą. Reklamos tekstas parengtas 2025-02-05.

4,56 € / 7,65 €

Karščiavimo mažinimui ir skausmo malšinimui

IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams 100 ml
IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams 100 ml

Nereceptinis vaistas

GREIT IR VĖL KARALIUS!

Nereceptinis vaistas. Ibustar 20 mg/ml, 40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams. Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40 mg ibuprofeno. Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis. Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, karščiavimo. Ibustar 20 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiesiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką suplakite. Ibustar vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praeityje buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės pabrinkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų vartojimo; jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; neteko daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikui atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite Ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Ibustar gali slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėlinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgdami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti Ibustar.
LT_Ibu_01_2024_V1_print. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com. Reklama paruošta **2024 m. rugpjūčio mėn. Greit ir vėl karalius!**

4,84 €

RESPIFORTIN 600 MG ŠNYPŠČIOSIOS TABLETĖS N10

Nereceptinis vaistas

RESPIFORTIN – KVĖPAVIMO TAKŲ GLEIVIŲ SKYSTINIMUI.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 šnypščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino. **Indikacijos:** trumpalaikiam gleivių skystinimui sergant ūminėmis kvėpavimo takų ligomis (peršalimu), susijusiomis su padidėjusiu tirštų ir klampių gleivių išsiskyrimu. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Šnypščiąją tabletę reikia ištirpinti ½ stiklinės vandens ir nedelsiant išgerti. Dėl galimo susikysčiusių gleivių susikaupimo bronchuose, reikia vartoti likus bent 4 valandoms iki miego. Gydymo metu rekomenduojama vartoti daug skysčių. **Kontraindikacijos:** negalima vartoti padidėjus jautrumui veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, esant astminei būklei, sergant fenilketonurija, esant skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opai, jaunesniems nei 2 metų vaikams, jis taip pat netinkamas vartoti vaikams ir paaugliams nuo 2 iki 18 metų. **Specialūs įspėjimai:** jei kartu reikia vartoti acetilcisteiną ir per burną vartojamus antibiotikus, šiuos vaistinius preparatus reikia vartoti su bent 2 valandų pertrauka. Gamintojo atstovas: „Natur Produkt Vilnius", Konstitucijos pr. 12, Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2019.09.26.

nuo 6,73 € iki 7,13 €

Nuo gerklės skausmo

INOVOX HONEY LEMON 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės N24
INOVOX MENTHOL 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės N24
INOVOX ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

„INOVOX". EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio. **Indikacijos:** gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** po 1 kietąją pastilę kas 2–3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietųjų pastilių per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastilės). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** jei simptomai nesiliauja ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūminioms burnos ir gerklės žaizdoms, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydžio geltonojo ir košenilio raudonojo. Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09.

4,76 €

Nuo alergijos

TAVEGYL, 1 mg, 20 tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 1,34 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** šienligė ar kitokiai alerginei rinopatijai, įvairių priežasčių sukeltai dilgėlinei, įskaitant dermatografinę dilgėlinę, niežuliui, niežėjimą sukeliančiai dermatozei, vabzdžių įgėlimui ir įkandimui gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2 kartus per parą iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę (1 mg); 6–12 m. vaikams – prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 (0,5 mg) arba 1 (1 mg) tabletę; 3–6 m. vaikams – prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletės (0,5 mg). Tabletes reikėtų gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. Vartoti tik per burną. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** padidėjęs jautrumas klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, porfirija, pacientas jaunesnis negu 3 m. vaikas. Atsargiai vartoti turi pacientai, sergantys: uždaro kampo glaukoma; stenozę sukeliančia peptine opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susilaiko šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Tavegyl tablečių sudėtyje yra laktozės. Tavegyl negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistinį preparatą reikia atsargiai skirti epilepsija sergantiems arba praeityje traukulius patyrusiems pacientams. Pakuotės lapelio peržiūros data 2022-08-01.

4,33 €

Gelis niežuliui malšinti

GRIVIX 1 mg/g gelis, 30 g

Nereceptinis vaistinis preparatas

STIPRESNIS UŽ NIEŽULĮ!

Sudėtis: kiekviename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. Pagalbinės medžiagos: benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. **Terapinės indikacijos:** Dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo saulėje arba paviršutinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukelto niežėjimo trumpalaikis malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** Vaikams, suaugusiesiems ir senyviems pacientams: ant pažeistos ir niežtinčios odos GRIVIX reikia tepti plonu sluoksniu 2-4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelių odos plotų. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei GRIVIX gydomas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikio šių paviršių saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) didelio odos ploto, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, gelių tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakcijų, ir propilenglikolio, kuris gali sudirginti odą. Reklamos teksto paruošimo data 2022 06 mėn.

8,99 € / 7,71 €

Magnio šaltinis

MAGNE B, 470 mg/5 mg, 60 dengtų tablečių
MAGNE B, geriamasis tirpalas, 10 ampulių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

MAGNE B, PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: tabletėje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B_6). Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Indikacijos:** MAGNE B, skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumas, irzlumas, nedidelis nerimas, trumpalaikis nuovargis, nedideli miego sutrikimai; mėšlungis, dilgčiojimo pojūtis. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurią reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo ampulės turinys išgeriamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgymų. Vaikams ir kūdikiams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgymų. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B, medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopos. **Specialūs įspėjimai:** nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. MAGNE B, dengtos tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. MAGNE B, geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg sveriantiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti MAGNE B, preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B_6, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jutimo pablogėjimas, drebulys galūnėse ir koordinacijos sutrikimai. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Teksto parengimo data: 2017 m. birželio mėn. Reklamos teksto parengimo data: 12/2020. MAT-LT-2000431 V1.0

2,05 € / 4,08 €



Skausmui malšinti ir karščiavimui mažinti

IBUMAX 400mg tab. N10
IBUMAX 400mg tab. N20

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikio silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių malšinimui ir simptominiam karščiavimo mažinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams rekomenduojama dozė yra po 1 plėvele dengtą tabletę 2-3 kartus per dieną. Nereikėtų viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 IBUMAX 400 mg plėvele dengtų tablečių). Tabletę reikia nuryti užgeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** Ibumax nevartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas vaisto bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas; jeigu yra esama ar buvusi pepsinė opa; jeigu yra buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra sisteminė raudonoji vilkligė; jeigu yra kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kitoks kraujavimas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 12 metų; paskutinių trijų nėštumo mėnesių laikotarpiu.

nuo 5,70 € iki 9,75 €

THERAFLU ND 1000 mg/60 mg/30 mg milteliai geriamajam tirpalui
THERAFLU NT 1000mg/60mg/30mg/4mg milteliai geriamajam tirpalui

Nereceptinis vaistinis preparatas

Indikacijos. Theraflu ND: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo, erzinančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Theraflu NT: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimas.** Suaugusiems žmonėms bei 16 m. ir vyresniems paaugliams: gerti po 1 pak. kas 6 val. pagal poreikį. Negalima vartoti daugiau kaip 4 pak. per 24 val. Gydymo trukmė neturi viršyti 3 parų. 1 pak. turinį ištirpinti stiklinėje karšto, tačiau neverdančio vandens (maždaug 250 ml). Vartoti per burną. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jei vartojate ar per paskutines 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos arba Parkinsono ligos, vadinamų MAOI, vartojate kitų simpatomimetikų, yra uždaro kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), nėštumo laikotarpis. Theraflu ND: labai aukštas kraujospūdis, širdies kraujagyslių liga, sunkus inkstų veiklos sutrikimas, yra kvėpavimo nepakankamumas, plaučių liga ar astmos priepuolis, jei vartojate oksazolidinonų klasės antibiotikų, žindymo laikotarpis. Theraflu NT: sunki širdies liga, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas. **Specialūs įspėjimai.** Nevartoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio. Nevartoti alkoholio. Pasitarti su gydytoju, jei yra inkstų ar kepenų liga, lėtinis alkoholizmas, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės nepakankamumas, padažnėjęs širdies ritmas, aukštas kraujospūdis, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, cukrinis diabetas, padidėjusi prostata, psichikos liga, kosulys su dideliu skreplių kiekiu, lėtinis kosulys, aukšta temperatūra, išbėrimas, pastovus galvos skausmas, jei vartojate vaistų nuo depresijos ar psichozių, netekus skysčių ar badaujant. Pasireiškus karščiavimui ir išplitusiai raudonei su smulkiais pūlinėliais, staigiam pilvo skausmui, kraujavimui iš tiesiosios žarnos ar kitiems išeminio kolito simptomams, likus keliems dienoms iki operacijos, būtina nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Gali sukelti priklausomybę. Sudėtyje yra aspartamo ir sacharozės. Theraflu ND: Pasitarti su gydytoju, jeigu yra širdies liga ar antinksčių auglys, vyresniems nei 60 m. Pasireiškus stipriam galvos skausmui, pykinimui, vėmimui, regėjimo sutrikimams, būtina nutraukti vaisto vartojimą. Theraflu NT: Pasitarti su gydytoju, jeigu yra kvėpavimo nepakankamumo pavojus, hemolizinė anemija. Daugiau informacijos pateikta šių vaistų pakuotės lapeliuose. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. Paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje https://vvkt.lrv.lt/lt/. **Teksto parengimo data 2024 m.** Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2024 HALEON arba licencijos turėtojas

nuo 1,27 € iki 5,11 €

Nuo skausmo ir karščiavimo

APAP, 500 mg, 12 ir 24 plėvele dengtų tablečių
APAP, 250 mg, granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

„APAP". KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „APAP, 250 mg" yra 250 mg paracetamolio; 1 plėvele dengtoje tabletėje „APAP, 500 mg" yra 500 mg paracetamolio. **Indikacijos:** silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Apap, 500 mg" plėvele dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tablетes per parą. „Apap, 250 mg" granulių paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, jį vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgeriant vandens. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus. Reklamos teksto parengimo data 2023-12-19.

2,49 €

ALYR 10 mg plėvele dengtos tabletės

Cetirizino dihidrochloridas

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** ALYR skirtas suaugusiesiems ir 6 metų bei vyresniems vaikams sezoninės ir visus metus besitęsiančios alerginės slogos sukeliamų nosies ir akių sutrikimų simptomams palengvinti, dilgėlinei palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 metų rekomenduojama dozė – 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą, vaikams nuo 6 iki 12 metų rekomenduojama dozė – 5 mg (pusė tabletės) 2 kartus per parą. Tabletę reikia nuryti užgeriant stikline skysčio. Tabletę galima padalyti į 2 lygias dozes. **Kontraindikacijos:** ALYR vartoti negalima jeigu yra alergija cetirizino dihidrochloridui, bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, hidroksizinui arba piperazino dariniams, jeigu Jūs sergate sunkia inkstų liga. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju, jeigu: sutrikusi Jūsų inkstų funkcija; jeigu yra šlapimo susilaikymą skatinančių faktorių; Jums numatoma atlikti alergijos mėginį; esate nėščia ar žindote kūdikį; sergate epilepsija arba Jums yra traukulių rizika. Vartojant ALYR rekomenduojama vengti alkoholinių gėrimų. Nutraukus gydymą cetirizinu gali pasireikšti niežulys ir/arba dilgėlinė, netgi jeigu šių simptomų prieš pradedant gydymą nebuvo. Tam tikrais atvejais simptomai gali būti stiprūs ir gali prireikti pradėti gydymą iš naujo. Simptomai turėtų išnykti pradėjus gydymą iš naujo. **Reklamos teksto parengimo data** 2023.04.24

4,93 €

Nuos slogos

GALANAS 1 mg/50 mg/ml nosies purškalas 10 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg dekspantenolio. **Indikacijos:** „Galanas" skirtas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, ne alerginės kilmės ūminių nosies (vazomotoriniam rinitui) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu prienosinių ančių uždegimu (rinosinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galanas" negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. **Kontraindikacijos:** šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms, jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rhinitis sicca); po chirurginio pomeginės liaukos pašalinimo per nosį (transsfenoidalinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradedami vartoti „Galanas", jeigu esate gydomas monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinksčių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla; jei yra padidėjusi prostata (prostatos hiperplazija). **Reklamos teksto parengimo data 2024-08.**

5,12 €

Palengvina atsikosėjimą

HADORTA sirupas, 100 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

Sudėtis: 1 ml sirupo yra 5,556 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (4 - 8 : 1). 5 ml sirupo yra 27,78 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto. **Indikacijos:** Augalinis vaistinis preparatas, skirtas suaugusiųjų, paauglių ir vyresnių kaip 2 metų vaikų atsikosėjimo lengvinimui esant produktyviam (drėgnam) kosuliui. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vyresni kaip 12 metų paaugliai, suaugusieji ir senyvi pacientai: 5 ml sirupo 2-3 kartus per parą (atitinka 55,56 – 83,34 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto per parą). 6-11 metų vaikai: 2,5 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 41,67 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto per parą). 2-5 metų vaikai: 1,6 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 26,67 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto per parą). Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų vaikams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, Araliaceae šeimos augalams ir Apiaceae (Umbelliferae) šeimos augalams (pankoliui, kmynams, salierui, kalendrai ir krapams) ar anetoliui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų amžiaus vaikams, nes yra bendra kvėpavimo takų simptomų pasunkėjimo rizika dėl sekreto išsiskyrimą skatinančių vaistinių preparatų vartojimo. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Esant nuolatiniam ar atsinaujinančiam kosuliui 2–4 metų vaikams prieš pradedant gydymą turi būti nustatyta medicininė diagnozė. Pasireiškus dusuliui, karščiavimui ar atsiradus pūlingų skreplių, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Atsargiai vartoti rekomenduojama pacientams, sergantiems gastritu ar jei yra skrandžio opa. **Reklamos teksto parengimo data 2023 m. spalio mėn.**

6,75 €

Trumpalaikiam užkimimui ir gerklės skausmui malšinti

HOMEOVOX, 60 dengtųjų tablečių

Homeopatinis vaistinis preparatas

UŽKIMAI? SKAUDA GERKLĘ? IŠLAISVINK SAVO BALSĄ SU „HOMEOVOX"!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Aconitum napellus 3 CH 0,091 mg, Arum triphyllum 3 CH 0,091 mg, Ferrum phosphoricum 6 CH 0,091 mg, Calendula officinalis 6 CH 0,091 mg, Spongia tosta 6 CH 0,091 mg, Atropa belladonna 6 CH 0,091 mg, Mercurius solubilis 6 CH 0,091 mg, Hepar sulphuris calcareum 6 CH 0,091 mg, Kalium bichromicum 6 CH 0,091 mg, Populus candicans 6 CH 0,091 mg, Bryonia dioica 3 CH 0,091 mg. **Indikacijos:** trumpalaikiam užkimimui ir gerklės skausmui malšinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatine patirtimi. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** maždaug kas valandą leisti 2 tabletėms lėtai ištirpti burnoje. Būklei gerėjant, tabletes čiulpti rečiau. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Bei tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

7,70 €

PELAFEN geriamieji lašai (tirpalas) 20 ml
PELAFEN sirupas 100 ml

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Pelafen geriamieji lašai (tirpalas), 20 ml. Nereceptinis vaistas. 10 g geriamųjų lašų (= 10 ml) yra 8 g Pelargonium sidoides DC ir (arba) Pelargonium reniforme Curt., radix (pelargonijų šaknų) tinktūros (1:8 - 10). Ekstrakcijos tirpiklis: 15 % (V/V) etanolis. 1 g = 20 lašų. Dozavimas ir vartojimo metodas: vartoti per burną. 12 metų ir vyresniems paaugliams, suaugusiesiems ir senyviems pacientams: po 30 lašų tris kartus per parą. 6-11 metų vaikai ir paaugliai: po 20 lašų tris kartus per parą. Reikiamą kiekį lašų galima gerti tiesiai iš šaukšto arba, jei pageidaujama, galima sumaišyti su puse stiklinės vandens ir iš karto išgerti visą stiklinės turinį. Dozę reikia gerti ryte, vidurdienį ir vakare. Jaunesniems nei 6 metų vaikams šio vaistinio preparato vartoti nerekomenduojama. Jei vartojant vaistinį preparatą po 7 dienų simptomai pasunkėja arba išlieka, pacientui būtina kreiptis į gydytoją.
Pelafen sirupas, 100 ml. Nereceptinis vaistas. Kiekviename ml sirupo yra 8 mg Pelargonium sidoides DC ir (arba) Pelargonium reniforme Curt., radix (pelargonijų šaknų) sausojo ekstrakto (4-25:1). Ekstrakcijos tirpiklis: 11 % (m/m) etanolis. Dozavimas ir vartojimo metodas: vartoti per burną, naudojant pridedamą matavimo taurelę. Prieš vartojimą butelioką reikia gerai pakratyti. 12 metų ir vyresniems paaugliams, suaugusiesiems ir senyviems žmonėms: po 2,5 ml sirupo tris kartus per parą. 6-11 metų vaikai ir paaugliai: po 2,5 ml sirupo du kartus per parą. Jaunesniems nei 6 metų vaikams šio vaistinio preparato vartoti nerekomenduojama. Jei vartojant vaistinį preparatą po 7 dienų simptomai pasunkėja arba išlieka, pacientui būtina kreiptis į gydytoją.
Terapinės indikacijos: Pelafen yra tradicinis augalinis vaistas simptominiam peršalimo gydymui. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Pelafen skirtas suaugusiesiems, paaugliams ir vyresniems nei 6 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju, jei pasireiškia dusulys, karščiavimas arba atsiranda kraujingų ar pūlingų gleivių. Jei atsiranda toksinio poveikio kepenims požymių (tokių kaip pykinimas, apetito praradimas, epigastriumo (viršutinės pilvo dalies) skausmas, nuovargis, geltona odos spalva), reikia nedelsiant nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis: Pelafen nerekomenduojama vartoti nėštumo metu ir žindymo metu. Registruotojas: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Lenkija. Atstovas Lietuvoje: UAB Sirowa Vilnius. **Reklamos teksto parengimo data: 2023-02-21.**

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

4,09 € **2,90 €** **2,99 €**

THROMBO ASS 100mg tab. N100
THROMBO ASS 50mg tab. N100
THROMBO ASS 75mg tab. N100

Nereceptinis vaistinis preparatas

SKYSTINA KRAUJĄ – GYVENIMĄ SAUGO!

Veikliąji medžiaga: acetilsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiesiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nurovimo operacijos. Antrinė praeinančios smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirią tabletę reikia nuryti nesukramtytą, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu valgio metu arba tarp valgymų tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros doze ilgalaikiam vartojimui yra 50-150 mg. Dalysi į dalis Thrombo ASS skrandyje neirios tablietės negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plėvelė. Norint, kad tiktų individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliąjai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė peptinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, žvenige, esant nosies gleivinės pabunkumui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija, esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opaligę ar kraujavimą iš virškinimo traktо; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgšties reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Pakuotė: **50 mg, 75 mg, 100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių.** Farmakoterapinė grupė – antitrombocitiniai preparatai, trombocitų agregaciją slopinantys vaistai. ATC kodas – B01AC06. **Tekste peržiūros data** – 2020 05 13. **Reklamos parengimo data** – 2025 04 04. Registruotojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.

11,88 €

Kojų venoms

VELIOS 1000 mg plėvele dengtos tabletės, 30 tablečių

Nereceptinis vaistas

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

Veikliąji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmino. **Terapinės indikacijos:** susaugusiųjų vėlinės venės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymui, esant: apatinių galūnių venų varikozei, venų opoms, telangiektazijoms ir retikulinėms varikozėms ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar neramių kojų pojūčiui, kojų skausmui ar degimo pojūčiui, tūtų kojų pojūčiui, naktiniam kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežulиui, parestezijai (odos dilgčiojimui, badymui ar mėšlungiui), odos eritemai ar cianozei. Susaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venų nepakankamumo simptominiam gydymui 1 tabletė per parą valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Ūminio hemorojaus simptominiam gydymui, pirmosios 4 dienas per 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** paūmėjus hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „VELIOS" veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepraeina, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. VELIOS nėra veiksmingas gydant ūs stazinių širdies nepakankamumu susijusių edemą. VELIOS plėvele dengtų tablečių turi nevartoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrikusi kojų veninė kraujotaka, „VELIOS" gydomąjį poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialių kojinių nešiojimas. Kai apsinės kojų dalys patinusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šio vaistas nepadės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angikvandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „VELIOS" sudėtyje yra saulėgėlės geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alergines reakcijas. Prašome jėmisai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą naudoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsiradę šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytojaus/ar vaistininku.
Jeigu žinote, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujamas@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos internetio svetainėje www.vvkt.lt. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 11 18.

-30% **-25%**

CARDIOACE, 30 tablečių
CARDIOACE PLUS, 60 kapsulių

Maisto papildai

CARDIOACE – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŽIŲKI!

CARDIOACE – Viduržemio dietos nauda sukoncentruota vienoje tabletėje. Sinerginio veikimo komplekse derinama omega-3 naudingosios savybės su česnaku, vitaminais, mineralais bei antioksidantais. Sudėtyje yra medžiagų normalai širdies veiklai (vitaminas B1, EPR, DHR), kraujotakai (česnaka), ląstelių apsaugai nuo oksidacinio pažeidimo (varis, selenas, vitaminai C,E), homocisteino apykaitai (vitaminai B6, B12, folio rūgštis)
CARDIOACE PLUS – sudėtis papildyta net 1300 mg veikiamųjų augalinių sterolių normaliai cholesterolio koncentracijai, patentuotu Cardiol kompleksu, L-karnitino tartratu, kofermentu Q10. Teigiamas poveikis jaučiamas suvartojant per parą ne mažiau 0,8 g augalinių sterolių.

-35%

ATEROLIP®

ATEROLIP® COMPLEX CAPS 30 ir 90 kaps.
ATEROLIP® D, 30 kaps.
ATEROLIP® FIBER, 15 paketėlių
ATEROLIP® RYTHMO, 30 kaps.

Maisto papildai

AteroLip® complex caps sudėtyje esantis obeclolės ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.
AteroLip® D sudėtyje esantys cinamonas ir chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją.
AteroLip® Fiber sudėtyje esantys balkšvieji gysloičiai padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje.
AteroLip® Rythmo sudėtyje esantis vienapiesčių gudobelių žiedų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.

-40%

CARDIOM K+Mg tabletės N50
CARDIOM Monakolin K Forte kapsulės N30
CARDIOM Monakolin K Forte kapsulės N60

Maisto papildai

CardioM K+Mg, 50 tablečių
Širdžiai. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis, vitaminai B6 ir B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis ir kalis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją.
CardioM_Monakolin K Forte, 30/60 kapsulių
Širdžiai. Su Omega 3. Raudonosiomis mielėmis fermentuoti ryžiai. EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą.

-45%

GAMTOS NAMAI atrinkti maisto papildai širdžiai

Maisto papildai

7^45 € 12^45 €

Kepenims

LIVOSIL, 140 mg, 30 kietųjų kapsulių
LIVOSIL, 140 mg, 60 kietųjų kapsulių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil" dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil" rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil" medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

3^56 €

ESCADRA 20 mg, 7 skrandyje neirios kietosios kapsulės

Nereceptinis vaistinis preparatas

MODERNI KAPSULĖ NUO RĖMENS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos:** skirta suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaičių nepertraukiamą gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra" vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas". Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaišyti pusėje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientus reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar meleną arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina ištirti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantys nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra" pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolą skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PSI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra" sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2024.02.06.

-35%

GASTROVAL, 15 kapsulių
GASTROVAL FORTE, 12 kapsulių
GASTROVAL FLUXUS, 15 kapsulių
GASTROVAL HEPAR FORMULA, 30 kapsulių

Maisto papildai

VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI, KEPENŲ VEIKLAI

GASTROVAL – 7 fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui.
GASTROVAL FORTE – stipresnis net 7 augalinės kilmės fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui. Sudėtyje padidintas kiekis fermentų – kai reikia stipresnės pagalbos.
GASTROVAL FLUXUS – **inovacija su DGL saldymedžiu.** Išmaniai palaiko skrandžio rūgštingumo pusiausvyrą dėka plačios sudėties: augalų sėklų ir lakų ekstraktai, magnis, virškinimo fermentai, bifido bei lakto bakterijos, inulinas.
GASTROVAL HEPAR FORMULA – geresnis pasisavinimo augalinė formulė – antioksidacinė kepenų apsauga nuo oksidacinės pažaidos, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas.
GASTROVAL – supranta, ko reikia virškinimui skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai.
Geltonasis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti. Ožragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalų skrandžio rūgštingumą. Dažinės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažaidos, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje.

5^12 € 5^84 €

Nuo rėmens

MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletės (be cukraus) (40 tablečių)
MAALOX 40 mg/35 mg/ml geriamoji suspensija (1 buteliukas)

Nereceptinis vaistinis preparatas

GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename vienadoziame 4,3 ml geriamosios suspensijos paketėlyje yra 460 mg aliuminio hidroksido ir 400 mg magnio hidroksido, vienoje kramtomojoje tabletėje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. **Indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suspensija: geriama po 1 arba 2 vienadozių paketėlių turinį, pasireiškus rėmeniui arba refliuksui; negalima gerti daugiau kaip 8 paketėlių per parą; prieš atplėšiant paketėlį, jį reikėtų švelniai paspaudyti; suspensiją reikėtų gerti neskiestą. Butelio suspensija geriama po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliuksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. Tabletės: sučiulpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, pajutus rėmenį arba atsiradus refliuksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtariamas žarnų nepraeinamumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujuoja arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jie neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradedant vartoti Maalox reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio/hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokio per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 valandų (vartojant fluorochinolonų – 4 valandų) intervalas. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Maalox (be cukraus) tabletės tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Teksto parengimo data: 2021 m. kovo mėn. Reklamos teksto parengimo data: 04/2021. MAT-LT-2100180 V 1.0

3^99 € 13^74 €

NEUROMULTIVIT plėvele dengtos tabletės N20 ir N100

B grupės vitaminų kompleksas

Nereceptinis vaistinis preparatas

ATKURK GYVYBINGUMĄ SU NEUROMULTIVIT!

Vienoje tabletėje yra: tiamino hidrochlorido (vitamino B1) – 100 mg, Piridoksino hidrochlorido (vitamino B6) – 200 mg, Cianokobalamino (vitamino B12) – 0,2 mg. Neuromultivit yra vitamino B1, vitamino B6 ir vitamino B12, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stokų organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. Neuromultivit vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B1 pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas.** Rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozę galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgymo ir užsigerti trupučiu skysčio. **Kontraindikacijos.** Retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svaigulys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B1 arba B12 dažniausiai reiškiasi požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Neuromultivit vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B1, vitaminui B6, vitaminui B12 arba bet kuriai pagalbinei Neuromultivit medžiagai. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti dideles vaisto dozes ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B6 gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Teksto peržiūros data** – 2019 08 09. **Reklamos parengimo data** – 2025 04 04.

1^68 €

Odos tirpalas ar koncentratas burnos gleivinės tirpalui

MEDETKŲ TINKTŪRA VALENTIS, 40 ml

Odai ir burnos gleivinei

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos: 1 ml tirpalo yra 1 ml Calendula officinalis L., flos (medetkų žiedų) tinktūros (1:10). Ekstrahentas: 70 % (V/V) etanolis. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas nestiprių odos uždegimų (pvz., nudegimų nuo saulės) simptomams gydyti ir kaip nedidelių žaizdų gijimą skatinanti priemonė. Taip pat šis tradicinis augalinis vaistinis preparatas gali būti vartojamas nestipraus burnos ertmės ar gerklės uždegimo simptomams gydyti. **Vartojimas:** vartoti ant odos ar ant burnos gleivinės. Nestipriems odos uždegimams gydyti vartoti ant odos 2–4 kartus per parą. Naudojant kompresus, atskiesti šviežiai virintu vandeniu santykiu ne mažiau kaip 1:3. Kompresą nuimti po 30–60 minučių. 2 % vaisto tirpalas vartojamas gerklei ir burnos ertmei skalauti. Įpilti arbatinį šaukštelį vaisto į 250 ml virinto vandens ir tokiu tirpalu skalauti gerklę daug kartų per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas Asteraceae (Compositae) (šeim. astrinių, graižažiedžių) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti ant atviros žaizdos, šlapiuojančios egzemos ir gleivinės. Jei pasireiškė odos infekcijos požymių, būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jei vartojant šio vaisto simptomai neišnyksta per 1 savaitę, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Kadangi trūksta duomenų, šio vaisto ant odos nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 6 m. vaikams; gerklei ir burnos ertmei skalauti nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Reklamos teksto parengimo data – 2017-01-30.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-15%

NAUJIENA

VITA C 500 mg + Zinc tabletės N150
VITA C CHEW 500 mg tabletės N150
VITA C LONG 500 mg tabletės N150
VITA C ORIGINAL 500 mg tabletės N200
VITA C STRONG 1000 mg tabletės N100
NATURAL C-VITA CHERRY 60 mg tabletės N30
NATURAL C-VITA STRAWBERRY 60 mg tabletės N30
ECHINA-ZINC C-VITAMINAS (anyžių/mentolio skonio) tabletės N20

Maisto papildai

VITA C LONG yra pailginto atpalaidavimo vitamino C maisto papildas. Žaivyne tabletės lėtai tirpsta, palaipsniui atpalaiduodamos vitaminą C. Tokiu būdu užtikrinimas geresnis vitamino C įsisavinimas visą dieną.
VITA C ORIGINAL Stiprus vitamino C maisto papildas. N200 pakuotės užtenka daugiau pusei metų!
VITA C STRONG Stiprus vitamino C maisto papildas, tuntiems jo trūkumą. Ypač rekomenduojamas perdžiūrimo ir gripo laikotarpiu norint palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
NATURAL C-VITA yra natūralus ir skanus vyšnių arba braškių skonio vitamino C maisto papildas.
ECHINA-ZINC C-VITAMINAS yra anyžių mentolio skonio vitamino C ir cinko maisto papildas su ežiuolės ekstraktu. Cinkas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

iki -50%

NEW NORDIC NORMALIAM KŪNO SVORIUI PALAIKYTI

Maisto papildai

Organizmui valyti – **BODYDRAIN**. Sudėtyje esantis artišokų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą ir žarnyno būklę, valyti organizmą. Kalorijų apykaitai – **CHILI BURN**. Sudėtyje esantis chromas padeda palaikyti normalią maistinių medžiagų apykaitą. Riebalų apykaitai – **APPLE CIDER 600**. Jo sudėtyje esantis cholinas padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą. Gummukai **APPLE CIDER GUMMIES** – skanus ir patogus būdas vartoti obuolių sidro actą. Riebalų deginimui – **FAT BURNER**. Jo sudėtyje esantis cholinas padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą ir kepenų veiklą, o paraguajinai bugieniai (Yerba mate) padeda palaikyti normalų kūno svorį. Taip pat svarbu jvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

-25%

Moters sveikatai

LOTAMILE HIALURONIC, 5 makšties ovulės, esant makšties sausumui
LOTAMILE BORIC, 5 makšties ovulės, esant makšties infekcijoms

Medicinos priemonės

LOTAMILE GIRLS, švelnus intymios higienos prausiklis mergaitėms nuo 1 metų, 150 ml
LOTAMILE SOFT, švelnus, kvapą neutralizuojantis intymios higienos prausiklis moterims, 150 ml

Kosmetikos priemonės

„Lotamile" ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veiklųjį medžiagą makštyje ir taip palgina ovulės veikimą.
„Lotamile Hialuronic" makšties ovulės su hialurono rūgštimi naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos skersistemą.
„Lotamile Boric" makšties ovulės su boro rūgštimi naudojamos norint išvengti ar gydant makšties infekcijas. Ovulės mažina sudirgimą, deginimo ir niežėjimo pojūtį.
Ovulės netepa, neišbėga, ilgiau veikia!
Naujiena „Lotamile Girls" švelnus intymios higienos prausiklis yra specialiai sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis patikrintas dermatologų, nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odelę, pasižymi drėkinamuoju poveikiu, užtikrina natūralią apsaugine gleivinės funkciją, palaiko tinkamą mergačių intymių sričių rūgštinę terpę. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys.
Naujiena „Lotamile Soft" intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka kasdieniam naudojimui, suteikia gaivumo, švaros pojūtį. Prausiklis nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odą, pasižymi drėkinamuoju, tiapimo kvapą nakinančiu poveikiu, užtikrina natūralią apsaugine gleivinės funkciją, palaiko intymių sričių rūgštinę terpę, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nėštumo metu, po gimdymo.

iki -50%

Gerklei HERBITASSIN®

HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių
HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių
HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių

Maisto papildai

HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt.
HERBITASSIN® ledinukai Herbal extracts + Vit C, braškių ir miško uogų skonio, 4 vnt.

Maisto produktas

HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių

Medicinos priemonė

HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių. Drėkina gerklės gleivinę, ramina sausumo, perštėjimo ir gerklės skausmo jausmą, mažina sausokosulio ir užkimimo simptomus. Hialurono rūgštis intensyviai drėkina gleivinę.
Maisto produktas
HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt.
HERBITASSIN® ledinukai Herbal extracts + Vit C, braškių ir miško uogų skonio, 4 vnt.
Įvairių skonių ledinukai vaikams nuo 3 metų su vaistažolių ekstraktais ir vitaminu C.
Maisto papildai
HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių
HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių
HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių
Šveicarijoje pagamintos pastilės gerklei ir imunitetui. Sudėtyje esančios islandinės kerpenos, vaistinių šalavijų lapų ekstraktas padeda palaikyti gerklės ir balso stygų funkcijas, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą.

-40%

HYAL-DROP® multi 10 ml

Medicinos priemonė

TARKITE „NE" SAUSOMS AKIMS

Hyal-Drop® multi skirtas išsausėjusioms ir sudirgusioms akims drėkinti. Sudėtyje esantis natrio hialuronatas – tai natūralus drėkiklis, palengvinantis tokius simptomus, kaip sudirgusios, pavargusios, išsausėjusios, atsiraitančios, tarsi smėlio pripilstos akys. Hyal-Drop® multi tinka neišjiančiems kontaktinius lęšius. Dėka patogios dozavimo sistemos, Hyal-Drop® multi sudėtyje nėra konservantų ir šią medicinos priemonę galima naudoti net 6 mėnesius po atidarymo. Tekstas parengimo data 2024.11.19

-20% -15%

STATI-NATUR tabletės N150
STATI-NATUR tabletės N60

Maisto papildai

iki -45%

ACONITUM atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

ACONITUM – viena iš maisto papildų lyderių Lietuvoje, kuriančių ir gaminančių augalinius vaistus, biomediciniius preparatus ir maisto papildus nuo 1999 metų.
Vartotojų įvertinimą ir pasitikėjimą pelne, išlaikydama atsakingą požiūrį į gaminamus produktus: nuolat tobulina preparatų sudėtis ir diegia pažangias gamybos technologijas. Aukščiausią preparatų kokybę užtikrina Geros gamybos praktikos (GMP) nuostatų laikymasis bei nuolatinė ne tik gamybos proceso, bet ir žaliavų kokybės kontrolė.

iki -35%

Imunitetui, širdžiai, smegenims, regėjimui

FJØRD STRONG OMEGA-3

Maisto papildai

FJØRD STRONG OMEGA-3 – GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.

Kuo ypatingi?
- Stiprumu. Išskirtinai didelis kiekis omega-3, ypač jų aktyvia forma EPR ir DHR.
- Matoma kokybė. Žaliava atitinka 5* tarptautinio žuvų taukų standarto įvertinimo kriterijus.
- Geru pasisavinimu, nes yra natūralai gamtoje esančios trigliceridų formos.
- Šaltiniu – laukinės, maios, riebios žuvys natūraliai kaupia milžiniškų kiekį omega-3.
- Skoniu – skysti žuvų taukai be žuvies skonio, su vos juntama natūralios citrinos nata.

Paragaukite!

-35% -25%

Sąnariams

VERSAN

Maisto papildai

„VERSAN" – PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ SĄNARIAMS!

„Versan Strong Shots" – „perki viename" skystos geriamos dienos dozės būtinų medžiagų sąnariams, kaulams, raumenims, saugysloms, raiščiams ir Jūsų nevaržomam judėjimui!
„Versan Shots" – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Venas butelukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.

iki -50%

SALVIASEPT produktų linija

Medicinos priemonės

SALVIASEPT – NUO KOSULIO IR GERKLĖS SKAUSMO!

Medicinos priemonių linija „SALVIASEPT", kurių sudėtyje yra nanosidabro ir išlandinių kerpenų ekstrakto, padeda sumažinti bakterijų ir virusų sukeltą gerklės uždegimą bei perštėjimą, ramina sudirgusią gleivinę ir padeda gydant tonzilių, gerklės bei burnos gleivinės uždegimą, skausmą po tonzilių pašalinimo. Nanosidabras apriboja mikroorganizmų plitimą dėl savo antibakterinio ir antiseptinio poveikio.
„Salviasept" spray KIDS purškalas skirtas vaikams nuo 2 m.
„Salviasept" spray purškalas skirtas suaugusiesiems ir vaikams nuo 7 metų.
„Salviasept kids" gerklei: 1 ledinukas sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto, šalavijų ekstrakto, juodavaisių aronijų uogų sulčių, vaistinių svilanžių šaknų ekstrakto, vitamino C. „Salviasept kids" užtikrina gerklės skausmo, perštėjimo ir sausumo mažinimą bei rijimo lengvinimą. Sudėtarinėtis apsaugojus skoksnis užtikrina gerklės apsaugą nuo kenksmingų dirginių veiksnių (tokių, kaip sausos patalpos, sausas oras, purvas ir šalta). Ledinukas sudėtinė in gavina burnos erimes bei gerklės gleivinę.
„Salviasept kids" kosului: 1 ledinuko sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto, vaistinių svilanžių šaknų ekstrakto, čiobrelių ekstrakto, džiovintų juodavaisių aronijų uogų ekstrakto, vitamino C. Sudėtamosios dalys padengia gerklės gleivinę, ją drėkina, ramina ir susilpnina kosulį. Čiobrelių ekstraktas didina virpamojo epitelio judėjimą ir taip pagreitina fiziologinį kvėpavimo takų išsivalymą. „Salviasept kids" negalima vartoti vaikams iki 3 metų. **Vartojimas:** ledinukus „Salviasept kids" galima vartoti 1-2 kartus per dieną.
„Salviasept acut". 12 čiulpiamų gerklės pastilių.
„Salviasept acut". BE CUKRAUS, 12 čiulpiamų gerklės pastilių.

-35%

LIFEPLAN papildų linija

Maisto papildai

„Lifeplan" maisto papildai atsakingai gaminami Didžiojoje Britanijoje jau daugiau negu 30 metų. Kur įmanoma, produktuose naudojamos natūralios kilmės žaliavos. Vitaminų, mineralų ir botaninių medžiagų dozės produktuose yra pakankamai didelės ir labai kruopščiai parinktos remiantis egzistuojančiais moksliniais duomenimis. Šį mėnesį visi „Lifeplan" „Mano vaistinėje" pigiau.

-50%

PROPODEZAS, 50 čiulpiamų tablečių

Maisto papildas

BIČIŲ JĖGA IR GERKLEI, IR IMUNITETUI!

Tai propolis (bičių pikis), bičių pienelis su vitaminu C ir augalinais ekstraktais – ne tik naudingas gerklei ir imunitetui, bet ir gaivai skanus. Pasirinkite savo skonį – su avietėmis, imbieru, erškėtuogėmis, vaistažolėmis arba stipresnę versiją – Propodezas Forte su šalvamėdžiu. Pagamintas Lietuvoje.
Imbieras, šalvamėdžio uogų ekstraktas, vitaminas C, padeda palaikyti normalią kvėpavimo taką ir imunitetą veiklą.

iki -40%

Nosies purškalas

CLINSIN SPRAY, 30 ml
CLINSIN nosies ir prienosinių ančių plovimo milteliai tirpalui, 30 vnt.

Medicinos priemonės

ClinSin spray, 30 ml.
SU SIDABRO IR VARIO NANODALELĖMIS
Purškalas padeda palaikyti ėl nosies ir ančių susikaupusias išdikyas, slopina bakterijų daugėnimąsi, regeneruoja ir drėkina nosies gleivinę. Ypač rekomenduojama vartoti esant virškutinių kvėpavimo takų infekcijoms. **Vartojimo būdas:** suaugusiesiems purkšti kelis kartus per dieną po 2–3 dozes; abi šnerves.
ClinSin med nosies ir prienosinių ančių plovimo žaisas bei milteliai tirpalui (rinkinys). Skirta vaikams nuo 12 metų amžiaus ir suaugusiesiems. **Indikacijos:** sinusitui, įvairios kilmės rinitui, prieš ir po nosies chirurginių procedūrų, esant duketam arba labai sausam aplinkos orui, nosies gleivinei drėkinti po nosies medikamentinio gydymo, nosies ir prienosinių ančių higienai. Milteliai skirti izotoniniam ir hipertoniniam tirpalui ruošti.

iki -45%

KININIS KORDICEPSAS, 10 buteliukų po 10 ml
KININIS KORDICEPSAS, 90 kapsulių

Maisto papildai

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaRj@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-25%

UNIMED PHARMA akių priežiūros priemonės

Medicinos pagalbos priemonės

UNIMED PHARMA medicinos priemonių linija skirta pagrindinėms akių problemoms spręsti. **„OCUflush"** – pirmoji pagalba sudirgusioms akims – idealiai tinkamas kaip plaunamasis tirpalas dirginančioms dalelėms ir chemikalams išplauti iš akies. **„SeptaZINC"** – sudėtyje esantis cinko-gluko nuo sukelia dezinfekuojamąjį (antibakterinį ir antivirusinį) poveikį akims. **„Potassium-U"** – drėkinamasis izotoninis akių tirpalas, kurio sudėtyje yra kalio jodido, kuris akyje veikia kaip laisvosios degumines radikalus sujungiantis medžiaga. Naudojamas akiai drėkinti skatinant tam tikrus rezorbcijos procesus akyje (ypač esant eksudatui, kraujavimui stiklakūnyje ar jvairių priežasčių sukeltai katarakta). **„HYPROMELOZA-P"** priemonė naudojama ašarų nepakankamumo ir sausų akių sindromui gydyti. Medicinos priemonė taip pat padeda sumažinti akių nuovargį, atsiradusį po ilgo skaitymo, transporto priemonių vairavimo, žiūrėjimo į televizoriaus arba kompiuterio ekraną. **„OCUhyl C"** – sukelia drėkinamąjį, raminamąjį ir tepamąjį poveikį. Akių laluose esantis medetkų ekstraktas apsaugo akių epitelį, skatina jo uždegimą ir skatina regeneraciją. **„UNIhears"** sukelia lipalinį būklės pagerėjimą: sumažėjus ašarų išsiskyrimui, jo akių operacijos, esant pažeidimui ar ragenos erozijai, esant akių diskomfortui (degimui, niežėjimui, svetimkūnio pojūčiui). **„SENSIVITE"** – akių lašai su vitaminais. Vartojama sumažėjus ašarų išsiskyrimui, siekiant sudrėkinti, apsaugoti ir sutepti akių paviršių. Sudėtyje yra vitamino A, stiprinančio vidinę (gleivinės) ašarų plėvelės dalį. Šis vitaminas kartu su vitaminu E gerina ragenos ir junginės mitybą.

-40%

MABELLE BREASTFEEDING kapsulės N30
MABELLE PREGNANCY kapsulės N30

Maisto papildai

Unikali nėščiosms motinoms skirta linija, kurios produktuose yra 100 % metilfoliato!

-25%

Inhaliatorius ALLERGY STOP kompresorinis N1
Inhaliatorius KIDS kompresorinis N1

Medicinos prietaisai

-40%

Žarnyno mikroflorai

COMPLIFLORA FAMILY, 10 kapsulių
COMPLIFLORA FAMILY+, 10 paketėlių
COMPLIFLORA FEMINA, 10 kapsulių
COMPLIFLORA IMMUNO, 30 kapsulių
COMPLIFLORA KIDS GUMMIES N60
COMPLIFLORA BABY DROPS 10 ml

Maisto papildai

„Compliflora Family" ir **„Compliflora Family+"** – formulė „keturi viename". Bakterijos, kolonizuojančios ir plonąjį ir storąjį žarnyną. Didelė KSV (kolonijas sudarančių vienetų) dozė. Ypatingas gamybos metodas: bakterijos stiprinos skrandžio rūgštims, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuoti. **Vartojimas:** 1 kapsulė arba 1 paketėlis per dieną. **„Compliflora Baby Drops"** – formulė „du viename". Bifidobacterium lactis BS01 ir Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5301 kompleksas aliejinė forma. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį vartojant, be to, nereikia specialių laikymo sąlygų. **Vartojimas:** kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną. **„Compliflora Femina"** – formulė „keturi viename", ją sudaro 4 specialiai atrinktos Lactobacillus genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai liaptino ir lyties organų sistemos mikroflorai.
„Compliflora immuno" yra kompleksinis produktas, sukurtas siekiant palaikyti gerą imunitetą organizmo būklę. Vienoje kapsulėje yra 4 milijardai mikrokapsuliuotų pieno rūgšties bakterijų, cinko bei vitamino D.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. **Vartojimas:** 1 kapsulė per dieną.

-35%

Nuo knarkimo

SNOREEZE purškalas nuo knarkimo į gerklę 23.5ml
SNOREEZE purškalas nuo knarkimo į nosį 10ml
SNOREEZE tirpios gomurio juostelės nuo knarkimo N14
SNOREEZE čiulpiamos pastilės nuo knarkimo N16

Medicinos priemonės

Priemonių nuo knarkimo linija, padedanti atsikratyti knarkimo iki 8h. Linją sudaro: purškalas į gerklę ir nosį, gomurio juostelė ir čiulpiamos pastilės.

iki -55%

EMILI arbatų linija

EMILI ŽOLELIŲ ARBATOS – GERAI JŪSŲ SAVIJAUTAI VAIKAMS IR SUAUGOSIESIEMS

iki -55%

BIOFARMACIJA atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

Išsirinkite Jums reikalingiausią produktą sąnariams, širdžiai, akims, smegenims ir sąnariams.
NAUJIENOS! "ATLANT MAXIMUS" – dar daugiau moksliškai įrodyto poveikio sąnariams kolageno (net 15 000 mg) ir be to kompleksas papildytas hialurono rūgštimi (net 500 mg), cibedzolės (500 mg) ir boswelijos (100 mg) ekstraktas. "ATLANT ŠIRDIS" – svarbiausiam organui širdžiai su didžiausiu polifenolių (resveratrolio 240 mg ir ikopeno 13 mg) kiekiu*, kofermentu Q10, mineralais K, Mg, Fe, vitaminu B1, gudobelės, cibedzolės ir vaistinio valerijono ir česnako ekstraktas. Pagaminta Izraelyje.

-40% -45%

MAGNETRANS DRINK 400 mg granulės gėrimui paruošti, N20
MAGNETRANS DIRECT 375 mg burnoje tirpstančios granulės, N20

Maisto papildai

Magnetrans drink 400 mg. 1 paketėlyje yra 400 mg magnio. Magnis naudingas daugeliui procesų mūsų organizme: padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Gaivaus apelsinų ir greipfrutų skonio.
Magnetrans Direct. Burnoje tirpstančios granulės raumenims ir nervų sistemai. Citrinų ir greipfrutų skonio. Tobula keliaujant. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Tinka nuo 12 metų. 2402_SB_Magnetrans_V01_LT

-30%

MENOPACE ir MENOPACE CALCIUM 30 ir 60 tablečių

Maisto papildai

MENOPACE – NELEISK MENOPAUZEI TAVĘS SUSTABDYTI!

MENOPACE - biologiškai aktyvų maišinį kompleksas su sojų izoflavonais, kurie pagal savo struktūrą ir poveikį panašūs į moters lytinį hormoną estrogeną. Menopauzės laikotarpiu subalansuotai derinys pasižymi kompleksiniu poveikiu: hormonų balansui (vitaminas B1), psichologinei būsenai (folatas, biotinas, magnis), kaulų funkcijai (cinkas, magnis), nuovargio mažinimui (geležis, pantoteno rūgštis).
MENOPACE CALCIUM – sojų izoflavonų, vitaminų ir mineralų kompleksas su normalią kaulų būklę palaikančiu kalciu, sukurtas moterims menopauzės laikotarpiu.

-45%

REXSAVIT – naujos kartos maisto papildai liposomose – dar geresniam įsisavinimui!

Maisto papildai

Lipo D3 2000 IU ir 4000 IU (Imunitetui, Kaulams);
Lipo Magnis (Nervų sistemai, Raumenims, Energijai);
Lipo Magnis+B6 (Nervų sistemai, Raumenims, Nuovargui mažinti);
Lipo Magnis+B6+Melatoninas (Nervų Sistemai, Raumenims, Miegui).

- Liposominė technologija užtikrina, kad vitaminai ir mineralai išlaikys savo vientisumą, kol šie keliauja virškinamuoju traktu o vėliau ir kartu su krauju iki savo tikslo. Liposominai vitaminai ir liposominai maisto papildai yra puikus pasirinkimas norintiems geresnio veikliųjų medžiagų įsisavinimo efekto.

Pagaminta Lietuvoje. Jūsų sveikam kiliojam gyvenimui.

iki -55%

Imunitetui

BIOFARMACIJA atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

Išsirinkite reikalingiausią ir pastiprinkite organizmą: vitaminas D3, net 1000 mg vitamino C viename pakelyje ar vitaminas C su cinku, grynas cinko citratas, spanguolės ir mėlynuogės ekstraktai, bei net 16 veikliųjų medžiagų kompleksas jėgoms atkurti „Back to Life".
NAUJIENA! Imuno C + Echinacea + Ginger – vitaminas C kartu su ežiuolės ir imbiero!
GALINGAM IMUNITETUI!

-40%

BLUEIRON skysta geležis + vitaminų kompleksas 330 ml N1

Maisto papildai

-40%

GLIUKOZĖ SU VITAMINU C, tabletės N10

Maisto papildai

Mitybai papildyti energiniais medžiagomis ir vitaminu C. Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (5 tabletėse) yra 125 mg (156,5% RMV*) vitamino C (L-askorbo rūgšties). *RMV referencinė maistinė vertė.
Nevirbyti nustatytos rekomenduojamos dienos dozės. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-35%

BIOCHRONOSS neuroREST, 30 kaps. – miego kokybei
BIOCHRONOSS neuroOFFICE, 30 kaps. – fiziniam ir protiniam darbingumui

Maisto papildai

BIOCHRONOSS – RŪPINASI JŪSŲ BIORITMAIS!

Daugiau informacijos: www.biochronoss.com

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-35%

Raiščiams, sausgyslėms, fascijoms

CIGNON® N30, kapsulės
CIGNON SHOTS

Maisto papildai

NELĖTINK TEMPO SU „CIGNON"!

Raiščiai, sausgyslės, fascijos yra judėjimui būtini jungiamojo audinio dariniai: sausgyslėmis raumenys jungiasi prie kaulų. Joms susitraukiant pritraukiami kaulai ir taip įvyksta judesys. Raiščiai lyg virvės suriša sąnariuose esančius kaulų galus ir garantuoja judesio tikslumą. Fascijos lyg tinklas apsupa ir sujungia kaulus, raumenis, sąnarius, raiščius, sausgysles į visumą, padeda raumenims sąveikauti tarpusavyje atlikant judesius.
Nuolat pasikartojantys arba netikti, staigūs judesiai, didesnės, intensyvesnės raumenų apkrovos, pertempimai gali pakenkti raiščių, sausgyslių, fascijų sveikatai. Rūpinantis jų sveikata svarbu sureguliuoti darbo, poilsio režimą, taikyti optimalius fizinius krūvius ir apriprinti raiščius, sausgysles, fascijas reikiamomis maisto medžiagomis: mukopolisacharidais, hidrolizuotu kolagenu, variu, padedančiu palaikyti jungiamojo audinio būklę, energijos apykaitą, cinku, padedančiu palaikyti baltymų sintezę, rūgštinę-bazinę bei angliavandenių, maistinių makromedžiagų apykaitas, kurkuminu, apsaugančiu ląstelės nuo oksidacinės pažaidos.
CIGNON vienintelis maisto papildas Lietuvoje specialiai sukurtas raiščiams, sausgyslėms, fascijoms.
CIGNON SHOTS – geriamos dienos dozės papildo mitybą raiščiams, sausgyslėms, fascijoms reikiamomis medžiagomis, siekiant užtikrinti harmoningą judėjimą, puikią raiščių, sausgyslių, fascijų sveikatą bei sklandų jų darbą.

iki -35%

OCUTEIN KRISTAL, 30 kapsulių
OCUTEIN RETIN, 30 kapsulių
OCUTEIN BRILLANT, 30 kapsulių
OCUTEIN FORTE, 30 kapsulių

Maisto papildai

OCUTEIN SENSITIVE PLUS, 15 ml
OCUTEIN RIBO-HYAL, 10 ml

Medicinos priemonės

Ocutein KRISTAL – kristalo tyrumo regėjimui!
Ocutein RETIN – patobulinta formulė daug dirbančių akių mikrocirkuliacijai.
Ocutein BRILLANT – brilliantinė apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims.
Ocutein FORTE – trejopas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims.
Ocutein SENSITIVE PLUS – jautrioms, daug dirbančioms akims.
Ocutein RIBO-HYAL – regeneracija kiekviename laše!

-5%

DR. OHHIRA geriamas skystas kolagenas 20 ml N10

Maisto papildai

-20% -30%

JOINTACE pleistrai N8
JOINTACE SPORT tabletės N30

Maisto papildai

JOINTACE – SUKURTA NEVARŽOMAI JUDĖJIMO LAISVEI.

Jointace linijos produktai skirti sąnariams ir raumenims, ypač tinka aktyviai gyvenantiems, sportuojantiems ir vyresnio amžiaus žmonėms. Maisto papildo **Jointace Sport** sudėtyje yra ypač gryno gliukozamino sulfato, vitamino D, cinko ir mangano, kurie palaiko gerą kaulų būklę bei vitamino C, palaikančio kolageno susidarymą, kuris svarbus normaliai kaulų ir kremzlių būklei.
Jointace pleistrai – gliaus poveikio aromaterapiniai pleistrai su gliukozaminu ir chondroitinu, kurių aktyviosios medžiagos pro odą patekdamos per odą pasiekiant liposomų atsipalaidavimo sistemą. Jointace pleistrai padeda palaikyti oveikus ir laisvus sąnarius.

iki -45%

VOCAL pastilės gerklei su islandine kerpena, vitaminu c ir cinku

Maisto papildai

VOCAL – tai įvairių rūšių ir skonių maisto papildas, kuriame yra islandinės kerpenos, vitamino C ir cinko. Islandinė kerpena padeda palaikyti kvėpavimo takų – gerklės, ryklės gleivinės bei balso stygų – funkcijas. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

-50% -55%

VITAMINAS D3 4000TV Olive Forte Extra Strong, 60 kapsulių
VITAMINAS C 1000mg+Zn+D3+erškėtuogių ekstr. (prailginto veikimo), 45 tabletės

Maisto papildai IMUNITETUI

iki -40%

ICELANDER minkštosios pastilės skaudančiai gerklei, N16
ICELANDER purškalas skaudančiai gerklei, 20 ml
Burnos ir gerklės purškalas STRONG išsausėjusiai ir skaudančiai gerklei, 20 ml
ČIOBRELIŲ IR VITAMINO C sirupas, 100 ml

Medicinos priemonės, maisto papildai

0,91 €

1,22 €

SALICILO RŪGŠTIS 10 mg/ml odos tirpalas, 40 ml ir 80 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

Salicilo rūgštis Valentis:
- atveria poras;
- palaiko virbutinį ragėjį odos sluoksnį;
- naikina bakterijas

todėl tinka jaunaviriams, paprastiesiems spuogams ir kitoms odos ligoms. **Veikliosios medžiagos, stiprumas:** salicilo rūgštis, 10 mg/ml. **Indikacijos:** odos antiseptikai sergant odos ligomis, pvz., paprastaisiais spuogais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant odos. 2 – 3 kartus per parą salicilo rūgšties tirpalu sušlapti vatos tamponą ir tepti pažeistą odą. **Kontraindikacijos:** vaisto negalima vartoti, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kurai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra atvira žaizda, odoje esantis pūlinys, slapiuojantis egzema, odos uždegimas bei išbėrimas; jaunesniems negu 2 metų vaikams; ant glėivinių. **Specialūs įspėjimai:** ant mažo odos ploto reikia patikrinti, ar nepadidėjęs jautrumas salicilo rūgščiai. Būtina saugoti, kad salicilo rūgšties tirpalo nepatektų ant akių, kvėpavimo takų ir burnos gleivinės. Jei taip atsitinka, gleivine reikia nuplauti silpnu sodos tirpalu ir didelu vandeni kiekiu. Vaistu tepant didelį odos plotą, ypač vaikams ir pacientams, sergantiems inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumu, gali atsirasti salicilizmo simptomų. Jei yra toksinio poveikio pavojus, reikia kartu su šiuo vaistiniu preparatu nevartoti kitų vaistinių preparatų, dėl nevienų salicilatų koncentracijos kraujyje. Ligoniams, sergantiems inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumu, vaistu galima tepti tik nedidelį odos plotą. Pavartojus jo daugiau gali pasireikšti toksinis salicilatų poveikis: pykinimas, vėmimas, svaigulys, klausos sutrikimas, spengimas ausyse, psichikos ir kvėpavimo pokyčiai. Jei atsiranda tokių simptomų, vaisto vartojimą reikia nutraukti ir skubiai kreiptis į gydytoją. Jei atsiranda odos dirginimas, odą reikia nuplauti sodos tirpalu ir vandeniu. Reklamos teksto parengimo data: 2018-09-21.

iki -35%

Kaulažolių „Dr. Theiss" priemonės

Kaulažolių gelis, 100 ml
Kaulažolių tepalas su vitaminu E, 50 g
Kaulažolių šildantis kremas, 50 g
Dr. Theiss šildomasis pleistras

Medicinos pagalbos priemonės

KAULAŽOLIŲ „DR. THEISS" PRIEMONĖS – SENOLIŲ IŠMINTIS!

Kaulažolių tepalas „Dr. Theiss" su vitaminu E dėl sudėtyje esančio atkuriamosiomis ypatybėmis išskiriančio alantoino (išgauto iš kaulažolių ekstrakto) teika nugarai, raumenims, sąnariams jėrinti, nuovargiui palalinti, taip pat sumušinams, patempriams, odos pažeidimams, skilinėjantiems kulnams prižiūrėti. Sudėtyje esantis vitaminas E prasiskverbia pro ląstelių membranas, pagerina ląstelių maitinimą. Taip pat galima reikšti šildomąjį kaulažolių „Dr. Theiss" kremą su Kajeno paprikomis ir rozmarinų eterinai alejumi, kuris sušildo odą ir skatina kraujo apytaką, padėda palalinti įtampą, jaučiamą nugaros ir pečių juostos raumenyse, atokrabyti nemalonių pojūčių po fizinių krūvių. Kaulažolių tepalas „Dr. Theiss" pagamintas pagal originalią sėną receptūrą.
Dr. Theiss šildomasis pleistras šildo ir malšina skausmą. Veikia iki 12 h. Naudoti esant įtempiems ir skausmingoms raumenų grupėms (kaklo, pečių, nugaros), mumatiniams skausmams ir neuralgijai. Pleistras dėl savo sorbitų atpalaiduoja glėpsias raumenų grupes ir malšina skausmą.

-40%

EXCILOR® SOLUTION, teptukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml
EXCILOR FORTE, nagų grybeliui gydyti 30 ml

Medicinos prekės

EXCILOR® – NAUJOS KARTOS PRIEMONĖ NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI!

Nagų grybelinės ligos sudėtingai pasiekti ir gydyti, nes infekcija plinta ir nago viduje, ir paviršiuje. „Excilor™" buvo sukurtas specialai nagų grybelinėms ligoms gydyti ir yra pagrįstas 3 principais: 1) efektyvus veikimo režimas: „Excilor™" pakeičia pH lygį nago viduje, sukuriamas nepalankų aplinką grybeliams (dermatofitams). Tai stabdo tolesnį grybelio augimą ir nagų pažeidimus; 2) optimalus ir visiškas prasiskverbimas į nagą: „Excilor™" greitai pasiekia grybelius, užtikrina sveiko nago atsaugimą. 3) patogumas: „Excilor™" paprasta naudoti, nereikia ilgėsni nago. Tik 1 minutė per dieną – nagams patepti ir kelias sekundės jiems nužėgis. Naudokite būdami bet kur ir bet kada.
*Įrodyta klinikiniais tyrimais.
„Excilor™" – medicinės pėdų priežiūros ekspertas!

-40%

Geram miegui, nervų sistemai

GOOD SLEEP CAPS, 30 kapsulių
GOOD SLEEP SPRAY 30 ml

Maisto papildai

SALDŽIŲ SAPNŲ!

Good Sleep Caps ir **Good Sleep Spray** sudėtyje yra melatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Raudonžiedės pasiflioros žolės ekstraktas ir apyvai padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją ir miego kokybę.
Good Sleep Caps – vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią nervų sistemos būklę ir miego kokybę.
Good Sleep Spray vartojimas: papurškite aerozolio 1 kartą prie liežuvio. Taip gurškiama 150 mg produkto ir taip 1 dozė.

iki -45%

ECOSH atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

iki -45%

EVOLU produktų linija

Medicinos pagalbos priemonės

EVOLU – TAI PATIKIMUMAS, TIKSLUMAS IR PATOGUMAS!

EVOLU prekių šeimoje yra prietaisai temperatūrai matuoti, inhalacijai, kraujospūdžio matavimui.
Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją.
Atraskite sau tinkamiausią prietaisą iš EVOLU!

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-20%

FLEXISEQ OSTEOARTHRITIS gelis sąnariams, 50 g
FLEXISEQ JOINT WEAR & TEAR gelis sąnariams, 50 g

Medicinos pagalbos priemonės

NANOTECHNOLOGIJOS ŠIANDIEN – JUDĖJIMO LAISVĖ RYTOJ!

FLEXISEQ OSTEOARTHRITIS – maksimalaus veiksnumo formulė, sukurta specialiai mažinti osteoartrito sukeltus simptomus. Gelis pagamintas iš nanostruktūrose mikrokapsulių „Sequessome™", kurias sudaro natūralios, žmogaus organizme esančios molekulės, vadinamos fosfolipidais. Mikrokapsulės prasiskverbia į odą ir tiesiogiai jungiasi prie sąnario kremzlės paviršiaus, todėl padeda sumažinti sąnarinių paviršių trintį, skausmą bei pagerina sąnarinio skysčio kokybę. Nesukelia širdies ir skrandžio subrinkimų rizikos.
Jei esate aktyvus, sportuojate, bet jaučiate sąnarių skausmus ir sąstingį, sąnariams kasdien prižiūrėti rinkitės optimalios veikimingumo formulės preparatą **FLEXISEQ JOINT WEAR & TEAR.**
FLEXISEQ tinkamas reabilitacija pooperacinių/faktotarpiu. Naudoti gelį visiškai saugu – jo sudėtyje nėra farmaciškai aktyvių sudedamųjų dalių, galinčių sąveikauti su kitais vartojamais vaistais. Gelį galima naudoti ir su receptiniais vaistais rus uždegimo.

-35%

Kaulams ir dantims

KALCIKINON

Maisto papildas

„KALCIKINON" YRA TAI, KO REIKIA KAULAMS IR DANTIMS!

Stiprieno kaulams ir dantims bet kuriame amžiaus tarpsnyje labai svarbu gauti pakankamai kalcio, vitaminų D3, K2, fosforo bei užtikrinti tinkamą šių medžiagų įsisavinimą: kalcis, vitaminas D3, K2, fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, vitaminas D3 – normalią kalcio, fosforo absorbciją, įsisavinimą.
Kalcikinon Liquid – skystas mikronizuotas kalcis su vitaminais D3, K2, fosforu. Ši kalcio forma garantuoja greitesį, greitesnį kalcio įsisavinimą. Kalcikinon Liquid patiks tiek suaugusiems, tiek vaikams nuo 3 metų, nes yra švelnaus persikų skonio, malonios, lengvos tekstūros, neturi kreidės skonio, nepalieka poskonio.
Kalcikinon+ kapsulės – prasta, klasikinė vartojimo forma, kuriuje yra tai, ko reikia kaulams ir dantims: optimalus kalcio bei didesnis vitamino D3 kiekis ir ypač svarbus kaulams vitaminas K2.

iki -55%

ACORUS BALANCE atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

iki -35%

seni

SENI priemonės slaugai

Medicinos pagalbos priemonės

Platus SENI geriamųjų produktų asortimentas skirtas žmonėms, kurie susiduria su šlapimo nelaikymu. SENI CARE specializuotos kosmetikos produktai leis švelniai nuvalyti odą, ją atkurti ir efektyviai apsaugoti, daugumoje produktų nėra gyvulinės kilmės medžiagų ir jie pažymėti „Vegan" ženkliuku.
PROFESIONALŲJŲ UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

-30%

O'LIFE NATURAL PROBIOZYME kapsulės N90
O'LIFE NATURAL PROTEOZYME tabletės N30
O'LIFE NATURAL QUALITYZYME tabletės N30

Maisto papildai su fermentais

-35%

SKYSTASIS GUDOBELIŲ EKSTRAKTAS, 30 ml
GUDOBELĖ COMPLEX, 20 kapsulių

Maisto papildai

GUDOBELĖ COMPLEX. Vienapusė gudobelė padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Valgomasis česnakas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją, normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Europinis slyvmedis padeda palaikyti normalią kraujo cirkuliaciją. Svarbu juosti ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Vartojimo būdas. Suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 metų gerti po 1 kapsulę per dieną užgeriant stikline vandens. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės.
SKYSTASIS GUDOBELIŲ EKSTRAKTAS. Gudobelės padeda palaikyti kraujotaką. Svarbu juosti ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. **Vartojimas.** Prieš vartojimą buteliukę supurtyti. 25 lašus įlašinti į 50 ml vandens ir gerti 30 min. prieš valgį 2-3 kartus per dieną. Nevartoti jėgų netolerusiojo bei kartos iš produkto sudedamųjų medžiagų, nėščiosioms, žindančiosioms. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

-35%

INOVATIVE PHARMA guminukai N60

Maisto papildai

MANO vaistinė

iki -35%

SWANSON maisto papildų linija

Maisto papildai

Swanson maisto papildai pagaminti JAV, laikantis aukščiausių kokybės standartų. Įgamėte Swanson gamybos patirtis leidžia užtikrinti, kad visi produktai yra kokybiški, efektyvūs ir veiksmingi.

-20%

VANDENILIO PEROKSIDO 3 % skystis odos priežiūrai

Kosmetika

Paskirtis: odos priežiūrai.
Naudojimas: 3 % vandenilio peroksido tirpale suvilgytu vatos gumutėliu švelniai valyti odą.
Tik išoriniam naudojimui. Sudėtyje yra vandenilio peroksido. Vengti patekimo į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, tamsioje vietoje. Saugoti nuo sąlyčio su organinėmis medžiagomis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Negalima plakti, kaitinti.

-40%

ACIDOLAC® JUNIOR (20 meškiuko formos tablečių)
ACIDOLAC® JUNIOR (braškių skonio; 20 meškiuko formos tablečių)

Maisto papildai

Acidolac® Junior meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų **Lactobacillus acidophilus La-14TM** ir **Bifidobacterium lactis BI-04TM**, inulino ir vitamino B6, kurie padeda palaikyti normalią imunines sistemos veiklą.
Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiesiems vartoti po 1 meškučio formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir glitimo.

-15%

Padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę

UNITAL CHEW 1 mg tabletės N30
UNITAL CHEW 1 mg tabletės N60
UNITAL 1 mg tabletės N20
UNITAL 1 mg tabletės N50

Maisto papildas

„Unital" sudėtyje yra 1 mg melatonino. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę bei padeda mažinti subjektyvų laiko jausmą skirtumo pajautimą. **Vartojimas:** suaugusiems rekomenduojama gerti ½-1 tabletę prieš einant miegoti. Dozė visada turėtų būti suvartota tuo pačiu metu vakare. Maistas sumažina melatonino absorbciją, todėl vartokite „Unital" tabletę porą valandų po valgio.

-35%

OMEGAVIT Omega-3 žuvų taukai, N120

Maisto papildas

120 minkštų kapsulių. Kiekviencje kapsulėje yra 1000 mg žuvų taukų.
Optimalus įsisavinimas. Tik 1 kapsulė per dieną!
Žuvų taukų sudėtyje yra nesočiųjų riebalų rūgščių EPR ir DHR.
- DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir padeda išsaugoti normalų regėjimą (teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR)
- EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą (teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR)

iki -50%

DR. P. KARVELIO visa arbatų linija

-45%

HAPPY THROAT peršalimui guminukai N60

Maisto papildai

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-25%

SMARTHIT IV
efektyvaus pasisavinimo maisto papildai

Maisto papildai

SMARTHIT IV® – MĖNAS VEIKTI!

Miosol technologijos dėka pagaminami produktai, kurie pasisavinami itin gerai. Be to, mikrokapsulės sumažina šalutinių poveikių riziką. Efektyvaus pasisavinimo maisto papildų **SMARTHIT IV®** linija sudaro:
SMARTHIT IV® Lactoferrin, Laktoferinas – tai geležį surišantis baltymas, dalyvaujantis geležies pasisavinimo procese. Galima vartoti kartu su **SMARTHIT IV® Ferrum** kapsulėmis arba SMARTHIT IV Ferrum Liquid skysta geležies forma, tinkančia suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.
SMARTHIT IV® Ferrum Gummies – pirmieji mikrokapsuliuotis geležies gumukai.
SMARTHIT IV® Vitamin D3 – kaulams, dantims, raumeninis;
SMARTHIT IV® Vitamins D3+K2 – sinerginis, vitaminų D3 ir K2 poveikis kaulams ir kraujotakai;
SMARTHIT IV® Vitamin B12 – normalai kraujodarai bei psichologinei funkcijai palaikyti ypač daug dirbantiems ir besimokantiems;
SMARTHIT IV® Polifen – polifenolių šaltinis gerai savijautai.

iki -45%

MICROLIFE atrinktiems kraujospūdžio matuokliams, inhaliatoriams ir termometrams

Nereguliarausi pulso detektorius
Nereguliarausi pulso detektorius (HR) ankstyvai širdies ritmo sutrikimų diagnostikai
Insulto rizikos detektorius
Ypatingai tikslus prieširdžių virpėjimo (AF) detektorius AFIB insulto rizikos prevencijai
MAM technologija
3 matavimai iš eilės tik vienu mygtuko paspaudimu

-35%

HYDROLESS SLIM, N60
HYDROLESS, N30

Maisto papildai

HYDROLESS – SKYSČIŲ BALANSUI!

Naudojant augalinius ekstraktus, organizmui padedama palaikyti normalų skysčių pasišalinimą per inkstus, bei palaikyti normalią šlapimo takų funkciją. 1 tabletėje: 80 mg džiovintų stambiavaisių spanguolių miltelių, 60 mg didžiųjų dilgėlių ekstrakto, 50 mg obuolių actos miltelių, 12 mg cinko. Geri po 1 kapsulę per dieną.

-45%

-55%

3BESTAN 250 mg, 60 tablečių

Maisto papildas

Gulčioji ragužė padeda palaikyti gerą lytinių organų funkciją bei gerą lytinių hormonų aktyvumą. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Nevirškite nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
1 tabletėje/2 tabletėse yra 250 mg/500 mg sausojo gulčiosios ragužės žolės ekstrakto (112,5 mg/225 mg furostanolų saponinų). Vartojimo būdas. Suaugusiesiems rekomenduojama geri po 1-2 tabletes per dieną po valgio, užgeriant vandeniu. **Sudedamosios dalys:** užpildas mikrokristalinė celiuliozė, sausasis gulčiosios ragužės žolės 45 % ekstraktas (Tribulus terrestris herbae extractum siccum), užpildas hidroksipropilmetilceliuliozė, lignumų regulioriančios medžiagos riebalų rūgščių magnio druskos ir silicio dioksidas.

-30%

OCULEN akių lašai 10 ml

Medicinos priemonės

-20%

MAGNEX

Maisto papildai

DAUG KOKYBIŠKO SUOMIŠKO MAGNIO!

- Tik 1-2 tabletės per dieną.
- Net 375 mg MAGNIO paros dozėje, o tai yra 100% referencinis vartojimo kiekis per parą suaugusiesiems.
- Galimas pasirinkimas ir su vitaminu B6.
- Rinktės tabletes arba citrinų skonio tirpias tabletes.
- Pagaminta Suomijoje, taikant aukščiausios kokybės standartus.

iki -35%

LAXFORTE BABY rektalinės žvakutės N10
REDULEX BABY geriamieji lašai (tirpalas) 50 ml
REDULEX BABY rektalinės žvakutės N12

Medicinos pagalbos priemonės, maisto papildai

iki -45%

EUCERIN apsaugos nuo saulės priemonės

Kosmetika

Eucerin® apsaugos nuo saulės priemonės suteikia odai visapusišką apsaugą nuo saulės sukeliamos žalos ir yra pritaikytos individualiems odos poreikiams. Kūdikiams nuo 3 mėnesių, vaikams ir suaugusiems.
Eucerin® Advanced Spectral Technology apima UVA / UVB filtrus apsaugai nuo UV spindulių bei antioksidantą likochalkoną A apsaugai nuo didelės energijos regimosios šviesos. Glicerininė rūgštis palaiko odos DNR atsistatymo mechanizmą.
Visų apsaugos nuo saulės priemonių efektyvumas ir tinkamumas odai yra patvirtintas klinikiniais tyrimais.

iki -40%

URGO

URGO produktų linija

Medicinos pagalbos priemonės

SU URGO PRIŽIŪRIMOS ŽAIZDOS GYJA GREIČIAU!

Urgo pleistrų ekspertas jau 60 metų! Urgo orui pralaidūs pleistrai įvairių rūšių: nepastebimi, prie judėsių pritaikantys, neperšlampami ir ypač tvirti.
Urgo Filmogel geliai, tai unikalios inovacinės technologijos skysti pleistrai, kurie patekę ant odos pavirsta į permatomą gyjimą skatinančią plėvelę. Kiekvienas šios linijos produktas yra unikalus sudėties ir skirtas atskirai problemai spręsti: odos įrėkimams, pažeistiems nagams, pūslėlėms ir burnos žaizdoms.

iki -40%

B.Well

B.WELL burnos higienos technika

Medicinos prietaisai

iki -35%

LISTERINE

LISTERINE® burnos skalavimo skysčiai

Kosmetika

SVEIKI DANTYS IR GAIVUMO POJŪTIS SU LISTERINE®

LISTERINE® burnos skalavimo skystis pagerina burnos higieną naudojant du kartus per dieną. Efektyviai kovoja su bakterijomis, apsaugo nuo apnašų, suteikia gaivų kvapą.
LISTERINE® antibakterinės savybės įrodytos klinikiniais tyrimais.

iki -35%

Fillerina Sun Beauty

FILLERINA SUN BEAUTY produktų linija

Kosmetika

Tai daugiau nei įprasta apsauga nuo saulės! Kas įspūdinga Fillerina Sun Beauty kosmetika?
- Priemonėse gausu 12 hialuurono rūgščių, kolageno, elastino ir atitinkamų molekulių, kurios neutralizuoja jų skilimą veikiant ultravioletiniams spinduliams.
- Padėda mažinti viso kūno odos raukšles ir senėjimą. Taip pat drėkina odą, apsaugo nuo dehidratacijos, suteikia malonų švelnumo pojūtį.
- Užtikrina ilgalaikę melanino gamybą net ir po saulės poveikio odai, taip sustiprindamos jėdėj.

-40%

DRICLOR antiperspirantas (tirpalas) su 20 proc. aliuminio chlorido druskos, 20 ml

Kosmetikos priemonė

Rutulinis antiperspirantas Driclor saugo ne tik nuo gausaus pažastų, bet ir delnų bei pėdų prakaitavimo. Jis suteiks apsaugine geliu plėvelę, kuri, veikdama prakaito lauką, sumažina ir ilgainiui sustabdo prakaitavimą. Priemonės poveikis matuojamas ne valandomis, o dienomis, todėl nuo antros savaitės naudojama 2 kar tus per savaitę ar rečiau. Driclor veikia tik toje vietoje, kur tepama. Daugiau informacijos teirauktės telefonu (8 5) 264 9000. Teksto parengimo data 05.2023.
Turite problemų dėl gausaus prakaitavimo? NP-LT-OCR-23-00001

iki -35%

Happy

HAPPY produktų linija

SU MEILE JŪSŲ MAŽYLIAI!

Medicinos pagalbos priemonės, kosmetika

HAPPY sauskelnės vaikams – su natūralu antiseptiku žaliosios arbatos ekstraktu. Puikai prigludę, gražai ir daug sugeria bei užtikrina kūdikio laisvą judėjimą. Su kvapo kontrolės sistema. Drėgni lapučiai. Maišiusi dydžiai turi specialų iškirpimą bambutė. **HAPPY Natural Care** kosmetika sukurta jautriai kūdikio odai. Šių produktų sudėtyje yra rūpestingai atrinktų ingredientų, užtikrinančių gležnos kūdikio odelės apsaugą kasdienės priežiūros metu.

-50%

Veido, kūno odos ir plaukų priežiūrai

APIVITA natūrali kosmetika

ĮKVĖPTA GRAIKIJOS GAMTOS, SU BIČIŲ PRODUKTAIS, PAREMTA MOKSLU.

Kosmetika

„Apivita" – tvarus ir atsakingas prekių ženklas, siūlantis natūralias veido, kūno bei plaukų priežiūros priemones, kurias gaminant pritaikytos geriausios bei naudingiausios Graikijos augalų ir bičių produktų savybės.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

iki -35%

Odai, plaukams, nagams

BIOCELL veido kaukės ir maisto papildai

Maisto papildai, kosmetikos priemonės

Tobula esi Tu. BIOCELL tai išsaugo.

BIOCELL veido kaukės – tai pirmosios veido kaukės Lietuvoje, kurios išsiskiria ne tik efektyviais komponentais, greitu ir intensyviu poveikiu, bet ir ilgesniu rezultatu. Pasirinkite ko jūsų odai reikia šiandien – glaus drėkinime, regeneravimo, stangrinimo, raukšlių lyginimo, valymo ar tvyrinimo?
BIOCELL gražio elixyrai „shots" – tai gilaus odos drėkinimui ir maitinimui sukurtos formulės, kurios pastebėsi praturtina odos, plaukų ir nagų grožį. **BIOCELL Beauty Shots** sudėtyje – optimali dozė geriamo hidrolizuoto kolageno, hialurono rūgšties, sudėrinta paletė svarbių vitaminų, mineralų bei augalinių ekstraktų. **BIOCELL Hair Shots** sudėtyje – biologiškai aktyvus geriamas hidrolizuotas keratinas, SOD (superoksido dismutazė), vitaminai ir mineralai.
BIOCELL Platinum – ypač intensyvaus drėkinimo reikalaujančiai odai – įgatinga mažos molekulinės masės hialurono rūgšties, ceramidų eliksyras ir biotino kompleksas.
BIOCELL Hair – ypač efektyvios pagalbos reikalaujantiems plaukams – nepakeičiamų aminorūgščių, vitaminų, mikroelementų kompleksas. Biotinas, selenas ir cinkas padėda palaikyti normalią plaukų būklę.

iki -30%

BIODERMA
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

BIODERMA atrinktiems produktams

EKOBIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI

Kosmetika

iki -35%

DERMOXEN produktų linija

Kosmetika

INTYMI GEROVĖ KIEKVIENAI MOTERIAI

Mergaitiems. **DermoXEN intymios higienos prausiklis 4 GIRLS** (3-14 metų amžiaus). Skirta naudoti vaikystėje ir dar neprasidėjus lytiniam brendimui.
Moterims. **DermoXEN intymios higienos prausiklis ANTI-ODOUR.** Skirtas naudoti vaisingo amžiaus laikotarpiu.
Senjorams. **DermoXEN intymios higienos prausiklis LENITIVO.** Tinka naudoti esant makšties sausumui, menopauzės laikotarpiu.
DermoXEN intymios higienos prausiklis PRONEEM. Tinka naudoti nėštumo ir menstruacijų/laikotarpiais.
DermoXEN raminamasis intymios higienos kremas LENITIVA. Raminamasis intymios higienos kremas DermoXEN™ LENITIVA tinkamas naudoti esant intymios srities niežuliui, paraudimui arba kitoms problemoms, atsirandančioms dėl makšties sausumo, naudojant kiotus, vilkint siaurus drabužius ar kelnaites su juostele.

iki -35%

dr. Soda ir mr. Soda produktų linijoms

Kosmetika, maisto papildai, medicinos pagalbos priemonės

Produktai su maistine soda – veiksmingas pasirinkimas odos priežiūrai, atsipalaidavimui vonioje, organizmo pH balansui ir burnos gaivai. Švara ir gaiva su maistinės sodos galia!

-25%

Mon Platin DSM
Closed Sea Minerals

MON PLATIN DSM kosmetika

Kosmetika

MON PLATIN – TAVO NATŪRALUS PASIRINKIMAS!

Mon Platin DSM – Izraelio kosmetika su juodųjų ikrų ekstraktu, mineralais, vitaminais ir augalų ekstraktais. Izraelio mokslininkai atrado būdą, kaip kosmetikoje panaudoti visa tai, ką gamta kūrė šimtmečiais, nesugriauniant tos trapios gamtos sukurtos pusiausvyros. Tai išskirtinė gamtos dovana odai ir plaukams.

iki -55%

LIFESTYLES IR SKYN produktų linija

„LifeStyles" lateksiniai prezervatyvai dabar dar patogesni – atnaujinta „Easy-Fit" forma leidžia dar patogiau ir lengviau užsidėti prezervatyvą ir mėgautis malonumais.
„SKYN" polizopreno prezervatyvai yra sukurti naudojant revoliucinį sukeltusią „SKYNFEEL" medžiagą, kuri suteikia išskirtinį minkštumo ir patogumo pojūtį bei yra vos pastebima.

iki -30%

TEPE produktų linija

TEPE RŪPINASI JŪSŲ SVEIKA ŠYPSENA!

- Tepe produkcija pagaminta bendradarbiaujant su Švedijos ir tarptautiniais odontologijos specialistais.
- Visi tarpdančių šepetėliai turi unikalius laikiklius, specialai parinktus derėklus ir plastiko padengtą vielutę, todėl tarpdančių valymas labai veiksmingas.
- Tepe dantų šepetėliai patikimi ir kokybiški.

iki -50%

URIAGE dermatologinė kosmetika

Kosmetika

URIAGE kosmetika sukurta saugos, efektyvumo ir tvarumo dvasia – skirta naudoti kasdien ir turint specialiųjų poreikių. Įvairių tipų odai, net ir jautriai.
Visai šeimai.

JŪSŲ GROŽIUI IR HIGIENAI

MANO vaistinė

iki -30%

ECODENTA burnos priežiūros priemonės

Kosmetika

iki -30%

PARASOFTIN SILK pėdų kremas, 50 ml
PARASOFTIN šveičiamoji pėdų kaukė, 40 ml (20 ml x 2)
PARASOFTIN drėkinamoji pėdų kaukė 1 pora
PARASOFTIN regeneruojamoji pėdų kaukė 1 pora

Kosmetika

Parasoftin Silk pėdų kremas, 50 ml
Natūralaus tauko metžių ir kakavmedžių sviestas. Regeneruojamasis kasdienio naudojimo pėdų kremas, skirtas sausai ir sudirgusiai odai. Sudėtyje yra aktyvių natūralių ingredientų, kurie regeneruoja, maitina ir drėkina kojų pėdų bei kulnų odą. Kremas gaivina, vėsina ir suteikia malonų jausmą.
Parasoftin šveičiamoji pėdų kaukė, 1 pora
Efektyviai pašalina pėdų nuospaudas, sustiprėjusią odą ir nuospaudas, drėkina ir minkština pėdų odą.
Parasoftin drėkinamoji pėdų kaukė, 1 pora
Veikia iš karto. Poveikis juntamas 12 valandų. Kaukė ypač rekomenduojama žmonėms, kurių pėdų oda sausa, arba išsausėjusi. Suminkština, išlygina, bei puoselėja pėdų ir kulnų pėdą. Suteikia drėkinamos pėdų odos pojūtį. Išlaiko gerą pėdų ir kulnų būklę. Atkuria sveiką pėdų kulnų išvaizdą.
Parasoftin regeneruojamoji pėdų kaukė, 1 pora
Kaukė ypač rekomenduojama žmonėms, kurių pėdų oda šiurkšti, sausa ir suskeldėjusi, sustiprėjusi pėdų oda. Puoselėja, išlygina ir suminkština pėdų bei kulnų odą. Suteikia atsinaujinusios pėdų ir kulnų odos pojūtį. Užtikrina komfortišką pėdų ir kulnų odos pojūtį. Išlaiko gerą pėdų ir kulnų būklę. Atkuria sveiką pėdų odos išvaizdą.

iki -50%

Odai

NEW NORDIC SKIN CARE

Maisto papildai ir kosmetikos priemonės

JŪSŲ NUOSTABIAI IR JAUNATVIŠKAI ODAI!

Jau 30 metų „New Nordic" tiria augalus, jų įgatinges savybes, kaupia patirtį, vertina ir žavisi gamtos teikiamomis galiomis. Panaudodami šias gamtos dovanas kuriame ir gaminame maisto papildus bei kosmetikos priemones. Tos pačios veiklosios augalinės medžiagos, puoselėjančios odą tiek iš vidaus, tiek iš išorės, naudojamos ir maisto papildų, ir kosmetikos gamyboje. Tai naujas grožio rituals, padedantis puoselėti odą tiek iš vidaus, tiek iš išorės.

-40%

Odos priežiūra sausai, sudirgintai ir jautriai odai

PANTHENOL rūpinasi jūsų oda bet kokiu oru

Kosmetika

„Panthenol" produktai drėkina, ramina ir apsaugo sausą, suskilinėjusią ir sudirgusią odą, atsiradusią dėl UV spindulių, sauso oro ar kosmetinių procedūrų. Dekspantenolio ir lanolino derinys palaiko epidermio atsinaujinimą, gerina barjerinę odos funkciją, mažina niežulį ir paraudimą. Sudėtyje nėra parabenų, dažiklių ir kvapiųjų medžiagų.

iki -40%

PLANTUR šampūnų linija

Kosmetikos priemonės moterims nuo plaukų slinkimo

„PLANTUR39" šampūnuose esantis fitokofeino kompleksas saugo plauko šaknis nuo hormonų sukeltos nuovargio. Stiprėja plaukų šaknys, mažėja plaukų slinkimas.

iki -25%

Visai DUREX produktų linijai

KITOKS BŪDAS MĖGAUTIS ARTUMU!

Skirtingose vaistinėse prekių rūšių skaičius gali skirtis.

-15% -10%

ASEPT išorinis odos purškalas, 100 ml
ASEPT išorinis odos purškalas, 250 ml

Antiseptinis medicinos prietaisas

Asept valo ir dezinfekuoja nedidėles žaizdas ir įvairius odos pažeidimus, mažina vabzdžių įgėlimus, įvairius pobūdžio nudegimus bei praskiedus su vandeniu tinkamas burnos dezinfekavimui. Jis yra patogus ir maloniai naudotis, nes nesukelia dilgčiojimo ar perdžiūvimo, o 100ml pakuotė puikiai tinka bet kokiai kelionei.

iki -25%

Pleistrai

LEUKOPLAST®
LEUKOPLAST® SKIN SENSITIVE

Medicinos pagalbos priemonės

ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA PATIKIMOSE RANKOSE

LEUKOPLAST® – aukštos kokybės pirmosios pagalbos pleistrai, skirti nedidėlėms žaizdoms, tokioms kaip įpjovimai, įbrėžimai, nubrozdinimai ar įtrūkimai. Iš įvairių tipų pleistrų: sterilų, atsparių vandeniui ar apsaugančių nuo bakterijų patekimo į žaizdą, tin tvirtai prilipančių ar švelnių odai – išsirinkite tinkamiausius savo pirmosios pagalbos vaistinėlei.
LEUKOPLAST® SKIN SENSITIVE – švelniai užklijuojami pleistrai skirti jautriai ar pažeistai odai. Tinka tin švelniai kūdikių odelei ir lengvai pažeidžiamai senyvo amžiaus žmonių odai. Apsaugo nuo glitymų, užtikrina netraumuojantį nuėmimą.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Menopace
Neleisk menopauzei Tavęs sustabdyti!
• Hormonų balansui (vitaminas B1)
• Psichologinei būsenai (foliatai, biotinas, magnis)
• Kaulų funkcijai (cinkas, magnis, kalcis ir vitaminas D)
• Nuovargio mažinimui (geležis, pantoteno rūgštis)
Menopace CALCIUM
NORMAL BONES
MENOPAUSE
24 NUTRIENTS
Menopace PLUS
BOTANICALS
MENOPAUSE
26 NUTRIENTS
Menopace ORIGINAL
DAILY SUPPORT
MENOPAUSE
22 NUTRIENTS
VITABIOTICS
Maisto papildai
Beveik ABSOLIUTUS VEIKSMINGUMAS
>95% moterų pajuto teigiamą poveikį po 3 mėn. Menopace vartojimo.*
* Meta Analysis of worldwide clinical trials, prof. Russel S. Kirby. Int. J. Fert., 2006; 51(3): 125-129